

2000 1970 :

2 /3730
. 801436 2000 105

. ...

2025 1.07

-

50

.

. 2001

. ..

.

.

•

•

:

$$\vdots$$

•

-1

:

•

$$\vdots$$

•

⋮

•

:

•

•

•

•

•

-2

()

.() ()

.
 :
 :

. : .

.

.

:

:

.

.

:

.

.

.

:

:

.

.

.

..

..

..!

...

.

.

:
) :
 (

:

:

:

:

.

.

:

:

.

.

.

.

.

.

.

:

:

:

.

.

.

483

:

:

):

.(= =

:

: () .

()

.

()

) ..

(

.

()

.

()

.

()

.

.

.

:

:

.

.

..

.

/

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

:

(2001-1966)

5_{\pm}

48

52

.

(/) (/)

.

:

.

)

(

()

.

:

:

()

(761)

.

:

:

.

.

.

:

:

:

(587-549)

.

(729-661)

.

.

.

.

:

-

:

-

-

.

:

(...)

.

.

.

.

•

•

•

•

•

•

•

•

()

()

:

.

.

$$\begin{array}{ccc} & : & : \\ (& &) \\ & (&) \end{array}$$

“ () ”

“ ”

• • •

$$\vdots$$

•

$$\vdots$$

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

:

\

:

:

.

.

:

:

.

.

.

.

Alleles

HLA-B27

Study Of Liver Function In Normal
And Viral Hepatitis Patients

... :

Assignment The Alleles Of HLA –
B27 In Syria Patients With
Ankylosing Spondylitis And Other
Articular Diseases

... :

HLA-B27

Ankylosing Spondylitis

GGT, ALP, AST, ALT

ESR

C

A

CRP C

.RF

HbsAg

()

.anti HCV

Invagination Intestinale

. . . :

.

.

-

%

.

. . . :

.

.

.

.

%

.

.%

.

Multiple Myeloma

**Postaural – Surgery Infections And
Its Antibigram**

**The Early Detection Of Multiple
Myelomas By Studying The Bloody
And Electrophoretic Changes**

)

(

Renal Injury In Collagen Diseases
(Henoch Schonlien – Systemic
Lupus Erythromatous)

Radiologic Investigations In
Pediatric Hydrocephalus

% ,

% ,

%

()

**Hyperthyroidism (Etiology –
Symptoms – Diagnosis - Treatment)**

Ulcerative Syndrom

()

(

%

%

·%

%

APTT

)

(APTT

APTT

.

.

.APTT

Urethral Sphincter

)

.

... :

... :

.

.(

"

"

**Laboratory Monitoring In Patients
Treated With Heparin “And
Factors Affecting It’s Success”**

.

.

.

.

... :

.

.

.

... ..

Glue Tissue in Corneal Incisions

. . . :

9/0)

(Nylon, or 10/0 Nylon or,...

(Glue Tissue)

**Using Tramadol – Bupivacaine,
Fentanyl – Bupivacaine For Labor
And Vaginal Delivery**

**Accidental And Criminal
Intoxication By Phosphorus
Compounds**

. . . :

%

:
)
 () ()
 ()
 .()

The Gallstones And Its Management

Bacteria That Cause Urinary Infections In Pregnants And Their Antibiotic Sensitivity

% ,

(% -)

1. (1) 100% ,
 2. (2) 100% ,
 3. (3) 100% ,
 4. (4) 100% ,
 5. (5) 100% ,
 6. (6) 100% ,
 7. (7) 100% ,
 8. (8) 100% ,
 9. (9) 100% ,
 10. (10) 100% ,
 11. (11) 100% ,
 12. (12) 100% ,
 13. (13) 100% ,
 14. (14) 100% ,
 15. (15) 100% ,
 16. (16) 100% ,
 17. (17) 100% ,
 18. (18) 100% ,
 19. (19) 100% ,
 20. (20) 100% ,
 21. (21) 100% ,
 22. (22) 100% ,
 23. (23) 100% ,
 24. (24) 100% ,
 25. (25) 100% ,
 26. (26) 100% ,
 27. (27) 100% ,
 28. (28) 100% ,
 29. (29) 100% ,
 30. (30) 100% ,
 31. (31) 100% ,
 32. (32) 100% ,
 33. (33) 100% ,
 34. (34) 100% ,
 35. (35) 100% ,
 36. (36) 100% ,
 37. (37) 100% ,
 38. (38) 100% ,
 39. (39) 100% ,
 40. (40) 100% ,
 41. (41) 100% ,
 42. (42) 100% ,
 43. (43) 100% ,
 44. (44) 100% ,
 45. (45) 100% ,
 46. (46) 100% ,
 47. (47) 100% ,
 48. (48) 100% ,
 49. (49) 100% ,
 50. (50) 100% ,
 51. (51) 100% ,
 52. (52) 100% ,
 53. (53) 100% ,
 54. (54) 100% ,
 55. (55) 100% ,
 56. (56) 100% ,
 57. (57) 100% ,
 58. (58) 100% ,
 59. (59) 100% ,
 60. (60) 100% ,
 61. (61) 100% ,
 62. (62) 100% ,
 63. (63) 100% ,
 64. (64) 100% ,
 65. (65) 100% ,
 66. (66) 100% ,
 67. (67) 100% ,
 68. (68) 100% ,
 69. (69) 100% ,
 70. (70) 100% ,
 71. (71) 100% ,
 72. (72) 100% ,
 73. (73) 100% ,
 74. (74) 100% ,
 75. (75) 100% ,
 76. (76) 100% ,
 77. (77) 100% ,
 78. (78) 100% ,
 79. (79) 100% ,
 80. (80) 100% ,
 81. (81) 100% ,
 82. (82) 100% ,
 83. (83) 100% ,
 84. (84) 100% ,
 85. (85) 100% ,
 86. (86) 100% ,
 87. (87) 100% ,
 88. (88) 100% ,
 89. (89) 100% ,
 90. (90) 100% ,
 91. (91) 100% ,
 92. (92) 100% ,
 93. (93) 100% ,
 94. (94) 100% ,
 95. (95) 100% ,
 96. (96) 100% ,
 97. (97) 100% ,
 98. (98) 100% ,
 99. (99) 100% ,
 100. (100) 100% ,
 101. (101) 100% ,
 102. (102) 100% ,
 103. (103) 100% ,
 104. (104) 100% ,
 105. (105) 100% ,
 106. (106) 100% ,
 107. (107) 100% ,
 108. (108) 100% ,
 109. (109) 100% ,
 110. (110) 100% ,
 111. (111) 100% ,
 112. (112) 100% ,
 113. (113) 100% ,
 114. (114) 100% ,
 115. (115) 100% ,
 116. (116) 100% ,
 117. (117) 100% ,
 118. (118) 100% ,
 119. (119) 100% ,
 120. (120) 100% ,
 121. (121) 100% ,
 122. (122) 100% ,
 123. (123) 100% ,
 124. (124) 100% ,
 125. (125) 100% ,
 126. (126) 100% ,
 127. (127) 100% ,
 128. (128) 100% ,
 129. (129) 100% ,
 130. (130) 100% ,
 131. (131) 100% ,
 132. (132) 100% ,
 133. (133) 100% ,
 134. (134) 100% ,
 135. (135) 100% ,
 136. (136) 100% ,
 137. (137) 100% ,
 138. (138) 100% ,
 139. (139) 100% ,
 140. (140) 100% ,
 141. (141) 100% ,
 142. (142) 100% ,
 143. (143) 100% ,
 144. (144) 100% ,
 145. (145) 100% ,
 146. (146) 100% ,
 147. (147) 100% ,
 148. (148) 100% ,
 149. (149) 100% ,
 150. (150) 100% ,
 151. (151) 100% ,
 152. (152) 100% ,
 153. (153) 100% ,
 154. (154) 100% ,
 155. (155) 100% ,
 156. (156) 100% ,
 157. (157) 100% ,
 158. (158) 100% ,
 159. (159) 100% ,
 160. (160) 100% ,
 161. (161) 100% ,
 162. (162) 100% ,
 163. (163) 100% ,
 164. (164) 100% ,
 165. (165) 100% ,
 166. (166) 100% ,
 167. (167) 100% ,
 168. (168) 100% ,
 169. (169) 100% ,
 170. (170) 100% ,
 171. (171) 100% ,
 172. (172) 100% ,
 173. (173) 100% ,
 174. (174) 100% ,
 175. (175) 100% ,
 176. (176) 100% ,
 177. (177) 100% ,
 178. (178) 100% ,
 179. (179) 100% ,
 180. (180) 100% ,
 181. (181) 100% ,
 182. (182) 100% ,
 183. (183) 100% ,
 184. (184) 100% ,
 185. (185) 100% ,
 186. (186) 100% ,
 187. (187) 100% ,
 188. (188) 100% ,
 189. (189) 100% ,
 190. (190) 100% ,
 191. (191) 100% ,
 192. (192) 100% ,
 193. (193) 100% ,
 194. (194) 100% ,
 195. (195) 100% ,
 196. (196) 100% ,
 197. (197) 100% ,
 198. (198) 100% ,
 199. (199) 100% ,
 200. (200) 100% ,
 201. (201) 100% ,
 202. (202) 100% ,
 203. (203) 100% ,
 204. (204) 100% ,
 205. (205) 100% ,
 20

Chronic Diarrhea In Children Younger Than 2 Years Of Age

Reserch About Captopril Efficacy In Reducing Proteinuria In Patient With Glumerulonephritis

Epinephrine
% Lidocaine

(% ,)

**The Femoral Shaft Fractures In
Children Comparative Studying
Between Conservative And Surgical
Treatment**

... :

**Pleural Biopsy In Diagnosis Of
Exudate Effusions**

... :

Dermatomyositis

...
...
" "

...
...
-

...
...

...
...
...

...

**Arcute Keratotomy To Correct
Astigmatism After Cataract
Surgery**

Intraoperative Keratometry

...
...
...

)

■

(

%

%

%

.%

■

)

(

Cardio Pulmonary Arrest

The Using Of Ketamin In Curettage

new born

retrospective

.()

Duodenal Obstruction

()

... :

Differentiated Thyroid Cancer

.

.

% ,

% ,

.

.

:

.

(% -)

Hair Transplantation

%

.

.

.

%

)

+

+

(

.

TSH

.

.

.PNA

PNA

%

TSH

TSH

.FNA

.% -

:

**Acute Venous Thrombosis In
Behcet’s Disease**

**Radiologic Diagnosis Of The
Esophageal Tumors**

**The Medical Decreasing Effect For
Intraocular Pressure In Primary
Open – Angle Glaucoma**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
22

Clonidine For Spinal And Epidural In Gynecology

Cases That We Use N₂O And Cases We Don't Use It

N₂O

N₂O

N₂O

()

.Epidural + Spinal

B₁₂

**Glomerular Involvement In
Systemic Lupus Erythematosus**

**Medical Imaging Of Focal Liver
Lesions**

% - %

%
%
%
DNA

%

%

Management Of Breast Cancer

Cardiac Lesions In Metabolic Disturbances

()

)

(

.(

)

(

The Management Of The Lower Ureter Calculi

Tuberculosis Of Head And Neck Tuberculosis Of Cervical Lymph Node

()

)

NBT

% -

**Clinilcal Manifistations In Children
With Immunodeficiency**

()

**The Anatomical Variations Of The
Middle Cerebral Artery**

.T

**The Regional Norms Of Permanent
Teeth Eruption And Their Affected
Factors**

DMFT

(WHO)

Fjohnston And Bol Ton Analysis

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{5}$
 $\frac{1}{6}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{8}$
 $\frac{1}{9}$
 $\frac{1}{10}$
 $\frac{1}{11}$
 $\frac{1}{12}$
 $\frac{1}{13}$
 $\frac{1}{14}$
 $\frac{1}{15}$
 $\frac{1}{16}$
 $\frac{1}{17}$
 $\frac{1}{18}$
 $\frac{1}{19}$
 $\frac{1}{20}$
 $\frac{1}{21}$
 $\frac{1}{22}$
 $\frac{1}{23}$
 $\frac{1}{24}$
 $\frac{1}{25}$
 $\frac{1}{26}$
 $\frac{1}{27}$
 $\frac{1}{28}$
 $\frac{1}{29}$
 $\frac{1}{30}$
 $\frac{1}{31}$
 $\frac{1}{32}$
 $\frac{1}{33}$
 $\frac{1}{34}$
 $\frac{1}{35}$
 $\frac{1}{36}$
 $\frac{1}{37}$
 $\frac{1}{38}$
 $\frac{1}{39}$
 $\frac{1}{40}$
 $\frac{1}{41}$
 $\frac{1}{42}$
 $\frac{1}{43}$
 $\frac{1}{44}$
 $\frac{1}{45}$
 $\frac{1}{46}$
 $\frac{1}{47}$
 $\frac{1}{48}$
 $\frac{1}{49}$
 $\frac{1}{50}$
 $\frac{1}{51}$
 $\frac{1}{52}$
 $\frac{1}{53}$
 $\frac{1}{54}$
 $\frac{1}{55}$
 $\frac{1}{56}$
 $\frac{1}{57}$
 $\frac{1}{58}$
 $\frac{1}{59}$
 $\frac{1}{60}$
 $\frac{1}{61}$
 $\frac{1}{62}$
 $\frac{1}{63}$
 $\frac{1}{64}$
 $\frac{1}{65}$
 $\frac{1}{66}$
 $\frac{1}{67}$
 $\frac{1}{68}$
 $\frac{1}{69}$
 $\frac{1}{70}$
 $\frac{1}{71}$
 $\frac{1}{72}$
 $\frac{1}{73}$
 $\frac{1}{74}$
 $\frac{1}{75}$
 $\frac{1}{76}$
 $\frac{1}{77}$
 $\frac{1}{78}$
 $\frac{1}{79}$
 $\frac{1}{80}$
 $\frac{1}{81}$
 $\frac{1}{82}$
 $\frac{1}{83}$
 $\frac{1}{84}$
 $\frac{1}{85}$
 $\frac{1}{86}$
 $\frac{1}{87}$
 $\frac{1}{88}$
 $\frac{1}{89}$
 $\frac{1}{90}$
 $\frac{1}{91}$
 $\frac{1}{92}$
 $\frac{1}{93}$
 $\frac{1}{94}$
 $\frac{1}{95}$
 $\frac{1}{96}$
 $\frac{1}{97}$
 $\frac{1}{98}$
 $\frac{1}{99}$
 $\frac{1}{100}$

()

• •

—

•

—

1

—

•

•

—

—

•

—

•

—

•

•

$$.Y = 5.38 + 0.5 (x) :$$

■

•

$$.Y = 4.93 + 0.52 (x) :$$

■

•

)

(

Detection Of Mercury Resulting From Amalgam Restoration In

Effects Of Osteoporosis On Oral Bone Resorption After Teeth Extraction Using (DEXA)

Effects Of Some Dentin Vonding

% ,

: -

**Effect Of Fixed Orthodontic
Appliances In Dental Caries**

Overdentures

**Clinical Comparison Of
Masticatory Performance Of
Patients With Overdentures And
Conventional Complete Dentures**

D1MFs

: (-)

: -

Clinical Study About Anterior Adhesive Resin Bonded Bridge

()
A Comparison Of Microleakage Of %

. % ,

Thermafil

Adhesive Posterior Bridges And The Effect Of Adhesive Materials

.

.

:

.

.

:

:

()

-

-

-

/

.

.

**Laboratory Study Of The Accuracy
Of Dental Impression Materials**

**Clinical Comparison Between
Conventional And Fluoride –
Releasing Pit And Fissure Sealants**

.

.

.

... :

.

... :

.

.

**Clinical Evaluation Of Posterior
Composite Restorations**

**A Comparison Between
Formocresol Pulpotomy With
Electrosurgical Or Ferric Sulfate
Pulpotomy**

Degufil H, Tetric Ceram,
Spectrum, Prodigy
.Tytin

Steriomicroscope

**Topical Metronidazole Application
In Treatment Of Rapidly
Progressive Periodontitis**

.....

(-)

./ /

:

Elyzol : -

..... (-)

%

: - % ,

-)

(-

.%

-

Effect Of Luting Agents On The Marginal Adaptation Of Cast Restorations

.

. . . :

Clinical Study About Peri Apical Lesions Healing By Using Several Calcium Hydroxide Based Root Canal Sealer

.

:

.

.

-

. . . :

.

-

.()

-

.

.()

-

.

-

:

Apexit – CRCS – Sealapex – ZOE

.

-

.

()

.

:

-

.%

-

.%

Hydatid Cyst Disease

.%

-

Influence Of Saponin And Flavonoied On The Dissolution Of Pharmaceutical Solids Forms

pH

.pH=8

%

%

%

% ,
%

% , % ,

% , % ,
. % ,

تشخيص ومعالجة العقم

Diagnosis & Management of Infertility

السندباد النظامي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عماد الدين تنوخي

إن العقم من أهم مواضيع البحث في مجال اختصاص التوليد وأمراض النساء، لذلك تم تسليط الضوء على التعريف الجديد لهذا المصطلح والطرق الحديثة المستخدمة في تقييم العقم عند المرأة وعند الرجل وضرورة اتباع خطة منهجية أكاديمية في تحري أسباب العقم.

تم التعريف بالمعالجات:

- تنشيط النطاف وحقتها داخل الرحم IUI.
- طريقة الإلقاح خارج الرحم IVF والـ ICSI، وتوقيت اتباع هذه الطرق مع مراعاة تكاليفها الباهظة على المرضى، وبالتالي اتباع الأسلوب المفيد علمياً، والمريح اقتصادياً للمريض، بشرط الحصول على أفضل النتائج.

العقم (تحري الإباضة)

Infertelity

(Investigation of Ovulation)

مزينة عمايري

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عماد الدين تنوخي

من خلال دراستنا التي أجريت في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي لسنة ١٩٩٨-١٩٩٩ تبين:

- هناك تأثير واضح لفطر برولاكتين الدم على كل من الإباضة ووظيفة الجسم الأصفر ولقد ازداد هذا التأثير عند ترافق

فطر برولاكتين الدم مع ثر الحليب.

- مخطط الحرارة الأساسي وسيلة مساعدة فقط في تشخيص الإباضة ولا بد من الاستعانة بعبارة بروجسترون المصل أو خزعة الطور اللوتيني لتشخيص قصور الطور اللوتيني.

- إن التوافق بين مشعر مخاط عنق الرحم وعبارة بروجسترون المصل في تشخيص الإباضة بلغ ٨٠,٨% (باعتبار عيار بروجسترون المصل هو الأساس) و٦٥,٦% (باعتبار مشعر مخاط العنق هو الأساس).

- اختبار ما بعد الجماع الإيجابي يترافق في ٨٧,٥% مع مشعر مخاط إباضي و١٢,٥% مع pH قلوي.

- اللطاخة المهبليّة شأنها شأن مخطط الحرارة الأساسي وسيلة مساعدة يمكن الاستعانة بها.

الأمواج فوق الصوتية لها دور واضح ودقة عالية في تشخيص الإباضة وهكذا فإن الأمواج فوق الصوتية ومشعر مخاط باليوم ١٢-١٤ هي الأفضل في تشخيص الإباضة.

انبثاق الأغشية الجنينية الباكر

Premature Rupture of Membranes

باسم بركات

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. خالد مرعشلي

- انبثاق الأغشية الباكر: هو كل سيلان أمنيوسي لتمزق أغشية عفوي حدث خارج المشفى قبل بدء التقلصات الرحمية المنتظمة بساعة أو أكثر.
- بلغ المجموع الكلي للولادات خلال عام

الإسعاف في مشفى المواساة واستغرقت سنتين وتناولت ١٣٤ حالة مرضية شخص لهم انسداد الأمعاء وأجري لهم عمل جراحي. وقد تبين أن أكثر أسباب الانسداد شيوعاً في بلدنا هي الفتوق وشكلت ما نسبته ٤١ % من الحالات وهي نسبة مرتفعة جداً، ثم تلتها الالتصاقات واللحم، ثم قسّمت الدراسة العينة إلى فئات عمرية وقامت بدراسة أسباب الانسداد في كل فئة على حدة. وأخيراً تناولت الدراسة التدبير الجراحي لكل سبب من أسباب الانسداد وأنواع العمليات الجراحية التي أجريت له.

تنظير عنق الرحم المبكر Colposcopie

الدكتور باسم عشمه
كلية الطب البشري - جامعة دمشق
إشراف: أ.د. صلاح شبيخة
وبمشاركة: أ.د. جميل طالب

١ - القسم النظري:

وتضمن مقدمة - لمحة تاريخية - الهدف من الرسالة - الأسس النسيجية لتنظير عنق الرحم المبكر والمصطلحات التنظيرية - الأسس الخلوية الطبيعية والشاذة لعنق الرحم - المناظر التنظيرية الطبيعية والشاذة - التهاب عنق الرحم - منطقة التحول الشاذة - منطقة التحول الطبيعية - التشتت العنقي - السرطان داخل البشرة - سرطان عنق الرحم الغازي وعوامله الإمبراضية - تدبير اللطاخة الشاذة وتطبيقات تنظير عنق الرحم وأهميته - والتطبيق العملي لتنظير عنق الرحم المبكر في الممارسة السريرية - معالجة تشوهات العنق

كامل ١٥٢٧٠ ولادة. وكان عدد حالات تمزق الأغشية الباكر المقبولة في المشفى في الفترة نفسها هو ٨,٥ حالة أي بنسبة ٥,٢ %. ودخلت الدراسة ٢١٣ حالة بسن حمل أكبر أو يساوي ٣٦ أسبوعاً. كما دخل دار التوليد ٨١ مريضة من أصل ٨,٥ أي بنسبة ١٠ % بتشخيص تمزق أغشية باكر قبل الأسبوع ٣٦ من مجمل المريضات. غالباً ما يكون التدبير الأسلم لحالات الـ Prom أكبر من ٣٦ أسبوع من عنق غير ناضج وغير قابل للتحريض هو التدبير المحافظ أي انتظار بدء المخاض العفوي.

في حالة (الـ Prom < ٣٦) أسبوع وعند غياب الخمج الأمينوسي يشكل الخداج الخطر الأكبر على الجنين.

التدبير الجراحي لانسداد الأمعاء عند البالغين

The Surgical Management of Intestinal Obstruction in Adult

عبد الرحمن حمادية
كلية الطب البشري - جامعة دمشق
إشراف: أ.د. عبد الغني الشلبي

تعد حالة انسداد الأمعاء من الحالات الإسعافية الهامة التي تواجه الطبيب في مراكز الإسعاف، سواء أكان ذلك من ناحية التشخيص أم التدبير. لذلك تناولت هذه الدراسة تدبير انسداد الأمعاء الجراحي عند البالغين، وقد جرت هذه الدراسة في قسم

داخل الظهارة - المحافظة الجراحية.

٢ - القسم العملي:

تضمن طريقة إجراء تنظير عنق الرحم المتبعة في الدراسة والإستشارة الخاصة بالتنظير - استطبابات تنظير عنق الرحم الكبير.

مناقشة الموجودات التنظيرية حسب: عمر المريضة - سن الزواج - عدد الولادات بالتنظير - استطبابات تنظير عنق الرحم الكبير.

مناقشة الموجودات التنظيرية المختلفة:

- مناقشة الموجودات التنظيرية الطبيعية.
 - دراسة حالات عسرة التصنع المشخصة بالتنظير والموجودات التنظيرية المختلفة.
 - دراسة مقارنة بين نتائج الفحص الخلوي "الطاخة" والتنظير الكبير والفحص النسجي ودور تنظير عنق الرحم الكبير في توجيه إجراء الخزعة المخروطية.
- واختتمت الدراسة بتوصيات هامة بما يخص البحث.

العمر والجنس وتوزع الإصابة الفصلي ودراسة ترافقه مع أدواء أخرى، مع دراسة مخبرية ونسجية ودراسة علاجية لعدد من مرضى هذا الداء.

تضمنت الدراسة ١٩٢ مريضاً تراوحت أعمارهم بين ٧ أشهر و ٦٩ سنة منهم ١١٤ أنثى و ٧٨ ذكراً.

وتوصلنا إلى افتراض وجود عوامل بنيوية تساهم في إحداث الداء إضافة إلى كشف صلته بالصداف مع مشاهدة موجودات تشريحية مرضية غير مذكورة سابقاً، وعلاجياً لوحظت فعالية حالات الوسوف في تدبير الداء وبدون اللجوء للكورتيزونات كخط علاج أول.

دراسة وبائية (حالة - شاهد) لعوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية (الداء القلبي الإكليلي)

A Case – Control Study of Cardiovascular Diseases (Coronary Heart Disease) Risk Factors

عبير قدسي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. أحمد ديب دشا

هدف الدراسة

دراسة وجود وارتباط مجموعة من عوامل الخطر الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية والصحية والبيئية التي يمكن أن ترفع من خطر احتمال وقوع الداء القلبي الإكليلي.

الطرائق: دراسة حالة - شاهد في مشغفين للجامعة تم فيها أخذ حالات لديها إحتشاء أو خناق لأول مرة وشواهد وهم من مراجعي الشعبة الجراحية بدون أعراض أو تبدلات تخطيطية تشير لوجود CHD، وتم إجراء تحليل وحيد المتغيرات Univariate analysis

السعفة الاميانتية

Tinea Amiantacea

مهند حسن الملقب زغير

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صالح داود

السعفة الاميانتية Tinea Amiantacea داء جلدي يتصف بوسوف سميكة على الفروة تشبه الاميانت (الاسبستوز)، ورغم الوصف السريري المحدد جيداً فلم تكتشف إمراضية محددة له كما لم ينل حقه من الدراسة والبحث فقمنا بإجراء دراسة تهدف إلى تقييم شامل عن حدوث وانتشار الداء وتوزع إصاباته حسب

وعدد المتغيرات Multivariate analysis.

بعنف.

النتائج

كان عدد أفراد الدراسة ٥٣٤ شخص، توزعوا إلى ٢٥٧ حالة و ٢٧٧ شاهد. ولوحظ بالتحليل وحيد المتغيرات ارتباط متعدد إحصائياً بين خطر تطور الـ CHD والأعمار بين ٦٠- ٦٩ سنة ($OR = ١,٧٢$) والجنس ($OR = ٠,٦٩$) والمستوى العالي للتعليم ($OR = ٢,٤٨$)، وارتباط مماثل مع المتزوجين ($OR = ٦,٥٠$) ومن يعملون أكثر من ٤ أفراد ($OR = ١,٠٢$) ومن يعملون لأكثر من ٢٥ سنة ($OR = ١,٩$) والذين لا يملكون بيوتهم ($OR = ١,٩١$). كما ارتبط الخطر مع التدخين الشديد ($OR = ١,٩٢$) وطول مدة التدخين والبدة به بأعمار مبكرة ($P < ٠,٠٠٥$) وتناول مانعات الحمل ($OR = ١,٢٦$) والنشاط الفيزيائي ($OR = ٠,٧٤$) ووجود قصة ارتفاع التوتر ($OR = ٥,٨$) وعدم وجود علاج له ($OR = ٢,١٩$) واستخدام حاصرات بيتا لمعالجته ($OR = ٠,٦٥$) وقصة داء سكري ($OR = ٦,١$) ووجود قصة عائلية للأمراض قلبية وارتفاع التوتر ($OR = ٢,٢٠ - ٢,٧٦$). مع علاقات معتدة مع قيم $\leq \text{Chol} ٢٠٠$ مع/دل وقيم $\leq \text{Chol} ١٦٠$ مع/دل وقيم $\leq \text{HDL} ٣٥$ مع/دل وقيم الفيبيرينوجين ≤ ٣٠٠ مع/دل وبنسب أرجحية ($٢,٩٦ - ١,٦٩ - ٣,٥$) على التوالي. وبالتحليل عديد المتغيرات بقيت العلاقة معتدة مع العمر والجنس ومدة العمل والتدخين والنشاط الفيزيائي ووجود قصة ارتفاع في التوتر وعدم علاجه ووجود قصة داء سكري والقصة العائلية والتعرض لقيم عالية من Chol و LDL وفيبيرينوجين المصل. مما يقترح أهمية التعرف على خصائص جميع عوامل خطر الـ CHD في الجهرة ببلادنا كخطورة هامة في استراتيجيات الوقاية من مرض بغزو بلادنا

سرطان عنق الرحم ومعالجته

Cervical Cancer and Its Treatment

عدنان الحاج

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صلاح شيخة

يعد سرطان عنق الرحم مشكلة عالمية أخذت في طريقها إلى الزوال، وهو من السرطانات الممكنة الوقاية بإجراء اللطاخة الخلوية. وقد أجريت دراسة عملية على هذا الداء في مشفى دار التوليد الجامعي، كانت عبارة عن دراسة إحصائية راجعة لـ ١٧٤ مريضة تم قبولهن في المشفى خلال ٨ سنوات من ١٩٩٠/١/١ وحتى ١٩٩٨/١٢/٢٥.

وجد من خلال الدراسة أن نسبة الحدوث هي ١٠٠/٣٩ ألف مريضة بعمر وسطي بلغ ٤٩،٤٣ سنة. وقد تصدرت مدينة دمشق وريفها التوزيع الجغرافي، حيث وصلت نسبة الإصابة فيها إلى ٣٤%، وقد سيطر النزف عقب الجماع كعرض سريري بنسبة ٢٦،٥%. صُنفت معظم الحالات سريريا كمرحلة I بنسبة ٤٧،١% وشكلت الكارسينوما شائكة الخلايا فيها ٨٥% بنمط شائع للكارسينوما كبيرة الخلايا غير المتقرنة. عولجت ٢٣،٧% من المريضات جراحياً فقط بينما تلقت ٤٤،٨% الأشعة قبل أو بعد الجراحة. وخضعت ٢٢،٤% للأشعة فقط. شوهد الداء في سياق الحمل بنسبة ٢،٣%. تعتبر العقد اللمفية والهامش الجراحي من أهم عوامل الإنذار للسرطان. وقد بينت الدراسة إصابة العقد اللمفية المستأصلة أثناء الجراحة في ٢٠% للمرحلة I و ٣٧،٥% للمرحلة II، في حين بدا الهامش الجراحي مصاباً في ١٠،٧% للمرحلة I و ٢٠% للمرحلة II. وأظهرت متابعة ١٥١ مريضة خلال ٨

بذلك يساهم التصوير الطبقي المحسوب بالمقام الأول في إتخاذ القرار الجراحي العصبي الإسعافي لمرضى رضوض الرأس والأذيات الرضية للدماغ.

المضاعفات الجراحية بعد زرع الكلية في مشفى المواساة

Surgical Complications After Renal Transplantation At Al-Mouassat Hospital

مالك الغيث

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عصام العجيلي

إن عملية زرع الكلية كغيرها من العمليات الجراحية قد تظهر لها مضاعفات. وبهذه الدراسة التي قامت على ٢٩٨ مريضاً أجري لهم زرع كلية في وحدة زرع الكلية بمشفى المواساة بدمشق من عام ١٩٨٥ حتى ١٩٩٩ حصل لدى هذه المجموعة عدة مضاعفات تقارب بنسبتها ما حصل في الدراسات العالمية، وهي النواسير البولية، القليلة اللمفاوية، تضيق الحالب، الخثار الوريدي، خمج الجرح، الورم الدموي. وقد تم تدبير جميع هذه المضاعفات جراحياً وتم شفاء المرضى. كما نذكر بأن نسبة هذه المضاعفات قد قلت بشكل ملحوظ في الأعوام الأربعة الأخيرة مما يدل على تنامي خبرة فريق زرع الكلية بمشفى المواساة.

خزاع الرغامى

Tracheostomy

أنس الحريري

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أكرم الحجار

إن خزاع الرغامى هو إجراء، الهدف منه خلق

سنوات أن نسبة الأحياء ٥٩,٩٦% ونسبة الوفيات الناجمة عن السرطان ٢٥,٨٣% بمعدل بقاء إجمالي لخمس سنوات ٠,٥٦. وقد حدث النكس بنسبة ٢%.

التصوير الطبقي المحوري المحسوب في أذيات الدماغ الرضية

Computed tomography in Brain Injuries

أحمد الاتاسي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. بسام الصواف

بعد التصوير الطبقي المحسوب C.T SCAN الطريقة المفضلة خصوصاً في دراسة كل أذيات الرأس الحادة، فأزمنة الفحص قصيرة، ويتم تحديد النزف داخل القحف بشكل جيد، وتبدو كسور الجمجمة مباشرة، أيضاً يمكن مراقبة المرضى غير المستقرين بسهولة. ولا حاجة لتطبيق المادة الظليلة وريدياً في هذا السياق.

يجري تصوير الشرايين الدماغية من حين لآخر لاستقصاء أذيات الشرايين السباتية أو الفقرية. في حال وجود رض نافذ للعنق، أو لاستقصاء السباتيين في رضوض العنق الكلية، أو في حال كسور قاعدة الجمجمة، أيضاً للطبقي المحسوب هنا دور في التوجيه لهذا الاستقصاء، كما يمكن للطبقي المحسوب المحلزن CT SPIRAL أن يقوم بالدراسة الوعائية هذه بكفاءة.

وحديثاً يقوم التصوير الوعائي بالمرنان MRA بدور واعد في هذا المقام.

وفي الحالات غير المفسرة على الطبقي المحسوب فقد يكون المرنان MRI مفيداً أحياناً، مثل نزوف جذع الدماغ. كما أنه مفيد أيضاً في تحديد آفات التمزق الرقيقة ضمن الدماغ، وفي تقييم الدماغ في رضوض الرأس البعيدة.

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. هند الدغلي

هبوط الضغط المُرَاقب تقنية تخديرية تسمح للطبيب بإنقاص الضغط الدموي بشكل انتخابي، وبالتالي ينقص الحاجة إلى نقل الدم و/أو يحسن قابلية الرؤية للجراح لكي ينجز الطرق الجراحية الدقيقة.

- المجموعة الأولى: (٣٥ مريضاً) أُجري لهم تبديل مفصل ورك، وتمّت دراسة تأثير الإيزوفلوران لوحده بالمقارنة مع مشاركته بالنتروغليسرين.
- المجموعة الثانية: (٢٥ مريضاً) أُجري لهم استئصال حنجرة، وتمّت دراسة تأثير الإيزوفلوران.
- المجموعة الثالثة: (١٥ مريضاً) أُجري لهم استئصال أم دماغية، وتمّت مقارنة النتروبروسايد مع النتروغليسرين.

في المجموعة الأولى والثانية نقصت كمية النزف عند تطبيق الإيزوفلوران مقارنة بالمجموعة الشاهدة، وقد نقصت أكثر بمشاركة الإيزوفلوران مع النتروغليسرين، كذلك في كلا المجموعتين حدث نقص في زمن العمل الجراحي.

في المجموعة الثالثة ساعد استخدام النتروغليسرين والنتروبروسايد في تأمين ساحة عمل جراحي واضحة أثناء تطبيق الملقط على عُلق أم الدم، وبالتالي سهّل استئصالها ومنع من حدوث نزف هام أثناء ذلك.

سرطانات الوجه البشرية اللاصبغية

Non Melanotic Skin Cancers of the Face (NMSC)

أحمد مصطفى

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أكرم الحجار

فتحة في مقدّم العنق تصل بين الجلد والרגامى، لتأمين طريق هوائي كافٍ في حالات إسعافية معيّنة. ويجب أن يُجرى خزع الرغامى في العمليات، وتحت ظروف عقيمة، وتحت التخدير العام ما أمكن، وإجراء تجربة التنبيب الرغامى قبل الخزع.

قد تحدث مضاعفات بعد الخزع منها ما يحدث باكراً أو بعد الجراحة مثل: النزف، الصمة الهوائية، توقف القلب والتنفس، حدوث ربح تحت جلد العنق، أو ربح صدرية، والنواسير الرغامية الشريانية و الرغامية المرينية، ومنها ما يحدث متأخراً بعد أسبوع تقريباً من الخزع كتضييق الرغامى، النواسير الرغامية الجلدية، مشكلات تتصل بالأنبوب الرغامى والندبات في العنق.

من خلال الدراسة التي أجريت في الشعبة الأذنية بشكل راجع خلال خمس سنوات من سنة ١٩٩٥ حتى نهاية عام ١٩٩٩ تبين أن خزع الرغامى قد أُجري لـ ٢٥٣ حالة وكان منهم ٢١١ ذكراً و ٤٢ أنثى، وظهر أن العمر السائد يكون بين الـ ٥٠-٧٠ سنة. كما تبين أن السبب الأكثر شيوعاً للخزع هو ورم الحنجرة ٦٩%.

حدثت المضاعفات بنسبة ٣٥% تقريباً عند المرضى وكانت غالبيتها تتمثل: بالنزف أو بتوقف القلب والتنفس، أو بتضييق الفتحة الرغامية لاحقاً.

أخيراً، وبمقارنة النسب التي حصلنا عليها من البحث تبين أن بعض النسب كانت قريبة من النسب العالمية والبعض الآخر يختلف بسبب طريقة التدبير أو أسلوب التكنيك الجراحي المُجرى.

هبوط الضغط المُرَاقب

Deliberate Hypotension

لولوة شمسي باشا

وبمشاركة: أ.د. مأمون السمان

بعد سرطان الجلد من أشيع السرطانات التي تصيب الإنسان ويبيد تزايداً في معدل وقوعه وتصيب الغالبية العظمى من سرطان الجلد المناطق المعرضة للشمس وأهمها الرأس والعنق وخصوصاً الوجه، وأشيع أنماطه النسيجية هو السرطانة قاعدية الخلايا تليها السرطانة شائكة الخلايا. تضمن الدراسة النظرية لمحة جنينية عن تطور الوجه مع لمحة موجزة عن تشريح الوجه ومن ثم درست بعض الآفات ما قبل السرطانية مع دراسة سرطان الجلد اللاصباغي من حيث وبائياته والعوامل المؤهبة له وتصنيفه النسيجي وتظاهراته السريرية وتصنيفه السريري الدولي وتدبيره. أجريت الدراسة على ٤٢٥ مريضاً بين عام ١٩٨٧ و ١٩٩٧ وكانت ذروة الحدوث في العقد السادس والسابع وتزايد النسبة مع تقدم العمر. الذكور ٥٨% والإناث ٤٢%، العرض الرئيسي قرحة جلدية لا تشفى بالمعالجة التقليدية وتركزت معظم الإصابات في منطقة منتصف الوجه وخصوصاً الأنف ٥٠% من الحالات. تم تدبير الغالبية العظمى من الحالات جراحياً مع الترميم في زمن واحد، وطبقت المعالجة الشعاعية المتممة عند عدد قليل من مرضى الحالات المتقدمة وسجلت مضاعفات قليلة أثناء المتابعة أهمها النكس ١٦% والتشوه نتيجة الاستئصال الواسع وبعض حالات فشل الطعوم والشرائح المستخدمة في الترميم.

الحاصة البقعية

Aloppecia Areata

فلك بركات

كلية الطب البشري - جامعة دمشق
إشراف: أ.د. صالح داود

الحاصة البقعية داء جلدي يتصف سريراً بظهور بقعة أو عدة بقع خالية من الأشعار. لم تعرف إمراضيته بشكل واضح وتتهم حالياً العوامل الوراثية والمناعية والغدية والنفسية والأخماج والرضوض. شمل هذا البحث دراسة سريرية ومخبرية وتشريحية مرضية ورمضانية لـ ١٥٠ مريضاً من مراجعي مشفى الأمراض الجلدية والزهرية بجامعة دمشق في الفترة ما بين كانون الثاني ١٩٩٨ وكانون الأول ١٩٩٩.

بلغ معدل الحدوث السنوي حوالي ١% ومتوسط عمر البدء ٣٥ سنة، وأظهرت الدراسة وجود اضطرابات في وظائف الدرق في ٧ مرضى ١٦,٦٦% وكانت موجودات التآلق المناعي غير نوعية.

أما بالنسبة للدراسة النسيجية فقط أظهرت رشاحة التهابية حول الجريبات الشعرية. ولا تعرف حتى الآن معالجة مرضية رغم تعددها.

لمفوما المعدة

Gastric Lymphoma

وائل البرازي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق
إشراف: أ.د. يحيى حمادة الخياط

أجريت دراسة عملية لواقع اللمفوما المعدية في سورية خلال الأعوام الخمسة (١٩٩٥-١٩٩٦-١٩٩٧-١٩٩٨-١٩٩٩) ركزت الدراسة على اللمفوما المعدية البدئية كونها جزءاً من أورام المعدة الخبيثة متضمنة لمحة تشريحية - نسيجية - فيزيولوجية للمعدة ثم البحث في مجال سرطانات المعدة عموماً بمظاهرها السريرية وأنواعها النسيجية

دراسة سريرية عن استخدام القناع الحنجري عند الأطفال

Clinical Study About Using Laryngeal Mask in Pediatrics

شذا المحسن

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. منى عباس

يعد الحفاظ على سلوكية الطرق الهوائية من أهم وأول المهارات التي يكتسبها الأطباء المخدرون، لذلك تم تطوير عدة أساليب الغاية منها وصل الطريق الهوائي التنشرجي مع الطريق الصناعي، واستمر البحث عن طريق هوائي مثالي بحيث يتغلب على انسداد الطريق الهوائي بسرعة وسهولة دون أن يكون راضاً. وبأخذ مشكلات النبيب الرغامي والقناع الوجهي بعين الاعتبار، قام الدكتور A. I. J. Brain بمقارنة من نوع جديد، القناع الحنجري Laryngeal mask يرمز له اختصاراً LM فبدلاً من تطبيق القناع على الوجه قام بتصغير حجمه وتطبيقه عند مدخل الحنجرة.

شملت هذه الدراسة ١٨٢ طفلاً تم إجراء عمل جراحي لهم في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق وذلك خلال عامي ١٩٩٨-١٩٩٩. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى تقييم المرضى قبل العمل الجراحي، التدبير التخديري، المراقبة والصحو. وقد أضيف في النهاية قسم صغير للبحث في النتائج والتوصيات.

كان عدد الذكور ١٢٠ طفلاً وعدد الإناث ٦٢ طفل امتدت أعمارهم من حديثي الولادة إلى عمر ١٢ سنة.

أورام العظام الخبيثة

Malignant Tumors of Bone

محمد لؤي الخطيب

وطرائق تشخيصها وعلاجها. وقد تبين بالدراسة الإحصائية أن لمفوما المعدة البدئية تشكل حوالي ٣,٥% من سرطانات المعدة أي بشكل قريب من النسبة العالمية وهي ٤%، عزي ذلك في هذه الدراسة إلى عدة عوامل منها عدم متابعة المريض بعد العمل الجراحي. وبينت الدراسة أيضاً أهمية المعالجة المتبعة للمفوما المعدة وخاصة المعالجة الشعاعية وكيفية تطبيقها ومضاعفاتها.

خلصت الدراسة بالنهاية بنتائج وتوصيات هامة للتشخيص والمعالجة والمتابعة.

مضاعفات فغر الكولون عند الأطفال

Colostomy Complication in Children

مجدي أبو عابد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. يحيى حمادة خياط

تمت الدراسة على مرضى مشفى الأطفال بجامعة دمشق الذين أجري لهم عمليات فغر الكولون خلال الأعوام ٩٦-٩٧-١٩٩٨، حيث تم جمع المعلومات من سجلات المرضى ودفاتر العمليات، وبعد ذلك تم إجراء تحليل وتنظيم للمعلومات ووضع جداول خاصة توضح أهم الاستطبابات لعمليات فغر الكولون في مشفى الأطفال، والظروف المرافقة لكل عملية والتكنيك الجراحي المستخدم بعد ذلك. تم إحصاء المضاعفات ونسبة حدوثها ثم تمت دراسة كل مضاعفة على حدة، وتحليل المعلومات المرافقة لمعرفة عوامل الخطورة المؤدية لحدوث مثل هذه المضاعفة.

أجريت مقارنة مع دراسات عالمية مشابهة، ثم وضعت نتائج هذا البحث والتوصيات من أجل الإقلال من حدوث هذه المضاعفات.

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.م. د. مروان موسى

تم إجراء البحث على مئة مريض مصابين بأنواع مختلفة من الأورام العظمية الخبيثة وقد تمت دراسة الحالات حسب مايلي:

- ١- حسب الجنس: نسبة إصابة الذكور أعلى من الإناث بمرة ونصف تقريباً.
- ٢- حسب العمر: ذروة الإصابة بين (١٥ - ١٩) سنة وتقل بعد سن ٦٩ سنة.
- ٣- التوزع الجغرافي: أكثر المحافظات إصابة هي حسب الترتيب: القنيطرة - دير الزور - طرطوس - اللاذقية - إدلب - دمشق - الحسكة - حماه - حلب - الرقة - حمص - درعا - ريف دمشق - السويداء.
- ٤- حسب التصنيف الباثولوجي: أشيعها الانتقالات الورمية ٢٥% يليها الورم النقوي العديد بنفس النسبة تقريباً ثم باقي الأنواع حسب الترتيب:
 - Ewings - Chondrosarcoma
 - Fibrous - Osteosarcoma
 - Lymphoma - Histiocytoma
 - Fibrosarcoma.
- ٥- حسب الأعراض الأولية: أشيع عرض تورم بمنطقة الورم يليه ألم بمنطقة الورم أما الكسر المرضي فهو الأقل مشاهدة كعرض أولي.
- ٦- حسب طريقة المعالجة: نصف المرضى يتلقون معالجة مشتركة كيميائية + شعاعية ونسبة المعالجات جراحياً أو جراحة مشتركة هي ١١%.
- ٧- حسب مدة البقاء: بدءاً من العلاج: ٣٩% ٦ أشهر - ٢٩% سنة واحدة - ٢٢% سنتين - ١٠% غير محدد.

أيمن الذهب

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محسن بلال

يهدف البحث لمعرفة نسبة مشاهدة النواسير والكيسات الدرقية اللسانية بالنسبة للعمر والجنس ونتائج المعالجة الجراحية ومضاعفاتها ثم اختبار أفضل طريقة جراحية للمعالجة.

تمت الدراسة على ٧٣ حالة منها ٤٧ حالة كيسة درقية لسانية و ٢٦ ناسور درقي لساني في خلال ٧ سنوات ١٩٩٢-١٩٩٩، وذلك في مشفى الأطفال، ومشفى المواساة.

معايير الدراسة كانت: نسبة الحدوث، العمر، الجنس، التوضع، الشكل السريري، القرابة بين الوالدين، زمرة الدم، التشريح المرضي، وسيلة التشخيص، العمل الجراحي، المضاعفات، النكس.

في النتائج العملية كان الأطفال هم الأكثر إصابة تحت ١٠-١٥ سنة (٨٥%) للكيسات و ٨٣,٣% للنواسير، إصابة الإناث أكثر من الذكور في الكيسات، ومتعادلة في النواسير، أكثر الحالات كانت في المدينة ٥٨%. إن نسبة القرابة بين الوالدين كانت ٤٦,٥%، وإن ٥٠,٦% من المرضى هم من الزمرة A، وأن الشكل السريري الأشيع هو كتلة على الخط المتوسط متحركة عند مد اللسان والبلع ٧٨,٧%، كما أن معظم الكيسات والنواسير هي فوق أو عند مستوى العظم اللامي. تم التشخيص بالاستعانة بالسريريات وتخطيط الصدى وأحياناً الومضان الدرقي، وكان العمل الجراحي على الكيسة يحمل نسبة نكس ٨,٥% وتسرطن الكيسة ٥,١%.

والاستنتاجات في البحث حددت بأن هذه الآفة شائعة الحدوث عند الأطفال، ويجب إجراء تخطيط الصدى كوسيلة سهلة وسريعة، وأحياناً الاستعانة بالومضان لكل الكيسات

الكيسة الدرقية اللسانية

Thyroglossal Cysts

**استقصاء آفات الثدي بواسطة
الماموغرام والأمواج فوق الصوتية**
**Mammary Lesions Investigation by
Mammography and Echo**

رانيا خليل

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد بسام الصوّاف

يهدف البحث تسليط الضوء على استقصاءات
آفات الثدي بواسطة الماموغرام والأمواج فوق
الصوتية. فقد تم البحث في تشريح الثدي،
وطرق فحص استقصاء الثدي:

- القصة المرضية
- الفحص الفيزيائي
- تصوير الثدي الشعاعي
- الدراسة الصدىية

وبنتيجة البحث ذكرنا أنه تقريباً (١) امرأة من
(١٠) سوف يتطور لديها سرطان ثدي، وأكثر
عوامل الخطورة هي العمر والجنس.

ووراثياً تزداد النسبة (٢-٣) مرات عندما
يكون أحد أقرباء الدرجة الأولى لديه سرطان
ثدي ما قبل سنّ اليأس، كما أن خطورة
الأجيال المخلفة تتناقص مع زيادة عمر بدء
سرطان الثدي.

والعوامل التي تؤدي إلى زيادة خطورة
الإصابة بسرطان الثدي هي عدم الولادة، بدء
الطمث الباكر (قبل ١٢ سنة)، سن يأس متأخر
(بعد ٥ سنوات)، حمل أول متأخر (بعد ٣٠
سنة)، كلها على ما يبدو لها علاقة بطول
التعرض للأستروجين.

وعلى الرغم من معرفة عوامل الخطورة فإنه
حوالي ٧٥% من النساء اللواتي تطور لديهنّ
سرطان الثدي ليس لديهنّ عوامل خطورة
سابقة.

الدرقية اللسانية لنفي وجود الدرق ضمنها،
ولتجنب المضاعفات. كذلك يجب تطبيق
التقنية الجراحية بالشكل الصحيح (استئصال
القسم المركزي من العظم اللامي، ربط القناة
الدرقية اللسانية عند النقطة الأعورية) لمنع
تشكل الناسور الدرقي اللساني.

**دراسة الوظيفة الكلوية
لدى المتبرعين بالكلية**

**Study of Reanal Function in
Kidney Donors**

محمد الدندل

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد عماد عثمان

تحدث هذه الدراسة عن موضوع الوظيفة
الكلية لدى المتبرعين بالكلية، من حيث تأثير
التبرع على استئباب الوسط الداخلي للجسم،
حيث تقوم الكلية المتبقية بالمعاوضة الوظيفية
وتتلاءم مع فقد النفرونات الجسيم.

تضمنت الدراسة متبرعين بالكلية راجعوا
شعبة زرع الكلية في مشفى المواساة الجامعي
للتبرع بكلاتهم لمرضى وصلوا لمرحلة الداء
الكلوي الانتهائي من أقربائهم.

أجري للمتبرعين كل الاختبارات اللازمة قبل
التبرع، ثم راجعوا الباحث بعد مضي ثلاثة
أشهر على الأقل من التبرع بالكلية وأعيدت
الاختبارات والفحوص السابقة وتمت المقارنة
بينها.

تبين من خلال الدراسة سلامة التبرع بالكلية
وذلك بالاختيار المناسب للمتبرع بعد الدراسة
المفصلة لحالته الصحية ونفي الأمراض
العائلية التي قد تؤدي لقصور كلوي في ما
بعد.

السابقة من حيث المظهر النسيجي والأمراض. و ١٠ حالات التهاب معدة كيماوي.

تبيّن أنه من خلال دراسة مظاهر نسيجية معينة وإعطاء درجة لها لا سيما في حالة خزعات مأخوذة من أكثر من جزء تشريحي من المعدة، يمكن تحديد العامل الممرض، وبالتالي توجيه العلاج بالشكل الملائم، ومتابعته والتنبؤ بالإندثار.

التسريب الوريدي المستمر للمورفين في وحدة العناية المشددة الجراحية وبالمشاركة مع الميدازولام

Continuous Intravenous Infusion of
Morphine in the PACU and with
Midazolam

ميّاسة سعود

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد علي أرناؤوط

إن الألم بعد العمل الجراحي هو ألم حاد قابل للمعالجة إذا استطعنا تأمين طريقة مناسبة ومتوفرة.

التدبير الجاري عادةً هو وصف جرعة معينة من المخدّر تُعطى عند الحاجة إليه، وهذا ما يفقد في غالبية الأحيان إلى سيطرة سيئة على تدبير الألم بحيث تبقى التجربة الألمية هي الجزء الأبرز من معاناة قسم كبير من مرضى وحدة العناية المشددة الجراحية.

في هذا البحث تمت دراسة أهمية التسريب الوريدي المستمر للأفيون للوصول إلى التركيز الأدنى البلاسمي الفعال وتحقيق التسكين المطلوب لتجنب حدوث الارتفاع أو الانخفاض الذروي للتركيز البلاسمي.

كما درست أهمية العقاقير المسدّرة في دعم التسكين لدى المرضى في الفترة ما بعد العمل الجراحي، حيث إنه يمكن لعتبة الألم أن ترتفع بمعدّل الثلث إذا صُرف انتباه الإنسان عنه،

تصنيف وتحديد درجة التهابات المعدة حسب نظام Sydney المعدّل

Classification and Grading of Gastritis
Using the Updated Sydney System

سهير أبو عساف

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد إياد الشطي

تبدّلت خطة علاج التهابات المعدة وما يمكن أن ينجم عنها من تقرحات منذ اكتشاف العطيفات البوابية HP عام ١٩٨٢.

وقد ظهرت تصنيفات عديدة تُبنى عليها خطط علاجية قد تكون باهظة الثمن (من حيث طرائق التشخيص وأدوية العلاج) وطويلة الأمد، ثم اعتمد تصنيف Sydney عام ١٩٩٠، وتمّ تعديله عام ١٩٩٤ في اجتماع في Houston، ونُشر لأول مرة في المجلات الطبية في تشرين الأول ١٩٩٦.

تشمل الدراسة ١٩٠ حالة وردت من مشافي جامعة دمشق خلال فترة تمتدّ بين ١٩٩٧/١/١ ولغاية ١٩٩٨/١٢/٣١، المظهر النسيجي بالتلوين بـ H&E كان أساساً للدراسة، وتمّ تعديله عام ١٩٩٤ في اجتماع في Houston، ونُشر لأول مرة في المجلات الطبية في تشرين الأول ١٩٩٦.

تشمل الدراسة ١٩٠ حالة وردت من مشافي جامعة دمشق خلال فترة تمتدّ بين ١٩٩٧/١/١ ولغاية ١٩٩٨/١٢/٣١، المظهر النسيجي بالتلوين بـ H&E كان أساساً للدراسة، وتمّ تعزيزه باستخدام تلوينات خاصة حسب الحاجة.

توزّعت الحالات على شكل: ١٨٠ حالة التهاب معدة مزمن: ١٣٠ من الغار المعدي، ٢٣ من جسم المعدة، ١٨ من الغار والجسم معاً.

تمّت دراستها في كلّ من المواقع التشريحية

الحشرية، تقل نسبة مجهول السبب وتزيد نسبة الحالات المكتسبة.

يعتمد التشخيص المخبري لفقر الدم اللاتنسجي على إجراء تعداد الدم الكامل مع اللطاخة المحيطية حيث يظهر نقص في عناصر الدم الثلاث (الكريات البيض، الصفائح، الكريات الحمر) وكذلك تنقص الشبكيات أو تبقى طبيعية، بينما تظهر اللطاخة المحيطية كريات حمراء طبيعية الحجم والصباغ مع سيطرة اللمفاويات على الصيغة الكريوية. ويتم تأكيد التشخيص عبر خزعة النقي التي تبين وجود نقص خلوية شديد مع تثبيط للسلاسل النقية الثلاث (الحمراء، المحببة، النوات).

إصابات الجمجمة الرضية من وجهة نظر طبية شرعية

Traumatic Injuries of the Skull from A Medicolegal Point of View

باسل ديب

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد فوزي النجار

تعد أذيات الجمجمة من أهم الحالات الإسعافية العصبية، وتكتسب أهمية طبية شرعية من حيث كون العامل المسبب غالباً ما يكون حادث سير أو سقوط أو اعتداء بالضرب من قبل الغير، وكلها مواضيع ذات مضامين طبية شرعية. ويهدف هذا البحث إلى إعطاء لمحة نظرية عن تشريح وفيزيولوجيا وآلية الإصابات الرضية للجمجمة، بالإضافة إلى أنواع كسور الجمجمة والنزوف داخل القحف المحتملة الحدوث، والمضاعفات والعجز الدائم الذي يصادف في مثل تلك الحالات.

أما الدراسة العملية فقد أجريت على أضاير المرضى المقبولين في مشفى المواساة خلال العام ١٩٩٨ والمصابين برضوض جمجمية. تمت الدراسة على ١١٨ حالة (بعد استبعاد

كما يمكن أن ترتفع بمعدل النصف إذا استطعنا إحداث التهذبة أو التتويم عند المريض. وقد أجريت هذه الدراسة في كل من مشفى الأسد الجامعي ومشفى التوليد الجامعي على عدد من المرضى الذين هم بصحة جيدة دون سوابق إصابة بأمراض أخرى (سكري - ربو - ضغط شرياني) ودون سوابق دوائية. تمت دراسة الألم وتغيره بالحركة والسعال، كذلك درست تغيرات كل من الضغط الشرياني والنبض وتغيرات سكر الدم وغازات الدم الشرياني PaCO_2 , PaO_2 خلال ٢٤ ساعة الأولى بعد العمل الجراحي.

ظهر بنتيجة الدراسة أن التسريب الوريدي المستمر للأفيون يعد من أفضل الطرق المستخدمة لضبط الألم في وحدات العناية المشددة الجراحية، وإن إشراك المسدرات مع المسكنات أنقص كمية الأفيون المستهلكة من قبل المريض.

التقييم المخبري لفاقات الدم اللاتنسجية

The laboratory Evaluation of aplastic anemia

محمد رياض مربية

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد محجوب جبرودي

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على حالات فقر الدم اللاتنسجي عند الأطفال والبالغين وتحديد أسبابه واستعراض المقومات المخبرية الهامة التي تفيد في تشخيصه.

يعرف فقر الدم اللاتنسجي على أنه أذية الخلية الجذعية الرئيسية المولدة لعناصر الدم.

معظم أسباب فقر الدم اللاتنسجي مجهولة، في حين هي في البلدان المتقدمة حيث تكثر السموم الصناعية والإشعاعات والمبيدات

دراسة عن مضاعفات نواظم الخطا الدائمة

Complications of Perment Pacemakers

محمد حسام الرباط

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. مفيد جوخدار

تتحدث هذه الدراسة عن نواظم الخطا التي تجري زرعها لمرضى مشفى المواساة ومتابعتهم.

شملت الدراسة حالة ٦٥٢ مريضاً أجري لهم زرع ناظم خطا دائم في قسم القثطرة القلبية في مشفى المواساة في الفترة الممتدة من عام ١٩٩٠ وحتى عام ٢٠٠٠، وتمت مراجعة ملفات هؤلاء المرضى لمعرفة استتباب الزرع لديهم والمضاعفات التي حصلت لديهم بعده وكيفية معالجتها.

تبين بالدراسة أن استتبابات زرع نواظم الخطا الدائمة في هذه الحالات شملت ما يلي:

- حصر قلب تام شكل وحده ٧٤,٦%
- حصار قلب من نموذج موبينز II ٧,٦٥%
- رجفان أذيني بطيء الاستجابة ٣%
- متلازمة العقدة الجيبية المريضة sss ٤%
- استبدال ناظم سابق ١٠,٢%

أما نسب حدوث المضاعفات فكانت كالتالي:

- ١- المضاعفات الباكرة ٢,٤%
- ٢- المضاعفات القريبة ٤,٦%
- ٣- المضاعفات البعيدة ٤%

وفي النهاية تقدم الدراسة مقارنة بين نسبة هذه المضاعفات المشاهدة في مشفى المواساة والنسب العالمية إضافة لبعض التوصيات والمقترحات.

بعض الحالات)؛ وتمّ توزيع الحالات إلى مجموعات حسب العامل المسبب، والعمر، والجنس. وتمت دراسة أكثر الأعراض المصادفة شيوعاً ونسبة حدوثها، وأنواع الكسور ونسبة حدوثها، وأنواع النزوف داخل القحف ونسبة حدوثها، والمضاعفات ونسبة حدوثها مع نسب العجز الممنوحة في حالات العاهة المستديمة الناجمة عن الإصابة الرضية.

السكري والحمل

Diabetes and Pregnancy

وائل حسن

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. مروان الزيات

تهدف الدراسة إلى معرفة واقع الداء السكري في مشفى دار التوليد كنموذج عن الممارسة وفي مجتمعنا محاولين لفت النظر لجوانب القصور سواء في التشخيص أو المتابعة أو التدبير من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لمرضانا وتحسين مستوى الأداء الطبي.

بلغ توارد الداء السكري الحولي المشخص باختبار الـ GTT ٤,٣% من الحمول عامة، واتضح أن إجراء المسح عند من يحملن عوامل خطورة فقط يُغفل التشخيص لدى ٣٧,٩% من المصابات. إن نسبة هامة من المرضى تم ضبط الداء لديهم بالحمية ١٩% بالرغم من مشاكل عدم الالتزام. إن معدل القيصرية في الحمول السكرية في مشفانا بلغ ٦٠% بزيادة حوالي ٤ أضعاف عن النسبة العامة. إن أكثر المضاعفات المرافقة للحمل السكري كانت العرطلة الجنينية ٥١,٧%، وأخماج الجهاز البولي ٥٨,٦%، الولادة الباكرة ٢٩,٣%، كما كانت نسبة الوفيات حول الولادة عالية نسبياً ١٧,٦٣%.

التنبيب الأنفي عند مرضى اللوزات

Nasal Intubation in Patients with Tonsils

نرفعة رمضان

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. هند الدغلي

تضمن مخطط البحث التكلم أولاً بلمحة تاريخية وتشريحية عن التنبيب الأنفي. ولمحة فيزيولوجية عن اللوزات، ثم استطبابات استئصال اللوزات، ومضادات الاستطباب والمضاعفات، بعدها تكلمت الدراسة عن مزايا التنبيب الأنفي مع مقارنة بسيطة مع التنبيب الفموي.

أدرجت بعدها الدراسة الإحصائية بما تضمنت من عدد المرضى وصعوبات ومضاعفات التنبيب الأنفي، وصعوبات ومضاعفات التنبيب الفموي.

ثم أدرجت النتائج التي أبدت مزايا التنبيب الأنفي وفوائده واستعمالاته عند مرضى اللوزات.

واختتم البحث بأهم التوصيات الواجب اتباعها من أجل التنبيب الأنفي، ودكرت في آخر البحث المراجع المعتمدة.

التشخيص الشعاعي لأورام المثانة

Bladder Tumors

أنس أبو شعر

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد بسام الصواف

يمثل سرطان المثانة أهمية خاصة لعدة أسباب، أهمها:

- احتلاله المكان الأول في سرطانات البشرة البولية والمكان الثاني وسط

سرطانات الجهاز البولي.

- التزايد الملحوظ في انتشار أورام المثانة، حيث سجلت عام ١٩٩٥ في الولايات المتحدة وحدها ٥٠,٠٠٠ حالة سببت أكثر من ١١,٠٠٠ وفاة.

ومن جهة أخرى التطورات الكبيرة التي حصلت في طرق التشخيص والعلاج خلال السنوات الأخيرة.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على مختلف الوسائل التشخيصية الشعاعية وأهميتها في تشخيص أورام المثانة ووضع خطة المعالجة والإنذار.

استخدام البنتازوسين في تجريف

الرحم

Using Pentazocin in Curettage

أحمد عليا

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أمير درويش

تتوّعت الأساليب والطرق والعقاقير التي تُستخدم لإحداث التسكين والتخدير في العمليات الصغرى، وإحداث شروط جيدة للعمل الجراحي دون حدوث مضاعفات خطيرة مهددة للحياة.

تمت في هذا البحث دراسة استخدام البنتازوسين في عملية تجريف الرحم التي تعد من عمليات اليوم الواحد الصغرى نسبياً، والهدف منه تعيين أفضل طريقة لاستخدام البنتازوسين في تجريف الرحم. والبنتازوسين مسكن أفيوني صناعي يملك قدرة تسكينية أقل من المورفين، ويملك خصائص خاصة به من حيث تأثيره على الجهاز العصبي المركزي، الجهاز القلبي الوعائي، الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي.

أجريت هذه الدراسة في مشفى التوليد الجامعي

عموماً وللحوسبة خصوصاً. يسلك قطرنا نهج الحوسبة في السنوات الأخيرة. ومن هذا المنظور قمنا بوصف نظام ترصد داء الليشمانيات كمثال على أنظمة الترصد.

الهدف

وصف نظام ترصد داء الليشمانيات في سورية لتوثيق بنيته وعملياته ومخرجاته ولتحضيره للحوسبة المرتقبة.

الطرائق

أجريت زيارات لمستويات النظام مع مقابلة القائمين على تشغيله والإطلاع على سير العمل والوثائق المتوفرة وذلك من خلال قائمة أسئلة أعدت خصيصاً لهذا الغرض والمستقاة من وثيقة أصدرتها منظمة الصحة العالمية، وفورنت النتائج بالخصائص المعيارية لأنظمة الترصد.

النتائج

داء الليشمانيات مشكلة صحية هامة في قطرنا، والمرضى قابل للوقاية ويحظى باهتمام المنظمات الدولية ويمكن أن يؤثر سلباً على سمعة القطر سياحياً، يتألف النظام من ثلاثة مستويات، ويتم تنفيذ الخطط وجمع البيانات في المستويين المتوسط والمحيطي وأما التخطيط والتدريب وتحليل البيانات ففي المستويين المركزي والمتوسط. نظام التواصل فعال في الاتجاه الشاقولي وأقل فعالية في الاتجاه الأفقي (بين المحافظات). يتم إجمال البيانات وتحليلها وعرضها يدوياً غالباً في المستويين المتوسط والمحيطي، بينما توجد حوسبة بدائية في المستوى المركزي. يتصف النظام بالبساطة ونوعية عالية وحينية جيدة. توجد ضمن وزارة الصحة عدة أنظمة ترصد مستقلة عن بعضها.

الاستنتاجات

يستحق داء الليشمانيات في سورية وجود نظام

على عدد من المريضات اللواتي لم يكن لديهن سوابق مرضية. وتمت مراقبة بدء التأثير والثبات القلبي الوعائي من خلال مراقبة النبض والضغط وكذلك مراقبة التنفس والصحو وعودة المنعكسات وحس الألم مع اختلاف مجموعات الأدوية المشاركة والتي قسمت إلى مجموعات، حيث تم:

- ١- استخدام البنزازوسين مع الميدازولام وهو من البتروديازيبينات الحديثة، ويملك تأثيرات جانبية قليلة.
 - ٢- تم إعطاء البنزازوسين مع الميدازولام والغاز الإنشافي النايتروس (N2O).
 - ٣- استخدام البنزازوسين مع أحد المخدرات الوريدية (ثيوبنتون الصوديوم).
- كانت نتيجة الدراسة أن أفضل طريقة لاستخدام البنزازوسين تكون مع الميدازولام والنايتروس الذي يحدث شروطاً جراحية جيدة مع نباتية قلبية وعائية جيدة دون مضاعفاتها خطيرة بالمقارنة مع المجموعات الأخرى.

دراسة وصفية لنظام ترصد داء الليشمانيات في سورية

A Descriptive Study of Leishmaniasis Surveillance system in Syria

نزار أبا زيد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أحمد ديب دماش

مقدمة

الترصد هو الأساس الوبائي لممارسة صحة المجتمع وحجر الزاوية في معالجة المشكلات الصحية. وداء الليشمانيات مشكلة صحية قديمة في سورية ويوجد نظام مترسخ لترصدها. إلا أننا لم نجد توثيقاً موحداً لهذا النظام، والتوثيق ضروري لتحسين الأداء

متابعة مستمرة لكشف تلك الأمراض ومعالجتها بالوقت المناسب.

تدبير آلام الطرف السفلي

نجوى رقماني

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد علي أرناؤوط

يعد الألم مشكلة إنسانية معقدة إذ يشكل السبب الأول لمراجعة المرضى والمراكز الطبية ويعتبر سبباً مهماً للإعاقة.

لذا فإن المعالجة الفعالة للألم من المواضيع الهامة التي لا بد أن تشغل المجتمع بصورة عامة والمسلك الطبي بصورة خاصة.

تظهر الدراسة الطرق العلاجية المختلفة للسيطرة على الألم والتأثيرات الجانبية لكل طريقة تم تركيز الدراسة على المقارنة بين التدبير الناحي للألم بتطبيق المخدرات الموضعية مع الستيروئيدات والمعالجة الدوائية بالطريقة العامة والمعالجة الجراحية، وبمقارنة النتائج وجد أن أفضلها تسكيناً للآلام الطرف السفلي وأقلها إزعاجاً للمريض هي التطبيق الناحي للمخدرات الموضعية مع الستيروئيدات.

الكشف عن مستضدات فيروس التهاب الكبد B «المستضد s والمستضد e» عند مريض الديال الدموي في مشافي دمشق بطريقة الاستشراب وتوافق ذلك مع تغير وظائف الكبد

Detecting Hepatitis B Viral Antigens (E and S) Using Chromatography in Patients Receiving Hemodialysis in

ترصد خاص به، والنظام القائم بسيط وسهل الحوسبة نسبياً، وحوسبته قد تحسن أداؤه إذا تم التخطيط لها جيداً. نوصي بإنشاء نظام ترصد مركزي محوسب يشمل كل الأمراض تحت الترصد وينسق فعاليات الترصد والمكافحة.

الأمراض الجلدية عند مرضى زرع الكلية

Skin Diseases on Renal Transplanted Recipients

نجوى قماجي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. صالح داود

تعد الأمراض الجلدية عند مرضى زرع الكلية من أشيع الأمراض مشاهدة، بسبب استخدام الأدوية المثبطة للمناعة الضرورية لحياة الكلية المزروعة.

شملت الدراسة ٦٧ مريضاً أجرى لهم زرع كلية، راجعوا مشفى الأمراض الجلدية والزهرية في جامعة دمشق في الفترة ما بين ١٩٩٦/١/١ وحتى ١٩٩٩/١٢/٣١، بهدف كشف الأمراض الجلدية الحادثة عندهم، وقد تمت الاستعانة ببعض الوسائل المخبرية التشخيصية والاستقصائية للآفات الجلدية.

حدثت المظاهر الجلدية الناجمة عن استخدام الستيروئيدات القشرية بنسبة عالية ٨٣,٥%، تلتها الأخماج الجلدية بنسبة ٦١,١%، ثم المظاهر الجلدية الناجمة عن استخدام السيكلوسبورين ٥٢,٣%، وأخيراً السرطانات الجلدية التي بلغت نسبة حدوثها ١١٣,٤% خاصة سرطانة قاعدية الخلايا ٧,٤% وغرن كابوزي ٥,٩%.

لاحظنا ارتفاع نسبة حدوث الأمراض الجلدية عند مرضى زرع الكلية، وخاصة الأمراض الناجمة عن استخدام الستيروئيدات القشرية والسرطانات الجلدية، وهذا يستدعي إجراء

Damascus Hospitals, and Their Association with Disturbances of Liver Functions

أحمد سامر المصري

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صلاح الدين شحادة

هدف البحث إلقاء الضوء على حالات التهاب الكبد الفيروسي عامة و التهاب الكبد بالحمية B خاصة وتحديد نسبة الحملة للمستضد السطحي HbsAg والمستضد HbeAg عند فئة من المرضى وهم مرضى القصور الكلوي الموضوعين على التحال الدموي واستخدام الطرق الحديثة للتعرف على هذه المستضدات وخاصة طريقة الاستشراب المناعي ICT بالإضافة لإجراء الفحوص المخبرية الواسمة لالتهاب الكبد خاصة معايرة خميرة GGT وزمن الـ PT والبيرومين و ALT وارتباط هذه الفحوص مع الحالات الإيجابية من HbsAg و HBeAg والحديث عن طرق العدوى الشائعة بـ HBV خصوصاً العاملين في الحقل الطبي واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من هذه العدوى.

تحرّي البروسيلة في الجبنة البيضاء

Detecting Brucellae In White Cheese

أوديس الأسعد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صلاح الدين شحادة

تمّت الدراسة بين الشهرين الثالث والتاسع من عام ١٩٩٩ حيث بلغ عدد العينات الكلية التي تم فحصها ٥٨٦ عينة عشوائية جُمعت من مختلف الأسواق في مدينة دمشق ثم نُقلت إلى مكان الدراسة الذي كان بشكل أساسي «قسم

الطب المخبري في مشفى المواساة، قسم الجرثومات والطفيليات التابع لكلية الطب البشري في جامعة دمشق». وقد اشتملت العينات على عدة أنواع، فكان لدينا عينات من الجبنة وأخرى من الحليب والقشطة النيئة. وأظهر البحث وجود ٢٧ عينة إيجابية (٤,٦%) بالنسبة للعدد الكلي، حيث كان لدينا ٣٩٤ عينة جبنة وجدنا فيها ١٥ عينة إيجابية (٣,٨%)، أما عينات الحليب غير المغلي وغير المبستر فقد بلغ عددها ١٥٨ عينة كان من بينها ١٠ عينات إيجابية أي بنسبة (٦,٣٢%)، في حين بلغ عدد عينات القشطة النيئة ٣٤ عينة كان من بينها اثنتين إيجابيتين (٥,٨٨%). وبالنظر لدرجة الملوحة في الجبنة فقد كان لدينا ١٩٤ عينة من الجبنة الحلوة أو خفيفة الملوحة وجدنا بينها ١١ عينة إيجابية (٥,٦٧%)، و١٥٨ عينة من الجبنة نصف المالحة كان بينها ٤ عينات إيجابية (٢,٥٣%)، في حين لم نجد أي عينة إيجابية بين العينات الـ ٤٢ من الجبنة المالحة. أما بالنسبة لنوع الحليب المستخدم في صناعة الجبنة فقد كان لدينا ٣٠٠ عينة مصنعة من حليب الأبقار من بينها ١٢ عينة إيجابية (٤%)، وكان هناك ٦٢ عينة مصنعة من حليب الأغنام وجدنا فيها عینتين إيجابيتين (٣,٢٢%)، كما كان لدينا ٣٢ عينة مصنعة من حليب الماعز حيث لم نجد إلا عينة واحدة (٣,١٢%). وقد توزعت النتائج بالنسبة لطريقة الحضان إلى ١٨ عينة إيجابية بالنسبة للحضان الهوائي (٣,٠٧%) و ٩ عينات بالنسبة للحضان اللاهوائي (١,٥٣%).

انفكاك المشيمية الباكر

Albruptio Placentae

فداء مكية

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. خالد مرعشلي

تمت الدراسة العملية في مشفى التوليد الجامعي بدمشق في الفترة الواقعة ما بين ١٩٩٧/١٩ ولغاية ١٩٩٩/٨/٣١ وقد بلغ عدد المريضات المقبولات بتشخيص انفكاك المشيمة الباكر ٣٢٥ مريضة بنسبة ١,٢٣% وعند دراسة الموجودات السريرية للانفكاك تبين ما يلي: كان عدد حالات النزف الدموي الصريح ٢٤١ حالة بنسبة ٧٤,١٥% بينما كانت عدد حالات فرط المقوية الرحمية ١٥٥ حالة بنسبة ٤٧,٦٩% ولدى دراسة علاقة الضغط بالانفكاك وجد أن لارتفاع الضغط الشرياني دوره الهام كمؤهب للانفكاك. كما تبين لدى دراسة العوامل التالية (عدد الولادات - عمر الأم - التدخين - انفراغ الرحم المفاجئ) أن معدل حدوث الانفكاك يزداد بتعدد الولادات وتقدم عمر الأم وبزيادة عدد السجائر المدخنة / اليوم أما انفراغ الرحم المفاجئ فسبب ٦٨ حالة بنسبة ٢٠,٩%.

أما بالنسبة لطريقة الولادة فكانت معظمها مهبلية بنسبة ٥١,٧% أما القيصرية فشكلت ٤٨,٤% من الحالات وكانت أهم المضاعفات الولدية الصدمة النزفية بنسبة ٣٥,٤%.

الجذام في القطر العربي السوري «دراسة وبائية»

Leprosy in Syrian Arab Republic “Epidemiological Study”

عمار محمد أسعد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. صالح داود

الجذام مرض حبيبيومي مزمن معد تسببه المتفطرة الجذامية، يصيب بشكل أساسي الأعصاب المحيطية والجلد وقد بلغ عدد مرضى الجذام في العالم ١,١٥ مليون عام ١٩٩٨ م.

المرضى وطرق الدراسة:

تتألف هذه الدراسة من قسمين، القسم الأول هو دراسة راجعة لوثائق البرنامج الوطني لمكافحة الجذام لتحديد حالات الجذام منذ عام ١٩٣٩م ولغاية عام ٢٠٠٠م. أما القسم الثاني فهو دراسة نزلاء مجذمة الوليد، حيث يتم تحويل مرضى الجذام في سورية إلى المصح للمعالجة.

النتائج والمناقشة:

بلغ عدد مرضى الجذام المسجلين في القطر العربي السوري ٤٥٦ مريضاً منذ عام ١٩٣٦ م وحتى عام ٢٠٠٠م، كما انخفضت نسبة الانتشار إلى ٠,٧ لكل مئة ألف عام ٢٠٠٠م. أما مرضى مصح الوليد فقد بلغ عددهم ١١٥ مريضاً خلال الفترة الممتدة من ١٩٩٨/١/١ إلى ٢٠٠٠/١/١. ومعظمهم من الذكور الكهول المتزوجين الأميين العاطلين عن العمل، والذين ينحدرون من مدينتي طرطوس واللاذقية. كما أبدى المرضى وجود قصة عائلية للجذام عند ٥٧% منهم. لقد كان الجذام كثير العصبيات الورمية هي أكثر أنماط الجذام ظهوراً.

الخلاصة:

الجذام مرض حبيبيومي مزمن معد تسببه المتفطرة الجذامية، يصيب الجلد والأعصاب المحيطية. تستخدم المعالجة الدوائية المتعددة MDT كعلاج فعال، ويستخدم لقاح BCG للوقاية. تهدف هذه الدراسة إلى إعطاء فكرة عن وبنيات الجذام في القطر العربي السوري. وبشكل عام فإن جميع النسب منخفضة وتدل على ضعف انتشار الداء في سورية.

سرطانات الدرق البدئية

Primary thyroid Cancers

رنا عيسى

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. شريف السالم

تشكل سرطانات الدرق البدئية نحو ١% من مجموع الخباثات عند الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من السرطانات غير النادرة في بلادنا، ولهذا السبب قمنا بدراسة ميدانية إحصائية وتشريحية مرضية للأورام الخبيثة البدئية في الدرق والمشاهدة في إحدى مشافينا الجامعية (مشفى الأسد الجامعي) من أجل إيضاح تواتر هذه الآفات في مدينة عالية التعداد السكاني كمدينة دمشق، وكذلك دراسة الأنماط العيانية والنسجية لهذه السرطانات المشاهدة في ١٤٤٠ عينة جراحية من الدرق وردت من كافة شعب المشفى الجراحية إلى مخبر التشريح المرضي.

بعد دراسة توزع الآفات نسبة للجنس والعمر ومناطق سكن المصابين، قمنا بتحليل مروفولوجي للأنماط النسيجية المختلفة، مع تصنيف حسب المراجع العالمية المتعددة، قمنا بمتابعة بعض الحالات الخاصة من خلال إجراء تلويينات خاصة كيميائية نسيجية ومناعية نسيجية لتثبيت التشخيص واستخلاص فكرة محددة عن توزع سرطانات الدرق البدئية في بلادنا. ثم نقوش ذلك على ضوء دراسة سابقة أجريت في قسم التشريح المرضي منذ عدة سنوات، وكذلك دراسات عالمية أخرى منشورة.

النوربلانت

The Norplant

مازن جميل حاتم

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. كنعان السقا

النوربلانت: مانع حمل أنثوي هرموني مديد التأثير، المادة الفعالة [Levonorgestrel] وهو من الجيل الثاني للبروجستينات. تنتشر هذه المادة من خلال ٦ محافظ تزرع تحت الجلد في

الناحية الأنسية من العضد.

آلية عمل النوربلانت: هناك ثلاثة طرق محتملة، وهي مشابهة لتلك المقترحة في الموانع البروجستينية الأخرى.

يعد النوربلانت طريقة منع حمل آمنة، فعالة جداً ولا تتطلب مطاوعة كبيرة من قبل المستخدمة أو الدافع لذلك. يمكن إن تستخدم من قبل اللواتي لديهم مضاد استطباب لاستخدام الاستروجين.

الجزء الأول من الدراسة العملية (دراسة إحصائية):

■ الآثار الجانبية التي تمت مشاهدتها لدى المستفيدات من النوربلانت كانت متعددة نسبياً ومتداخلة غير أن أشيعها كان: الاضطرابات النزفية الطمثية، الصداع والقلق الناتج عن الشائعة (برنامج تلفزيوني هاجم في النوربلانت دون الاستناد إلى أسس علمية).

■ بينت الإحصاءات أن نسبة الفك تتناسب عكساً مع درجة التعليم وأن نسبة الفك لدى الموظفات كانت أقل بشكل هام منها لدى ربات البيوت.

■ إن نسبة الفك تأثرت بكل من عامل الوزن والعمر وطبيعة السوابق الطمثية لدى المستخدمات للنوربلانت.

■ إن وجود سوابق لاستخدام موانع الحمل أثر بشكل إجمالي على نسبة الفك وخاصة لدى السيدات اللواتي حدثت لديهن آثار جانبية لدى استخدامهن لتلك الموانع.

■ أسباب الإزالة كانت متعددة ومتداخلة فيما بينها وقد سيطرت الاضطرابات الطمثية عليها. في المرتبة الثانية كان الصداع غير أن ٢٠% من الأسباب كانت تعود بشكل مباشر إلى الشائعة وقد احتلت المرتبة الثالثة.

واسترخاء العضلة القلبية والوفيات عندما تعطى بشكل وقائي في احتشاء العضلة القلبية من خلال دراسة أجريت في مشفى المواساة والأسد الجامعي.

تضمنت الدراسة ١١٥ مريضاً في مشفى المواساة و ٥٠ مريضاً في مشفى الأسد الجامعي شخص لهم احتشاء عضلة قلبية حاد بناءً على المعطيات السريرية ومعطيات التخطيط والخمائر القلبية.

أعطى المغنيزيوم للمرضى حالما كان ذلك ممكناً وبجرعة ٢ غ كجرعة تحميل قبل تطبيق حالات الخثار و ١٢ غ جرعة تسريب على مدى ٢٤ ساعة. تبين بنتيجة الدراسة أن هذه المعالجة ليس لها دور في الوقاية من اضطرابات النظم إلا في حال وجود عوز للمغنيزيوم، بينما أنقصت هذه المعالجة الوفيات بشكل ملحوظ وحسنت قصور القلب بنسبة ٥ % في الجزء المقذوف EF.

في النهاية تبين أنه من الضروري إعطاء المغنيزيوم للفئات المؤهلة لنقصه في المرحلة الحادة من احتشاء العضلة القلبية بينما يبقى موضوع إعطاؤه لباقي الفئات مثار جدل والأفضل إعطاؤه نظراً لتحسينه نسبة البقاء في دراستنا.

فرط صوديوم الدم عند الأطفال

Hyponatremia in children

رغد بغدادليان

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. برنار خازم

يهدف البحث إجراء مسح لحالات فرط الصوديوم المقبولة في مشفى الأطفال ودراسة علاقة شدة فرط الصوديوم مع العمر، الأعراض والعلامات السريرية، العقاقير

■ متوسط فترة الاستخدام تعلقت أيضاً بالعوامل المختلفة وكانت أطول لدى السيدات العاملات منها لدى ربات البيوت، وتتاسب طول فترة الاستخدام طرداً مع درجة التعليم.

الجزء الثاني من الدراسة (معالجة الاضطرابات الطمئية النزفية الناتجة عن النوربلانت)

■ تبين من المرحلة الأولى من الدراسة أن وجود خطة علاجية واضحة لها دور هام جداً في كل من نسبة الفك وفترة الاستمرار في التركيب مقارنة مع عدم استخدام المعالجة أو استخدام معالجات بشكل عشوائي.

■ تبين المرحلة الثانية من هذه الدراسة أن استخدام Brufen وهو من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية قد حقق نتائج هامة.

■ المعالجات Triquilar & Primarine وهي حاوية على الاستروجين تمتعت بنتائج هامة وجيدة في معالجة الاضطرابات الطمئية النزفية الناتجة عن النوربلانت.

دراسة عن فعالية سلفات المغنيزيوم

الوقائية في احتشاء العضلة القلبية الحاد

Magnesium Sulfate in Acute Myocardial Infarction

أحمد ماهر القدسي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: د. حسام الدين الشبلي

هذه الدراسة تتحدث عن فعالية سلفات المغنيزيوم وتأثيرها على إنقاص اللانظميات

المطبقة على ٧٢ حالة منها في الوصول إلى تشخيص نهائي دقيق، خاصة فيما يتعلق بتمييزها عن غيرها من الأورام الخبيثة الأخرى. ولقد برزت أهمية تطبيق التلويينات المناعية في التشخيص من خلال دراستنا لمقارنتها مع دراسة مناسبة أجريت في القسم ١٩٩٠-١٩٩١ بدون تلويينات مناعية، إذ أمكن في دراستنا الحالية الوصول إلى نسب أعلى وإلى دقة أكبر في التشخيص.

التجريف الاستقصائي

Investigator Curettage

سمير رمضان

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد نذير ياسمينية

من المعروف أن سرطان باطن الرحم يحتل المرتبة الأولى بين سرطانات الجهاز التناسلي عند الأنثى والمرتبة الثانية بعد سرطان الثدي عند المرأة عموماً.

ونظراً لتحسن الجراحة النسائية وزيادة متوسط العمر، فإن الكشف الباكر عن هذا المرض وعن التبدلات الباثولوجية التي تسببه أصبح ضرورة ملحة لتحسين إنذار المريضات المصابات.

ومن هنا تتناول هذه الدراسة التجريف الاستقصائي بصفة الشخص الأول لسرطان باطن الرحم، بالإضافة لكشفه للحالات ما قبل السرطانية وبالتالي إتاحة إمكانية العلاج المبكر والفعال لهذه الآفات إضافة لدوره في

والوفيات، إضافة إلى الوقوف على تدبير حالات فرط الصوديوم.

شملت الدراسة ٣٠٠ مريض قبلوا في مشفى الأطفال خلال فترة ١٩٩٨-١٩٩٩.

ودرس توزع الحالات حسب الجنس والعمر ومستوى الصوديوم والأسباب المؤدية لفرط الصوديوم والأعراض والعلامات السريرية ونسبة الوفيات والعقائل وعلاقتها بالعمر ومستوى صوديوم المصل، مع مقارنة ذلك بالدراسات السابقة والنتائج العالمية.

وأكد بشكل رئيسي على ضرورة الوقاية من العقائل العصبية لأن مضاعفات التجفاف مفرط الصوديوم لا تنجم غالباً عن ارتفاع صوديوم الدم بل عن الإمهاء غير الملائم.

أورام النسيج الرخوة الخبيثة

Soft tissue Sarcomas

رنا عطية

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. شريف سالم

تشكل أورام النسيج الرخوة الخبيثة مشكلة تشخيصية هامة، بالرغم من تعدد وسائل الاستقصاء المتبعة في كل مرة من تلويينات روتينية وخاصة مناعية نسجية. ويبرز ذلك في صعوبة تمييزها عن غيرها من الأورام الخبيثة (الكارسينوما، الليفوما، الميلانوما) من جهة، وفي التمييز فيما بين نماذجها النسجية المختلفة من جهة أخرى.

وقد بينت الدراسة المجراة في مخبر التشريح المرضي في مشفى الأسد الجامعي، المجراة على ١٤٥ حالة خلال ٧ سنوات (١٩٩٣-١٩٩٩) أهمية التلويينات المناعية النسيجية

حالات نسائية أخرى.

كما أن للدراسة فائدة إحصائية لمعرفة التشريح المرضي للبطانة في حالات النزف الرحمي الشاذ.

التهاب الجلد الأرجي بالتماس (دراسة وبائية)

Allergic Contact Dermatitis
(Epidemiologic Study)

موجيه ساهلي أوغلو

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صالح داود

التهاب الجلد الأرجي بالتماس هو تفاعل التهابي موضع في الأدمة العليا من التبدلات البشرية النموذجية.

قمنا بإجراء دراسة تهدف إلى معرفة انتشار المرض ومعرفة العامل المؤرج وتوزع المرض حسب الجنس والعمر والمهنة للمريض وحسب توضع الإصابة. وقد أجريت الدراسة الراجعة على ٥١٠ مرضى طبقت عليهم الاختبارات الرقعية بين عام ١٩٨٦ - ١٩٩٨ وذلك بالرجوع إلى وثائق الاختبارات الرقعية في القسم. وكان Potassium Dichromate المادة الرئيسية التي سببت التفاعلات الإيجابية. وجد أن المهنة عند غالبية المرضى ذوي النتائج الإيجابية لهذه المادة هي أعمال البناء. لذلك فإن إضافة كبريتات الحديد على الإسمنت قد تكون طريقة مفيدة لإنقاص التحسيس للكروم. وكانت المواد الأخرى ذات النتائج الإيجابية الأكثر شيوعاً هي: Cobalt Chloride, Nickel Sulphate. وقد أجريت

الدراسة الحالية على

١٠٠ مريض راجعوا العيادات الخارجية للقسم بشكوى تتماشى سريريا مع التهاب الجلد الأرجي بالتماس وفي فترة من ١٩٩٩/٧/١ حتى ١٩٩٩/١٢/٣١. كان Potassium Dichromate المادة ذات النتائج الإيجابية بنسبة أكبر لدى هؤلاء المرضى وكانت المواد الأخرى ذات النتائج الإيجابية الأكثر شيوعاً هي: Cobalt Chloride, Nickel Sulphate.

دراسة مسحية شاملة لمتلازمة كوشينغ في مشفى الأسد الجامعي في الفترة ما بين الأعوام ١٩٩٦ و ١٩٩٩ م

Screening Study form Cushing's
Syndrome in Al-Assad University
Hospital Between 1996 and 1999

محمد مأمون

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: د.م. يونس قبلان

إن الهدف من هذه الدراسة هو إحصاء جميع المرضى المصابين بمتلازمة كوشينغ والذين راجعوا مشفى الأسد الجامعي بين عام ١٩٩٦ و ١٩٩٩. بالإضافة إلى تقييم دور عيار الكورتيزول الليلي في وضع التشخيص لهذه المتلازمة وتفريقها عن متلازمة كوشينغ الكاذبة في دراسة مستقبلية.

ضمت الدراسة الإحصائية ٣٠ مريضاً بمتلازمة كوشينغ راجعوا مشفى الأسد الجامعي بين عام ١٩٩٦ و عام ١٩٩٩، حيث قام البحث بدراسة توزع المرضى من ناحية العمر والجنس، ودراسة الأسباب المؤدية لهذه المتلازمة. ودرست الفحوص المخبرية التي أجريت للمرضى. والفحوص الشعاعية أيضاً. ودرس أيضاً الطرق العلاجية المستخدمة.

التشريحية المجاورة بشكل دقيق. وهذه التحديدات يمكن أن تفوق ما بين الاستئصال التام للحنجرة أو الاستئصال الجزئي، لذلك يجب على الشعاعي معرفة التشريح بمنظور طبيب الحنجرة.

رضوض الأنبوب الهضمي

Gastro Intestinal Tract Trauma

معد تامر

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محسن بلال

تحتل رضوض البطن أهمية خاصة عند الجراحين بسبب زيادة نسبة حدوثها مع ازدياد حوادث السير والعمل والطلق الناري.

إن القصة المرضية توحى بوجود رضٍ على البطن، ثم يأتي الفحص الفيزيائي ليقدم علامات إيجابية أو سلبية في ٢٥% من الحالات، ويجب أن نؤكد على أن كل مريض مرضوض يجب أن يفحص بشكل كامل لكشف أذيات أخرى تكون أخطر مثل أذيات الرأس والصدر. ومن أهم التظاهرات: الألم - المضض الموضع والصلابة - التمدد البطني - غياب الحركات الحوية - كدمات أسفل الصدر - العلامات الحيوية وتبدلها من ضغط شرياني ونبض وتنفس وصبيب بولي - عدم الاستجابة للإنعاش.

لقد طُبقت الدراسة العملية على المرضى الذين تم استقبالهم في إسعاف مشفى المواساة بين عامي ١٩٩٥ و ١٩٩٨م، وقد بلغ عدد المرضى ٢٤٠ مريضاً، وعدد رضوض البطن ٢٢٥ مريضاً. وكان مرضى أذية الأنبوب الهضمي ١١٧ مريضاً، وأكثر الإصابات كانت في الصائم أو الدقاق. ودرُس توزع الإصابات حسب الجنس، حيث كانت إصابات الذكور تساوي نسبة ٨٦%.

والقسم الثاني من الدراسة أجري على ثلاث مجموعات ضم كل منها ١٢ مريضاً وذلك لدراسة أهمية عيار الكورتيزول الليلي ودقته في وضع تشخيص المتلازمة.

ومن خلال استعراض النتائج تبين الدور الهام للمقاربة المنهجية للمرضى الذين يُشك بأن لديهم متلازمة كوشينغ في وضع التشخيص الصحيح للمتلازمة وسببها وبالتالي وضع الخطة العلاجية الملائمة وبذلك نتجنب أي مداخله علاجية غير ملائمة والتي قد تكون ضارة للمريض أحياناً.

ومن خلال استعراض النتائج تبين أيضاً الدور الهام لعيار الكورتيزول الليلي في وضع تشخيص متلازمة كوشينغ وتفريقها عن متلازمة كوشينغ الكاذبة.

التصوير الطبي لأورام الحنجرة

Medical Imaging of Laryngeal Tumors

محمد ماجد العبد الله

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد بسام الصواف

على الرغم من وجود طرق تصوير متعددة لتقييم الحنجرة، إلا أنه تم التركيز على CT وMRI، حيث إن هذه الوسائل تمكن الشعاعي من رؤية النسيج العميقة بشكل مباشر.

إن المعلومات التي يتم الحصول عليها من CT أو MRI (قورنت مع الرؤية السطحية بالتصوير المباشر الحديث) تغطي السريري فهماً أكبر وأفضل لامتداد الآفة من السابق.

في معظم الحالات فإن أخصائي الأذن والحنجرة يستطيع تقييم الغشاء المخاطي، وفي حالة الكارسينوما يأتي دور الشعاعي في معظم الحالات في رؤية الامتداد الأعماق وتحديد حدود الورم وعلاقته مع البنى

تسوء هذه المظاهر الشبكية جميعها إثر عملية استخراج الساد لأن الجراحة تزيد من إمكانية تحطم الحاجز الدموي الشبكي وتسرع من زيادة النفوذية الوعائية وتنشط الفعالية الالتهابية، لذلك يجب توخي الحذر والدقة في تقييم درجة الاعتلال الشبكي السكري قبل الإقدام على الجراحة واتباع أسلوب العلاج الوقائي بالليزر قدر الإمكان قبل الجراحة عند وجود استقطاب لذلك مع المتابعة الدقيقة بعدها.

ارتفاع الضغط الشرياني أثناء الحمل

Hypertension During Pregnancy

لينا الطيار

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: د. كنعان السقا

يعد ارتفاع الضغط الشرياني أثناء الحمل من مضاعفات الحمل الهامة ونسبته ٥-١٠% من مجموع الحمل، حيث يمكن أن يكون وحيداً أو يترافق ببيلة بروتينية مؤدياً لحالة ما قبل ارتعاج، أو الارتعاج وغالباً ما يكشف عند مراقبة الحمل بالوزمة السريعة التشكل أو الوزن الزائد أو بأعراض منبهة مثل الصداع، الألم الشرسوفي، نشوش رؤية، اشتداد المنعكسات.

وهذه الدراسة تحصى مريضات ارتفاع الضغط الشرياني أثناء الحمل لعام ١٩٩٩ وعددهم ٩٨١ حالة بنسبة ٦,١% من المريضات اللواتي ولدن بالتوليد الجامعي وشوهدت معظم الحالات في طرفي سن النشاط التناسلي، وقرب تمام الحمل وعند الطبقة الفقيرة، وصودف ارتعاج وما قبل

ثم تناولت الدراسة نسبة إصابة كل جزء على حده، فقد أصيبت إصابات معدة في ٢٥ حالة، وإصابات عفج في ١١ حالة، وأمعاء دقيقة في ٥٦ حالة، وكولون في ٣٦ حالة، وأظهرت الجداول تصنيفها وطريقة تدبيرها.

وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى مجموعة توصيات من بينها:

- ١- توفير وسائل تشخيصية جيدة في خدمة الإسعاف على مدار ٢٤ ساعة، لا سيما التصوير بالأمواج فوق الصوتية.
- ٢- الاهتمام باليزل وغسيل البريتوان لما له من أهمية تشخيصية.
- ٣- ومن أهم التوصيات التوعية الصحية للأطفال والشباب لأنهم أكثر فئة معرضة للإصابة بهذه الأذيات.

مضاعفات جراحة الساد عند مرضى الداء السكري

The Complication of Cataract Surgery in Diabetes

ريمة السقا

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أروى العظمة

بعد اعتلال الشبكية السكري والساد من المضاعفات الشائعة عند مرضى الداء السكري، ويبقى الأهم هو التبدلات المرضية الطارئة في مستوى السرير الشعري الشبكي إثر ارتفاع سكر الدم المديد والتي تبدأ بتحطيم الحاجز الدموي الشبكي وما يتبعه من تسريب وعائي شعري ووذمات موضعية أو معممة كسبب تدني القدرة البصرية المركزية عندما تصيب منطقة اللوحة.

اختيارهم بشكل عشوائي من بين المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية بمختلف أنواعها وذلك في مشافي الأسد، الموساة، وداء التوليد. تمت مباشرة التخدير لدى جميع المرضى بشكل متشابه، وجرت مراقبة الإرخاء العضلي بمنبه أعصاب محيطي. كما تمت مراقبة العلامات الحيوية أثناء العمل الجراحي ومراقبة ظهور أيأ من الآثار الجانبية. وفي نهاية العمل الجراحي قمنا بمراقبة صحو المريض وعودة المقوية العضلية ومدى الحاجة للمعاكسة بالبروستغمين.

كانت نتيجة الدراسة أن بدء التأثير ومدته يتبعان الجرعة المستخدمة، وأن استخدام جرعات دامة متعددة لا يؤدي لتراكم الدواء. كذلك أن السيس أتراكوريوم يتميز بصحو عفوي. وإن استعمال السيس أتراكوريوم لا يؤدي لظهور أعراض تحرر الهيستامين.

الشعرانية

Hirsutism

ريمة جعلوك

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. نجاة صنيح

إن الهدف من هذه الدراسة هو تقدير النسب المئوية للأسباب المؤدية للشعرانية في دراسة عملية راجعة مأخوذة من سجلات المريضات المراجعات لمشفى الأسد الجامعي في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٩٧ وبداية عام ٢٠٠٠.

أجريت الدراسة على خمس وخمسين مريضة راجعن المشفى بهذه الشكاية بالإضافة إلى شكايات أخرى مراقبة، تمت دراسة المريضات سرريباً وأجريت لهن الفحوصات المخبرية الهرمونية والشعاعية اللازمة.

ومن خلال استعراض النتائج الهرمونية

الارتعاج خاصة عند الخروسات واللواتي لديهن سوابق مرضية أو حمول عالية الخطورة كالحمل المتعدد والسكري.

أول علاج لما قبل الارتعاج الشديد المضاف، والارتعاج هو سلفات المغنيزيوم.

استخدام السيس أتراكوريوم عند المسنين

Cis – Atracurium Usage in Geriatrics

فراس الخطيب

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. منى عباس

يُستعمل أثناء التخدير العام العديد من التقنيات والأدوية ولا تمضي فترة إلا ويطرأ تعديل على واحدة من طرق التخدير أو يظهر دواء جديد. ومن الأدوية التي ظهرت حديثاً مرخي عضلي هو السيس أتراكوريوم.

السيس أتراكوريوم هو مرخي عضلي غير مزيل للاستقطاب متوسط فترة التأثير. وهو واحد من عشر مركبات موجودة ضمن خليط الأتراكوريوم. يُستقلب سيس أتراكوريوم، كما هو الحال مع الأتراكوريوم، وفق تفاعل هوفمان بشكل رئيسي، ويمتاز عن الأتراكوريوم بخاصية مهمة وهي أنه لا يؤدي لتحرر الهيستامين حتى عند استخدام جرعات كبيرة.

في هذا البحث جرت دراسة الحرائك الدوائية للسيس أتراكوريوم (بدء التأثير، فترة التأثير، ونمط الصحو)، التأثيرات الدوائية (وتشمل تأثيراته على أجهزة الجسم المختلفة)، تأثير بعض الحالات المرضية على الحرائك الدوائية، والتأثيرات الجانبية للدواء. أجريت دراستنا في مشافي جامعة دمشق على ١٠٠ مريض كانت أعمارهم أكبر من ٦٠ سنة تم

١٠% وشاهدنا عدم استجابة في ١٤% من الحالات.

لقد عللنا تباين نتائجنا عن النتائج العالمية بكون عدد المرضى ذوي الجلد القاتم وفير في هذه الدراسة، بالإضافة إلى كون المرضى قد عولجوا سابقاً بالاستيروئيدات وغيرها، كما أنه قد يكون لعدم التزام المرضى بالجلسات دور في ذلك.

تدبير الكيسات المائية الكبدية

Management of the Hepatic Hydatid Cysts

طلال عرابي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. يحيى حمادة الخياط

تمت الدراسة الميدانية السريرية على ١٧٨ مريضاً في مشافي المواساة والأسد الجامعي والأطفال ما بين عامي ١٩٩٥ و ١٩٩٧ بشكل راجع وبالعودة إلى أضايرهم وتقارير العمليات الجراحية المجراة لهم في سجلات العمليات، وتمت المقارنة ما بين سبل التدبير الجراحي المختلفة من حيث تأثيرها على نسب الشفاء واحتمالات المضاعفات التالية للعمل الجراحي في كل منها، ومن ثم قمنا بمقارنة النتائج التي وصلنا إليها بمعطيات الإحصاءات العالمية حيث تبين أنها تتسجم بشكل عام مع بعضها.

وخلصنا في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة التي يمكن أن تساعد في اختيار التدبير الأمثل الذي يمكن تقديمه للمريض لنساعده على الشفاء من علته بأقل نسبة من المراضة والوفيات.

التهاب الملتحمة الربيعي (التشخيص - المعالجة)

والشعاعية لهذه الدراسة تبين أن السببين الأكثر شيوعاً في إحداث تلك الشكاية عند النساء قبل سن الضهي هما متلازمة المبيض متعدد الكيسات والشعرانية مجهولة السبب، في حين كان لبعض الاضطرابات الغدية "كفرط برولاكتين الدم، كوشينغ، اضطراب وظيفة الدرق، العوز الخمائر الكظري" الدور الأضعف في إحداثها.

أكزيمة اليد التخريشية

Irritant Hand Exzema

تيودورا إبراهيم

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. صالح داود

إن أكزيمة اليد التخريشية هي من الأمراض الشائعة جداً، ويأتي أهمية هذا المرض من كونه ذي تأثير واضح على حياة المريض، إذ قد يؤدي أحياناً إلى تغيير المهنة.

لقد قسمت دراستنا إلى قسمين: القسم الأول: تضمنت دراسة إحصائية في القسم بينت أن نسبة المرضى الذين راجعوا بشكوى أكزيمة لعام ١٩٩٩ كانت ١٩,٦%. كما بينت أن نسبة المراجعين شكوى أكزيمة يد كانت ٣١% من حالات المراجعين بشكوى أكزيمة. أما القسم الثاني فقد تضمن ثلاثين مريضاً مصاباً بأكزيمة اليد التخريشية والذين وضعوا على المعالجة الكيماضوية الموضعية. لقد اخترنا المرضى من ذوي الإصابات المعقدة على المعالجات الكلاسيكية، أو الناكسة. وتوصلنا إلى النتائج التالية: كان وسطي عدد الجلسات اللازمة للتوصل إلى درجة من التحسن جيدة إلى مقبولة ١٧,٤ جلسة واستغرقت زمناً وسطياً قدره ٨,٥ أسبوع وكان وسطي جرعة الـ UVA ١٠٤,٧ جول/سم^٢. كانت الاستجابة جيدة في ٢٨% من الحالات، مقبولة في ٤٨%، سيئة في

Deaths in Car Accidents

عماد نوفل

كلية الطب الشرعي - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد فوزي النجار

تحتل الإصابات الناجمة عن حوادث السير المركز الأول تقريباً في أسباب الوفيات في العالم، وقد اهتمت دراستنا بالتعريف بحوادث السير وأهم أسباب الوفيات الناجمة عنها وتوزع المناطق المصابة والمسؤولة عن حدوث الوفاة. كما تطرقنا إلى آلية حدوث هذه الإصابات وحسب موقع الضحية من الآلية والأذيات الناجمة عن تجاوز الآلية للضحية، كذلك السقوط من الآليات المتحركة، واختلاف الإصابات باختلاف نوع الآلية، وحسب سرعة الآلية، وبالتالي تحديد كيفية سرعة الآلية اعتماداً على شدة الإصابات، أو بالطرق الحسابية.

درست ٧٢ حالة وفاة ناجمة عن حوادث السير من الطبابة الشرعية ومن مشفى المواساة. وقسمت حسب موضع الضحية، وحسب المنطقة المصابة، وعمر الضحية، ونوع الآلية. وكان لا بد من التركيز على الكشف عن مكان الحادث والضحية مع كتابة التقرير الطبي الشرعي والخاص بحوادث السير وذكر أسباب وأهداف تشريح الجثة في بعض الحالات، وتبين أيضاً أن الإصابات الدماغية وكسور الجمجمة تشكل النسبة العظمى من الوفيات وتساوي ٧٠,٨٣% من مجمل الحالات. ووضعت بعض المقترحات التي تؤكد على دور الطبيب الشرعي بالكشف على حوادث السير.

الحمل خارج الرحم - تشخيصه

وتدبيره

Ectopic Pregnancy

Vernal Conjunctivitis (Diagnosis - Treatment)

عبير السعيد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. جوزيف فتوح

التهاب ملتحمته الربيعي هو التهاب ملتحمه أرجي بالعينين، ينكس، وفصلياً، يصيب الأطفال والبالغين الصغار بشكل رئيسي، لاسيما الذكور منهم، نادراً ما يستمر إلى ما بعد سن الـ ٢٥ سنة، إذ يُشفى تلقائياً عادة قبل عمر ٢٠ سنة، وهو أسوأ في الربيع والصيف. إنه مرض مزمن مزعج، العرض الرئيسي فيه هو الحك، يتميز بحليمات منتشرة على الملتحمه الجفنية، خاصة العلوية، وقد تصبح عملاقة متراصة بشكل حصي الرصف، وقد يصيب الحوف القرني الصليوي على شكل تسمك هلامي أو حليمات، وأحياناً 'Trantas dots'.

تبيّن أن المحلول olopatadine hydrochloride 0,1% فعّال في معالجة الحالات المعتدلة الشدة، منذ البدء وحتى ٥ أسابيع من المعالجة فقد كان أفضل من naphazoline - antazoline، ومن الغفل، ومن disodium cromoglycate 2% في السيطرة على مجمل العلامات والأعراض العينية، إذ تحسنت الأعراض لدى ٧٦,٤% من المرضى المستعملين للـ olopatadine مقارنة مع ٢٧,٣% من المرضى المستعملين للغفل بعد أسبوع من المعالجة. وهو سليم ومريح عند التقطير ويُصح بالاحتفاظ بالاستيرويدات القشرية الموضعية للحالات الشديدة من الرمد الربيعي.

أهم أسباب الوفيات في حوادث السير

The Most Important Causes of

مع الجيوب التي تُعد جزءاً منه، كما تمت دراسة الجيوب من حيث تشريحها وأمراضها ومضاعفاتها العديدة والحيوية والتي قد تكون مهددة للحياة.

وتمت الدراسة العملية باستخدام عدد من الطرق تتناسب كلٌّ منها مع عمر المريض والأمراض الموجودة لديه وسلامة استخدام الأدوية المتوفرة عند هذا المريض. وتمت متابعة المرضى لمدة ٢٤ ساعة لمراقبة الصحو والحاجة للتسكين ومراقبة نتائج حدوث مضاعفات المريض وكيف تم تدبيرها.

توسيع الصمام التاجي بالبالون في مشفى المواساة

Percutaneous Mitral Balloon
Valvuloplasty in AI – Mouasat Hospital

زاهر قنّدقجي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. مفيد جوخدار

بدأت عمليات توسيع الصمام التاجي بالبالون في مشفى المواساة منذ أكثر من خمس سنوات. هدف هذه الدراسة إحصاء جميع حالات التوسيع، ودراسة النتائج المباشرة للتوسيع والمضاعفات التي حصلت للمرضى أثناء الاستشفاء من أجل التوسيع، إضافة لمتابعة المرضى سريرياً وبتخطيط صدى القلب خلال فترة وصلت لأكثر من ثلاث سنوات لدى بعض المرضى.

ضمت الدراسة ١١٩ مريضاً ومريضة أجري لهم توسيع بالبالون للصمام التاجي بتقنية Inoue بين كانون الثاني ١٩٩٥، ونيسان ٢٠٠٠. حيث قام الباحث بدراسة توزع المرضى من حيث السن والجنس، والتصنيف الوظيفي للمرضى حسب NYHA، ودراسة معطيات تخطيط صدى القلب من مساحة الصمام التاجي والممال الوسطي عبر الصمام والضغط الانقباضي الرئوي والافات

diagnosis & Management

هيفاء الجندي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عماد الدين تنوخي

■ **القسم النظري:** هدف الدراسة - الأسباب والآليات - الأعراض والعلامات - التشخيص - الفحوصات المخبرية والتشخيص التفريقي.

■ **القسم العملي:** تمت الدراسة في مشفى دار التوليد الجامعي بدمشق من ١١/١/١٩٩٨م ولغاية ٣١/١٠/١٩٩٩م، عدد الحالات: ٤٨ حالة حمل هاجر حيث نسبة حدوث الحمل ٣٢/١، ٠٣% توزع الحمل الهاجرة حسب عمر المريضة وحسب عدد الولادات ونسبة كل منها.

■ أماكن توضع الحمل الهاجر.

■ الدراسة العملية والإحصائية للأسباب والمؤهبات.

■ خطة التدبير والمتابعة.

■ الحمل الهاجر والمزمن - التشخيص التفريقي - نتائج وتوصيات - المراجع.

تخدير مرضى جراحة الجيوب التنظيرية

Anaesthesia for functional
Endoscopic Sinus Surgery

سحر عوض

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عبد القادر دعدو

تمت الدراسة النظرية من عدد من المراجع في علم التخدير والإعاش، وفي علم أمراض الأذن والجيوب، وتناولت تشريح الأذن ووظائفه وطريقة فحصه بسبب علاقته الوثيقة

التخديريتتين (بالنسبة M/K: ١/٢٠) بجرعة
وسيطية للمباشرة (K: ١,٥ مغ/كغ، و ٠,٧٥٠
للاستمرارية التخديرية (K < ٢٠ مكغ/كغ/د،
M < ١ مغ/كغ/د)، تم خلالها مراقبة الضغط
الوسطي والنبض كمتغيرين هيموديناميين،
والنتيجة كانت نسبة الثبات الهيموديناميكي قبل
الإرخاء والتنبيب للضغط الوسطي ٨٤%
وللنبض ٩٠% من المرضى. أما بعد التنبيب
بحوالي دقيقة فكان للضغط الوسطي ٥٢%،
وللنبض ٦٠% من المرضى. وأخيراً بلغت
النسبة أثناء الاستمرارية للضغط الوسطي
٧٦% وللنبض حوالي ٩٠% من المرضى.

وبالنتيجة، نجد أن الثبات الهيموديناميكي في
التخدير العام قد تحقق بشكل نسبي باستخدام
الكيثامين مع الميدازولام لدى نسبة هامة من
المرضى في مرحلة ما قبل التنبيب ومرحلة
الاستمرارية. أما في حال التنبيب فلم يستطع
إلا بنسبة ليست بكبيرة، لذلك لابد من
المناورات المساعدة في تقليل الارتكاس
للتنبيب.

الأورام الخبيثة في الجيب الفكّي والفك العلوي

The Malignant Tumors of Maxillary
Sinus and Upper Jaw

حسين الزامل

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. أكرم الحجار

تحدث هذه الدراسة عن مرض خطير جداً.
إنذاره سيء إن تأخر تشخيصه إلى مراحله
المتقدمة. وتم في هذا البحث إجراء الدراسات

الصمامية الأخرى المرافقة، إضافة لضغط
الأذنية اليسرى المقاس بالفترة القلبية قبيل
التوسيع. ثم قام الباحث بدراسة النتائج
المباشرة للتوسيع، من تبدل في ضغط الأذنية
اليسرى، وفي مساحة الصمام، وفي الممال
الوسطي عبر الصمام، كما قام بدراسة
المضاعفات المباشرة للتوسيع. وأخيراً تمت
دراسة النتائج البعيدة للتوسيع من خلال متابعة
المرضى سريرياً وبخطيط صدق القلب.

وقد خلص الباحث إلى فعالية هذا الإجراء
سواءً على المدى القريب أو البعيد، حيث
ازدادت مساحة الصمام بشكل مرضي لدى
جميع المرضى. حصل النكس السريري خلال
فترة المتابعة التي وصلت حتى ٣ سنوات لدى
مریضة واحدة فقط. كما خلص إلى سلامة هذا
الإجراء ونذرة المضاعفات فيما لو أجري بيد
خبيرة، حيث لم تسجل أي حالة وفاة متعلقة
بالعملية، ولم تحدث أية مضاعفة مهددة للحياة.

التخدير بالكيثامين مع الميدازولام لتحقيق هيموديناميكية مستقرة نسبياً Ketamine and Midazolam Anesthesia for Relative Hemodynamic Stability

طريف الداغستاني

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عبد القادر دعدو

يعد تحقيق الثبات الهيموديناميكي مطلباً
تخديرياً هاماً وبشكل خاص للمرضى القلبيين
والمرضى الحرجين. ويهدف إشراف كل من
الكيثامين K والميدازولام M في التخدير العام
إلى تحقيق هذا المطلب مع أقل مضاعفات
ممكنة.

أجريت الدراسة على ١٠٠ مريضاً من
مجموعات ASA مختلفة باستخدام المادتين
المذكورتين في المباشرة والاستمرارية

العقدية ٢١,٤% - والبعيدة ٨,٨% - والنكس ٣٥% والورم الأكثر إعطاء للنقائل والنكس. كان معدل تأخر ظهور النكس بعد الجراحية ١٠,٨ شهر. لوحظ أن علاج هذا السرطان بشكل عام مازال فيه خلاف ومن الصعوبة تحديد العلاج الأفضل رغم أن الجراحة وخاصة المتبوعة بالأشعة يبدو أنها الأفضل على أن تكون جذرية مع الحفاظ على الحالة الوظيفية قدر الإمكان، إن الفشل الموضعي بقي السبب الأعظم للموت إضافة للنقائل. وبالنتيجة إن تشخيص ومعالجة هذا السرطان يحتاج لتضافر جهود أطباء من اختصاصات مختلفة. وإن التقدم الأكبر الذي يقود لتحسين معدل الحياة سيعتمد على التشخيص المبكر والعلاج الأولي الشديد والكافي ويجب أن تتطر مختبرات البحث للمعالجة الكيماوية والمناعية والوراثية وتطوير تقنيات علاجية أخرى إضافة للإبداعات التي تنشئ تقنيات جراحية جديدة لنقدم العلاج لواحد من أكثر الأمراض بلاء وشدة على الجنس البشري.

الآفات الورمية الكاذبة الناجمة عن الأخماج

Inflammatory Pseudotumors Caused by Infections

رائدة أحمد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. رائدة الخاني

بعض الأخماج تتظاهر بأفة كتلية قد تلتبس بالآفات الورمية مما يستدعي إدراجها في التشخيص التفريقي لهذه الكتل.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على هذه الآفات الخمجية المسببة لآفات كتلية تلتبس بالفحص السريري أو الشعاعي مع التشنؤات خاصة الخبيثة وبالتالي يعتمد فيها التشخيص

الإحصائية على عينة بلغت ١٥٩ مريض من مشفى المواساة خلال ١٤ سنة مع مقارنتها مع الدراسات العالمية المماثلة، وتمت الدراسة على عدة متغيرات منها العمر، الجنس، الأعراض والعلامات التي كانت متنوعة ومعظمها تدل على تقدم الورم عند تشخيصه، وكان أشيعها التورم في الوجنة وقبة الحنك ٧٨,٦% ثم الأعراض السنية. ودرس كذلك أول عرض شعر به المريض، فترة تأخر المريض عن مراجعة الطبيب، الإجراءات الطبية وغير الطبية المجراة على المريض جزافاً قبل الشك بالتشخيص وكان أشيعها الإجراءات السنية ومن هنا تكمن أهمية طبيب الأسنان للمساعدة بالكشف المبكرة عن هذا السرطان، وتمت دراسة الوسائل التشخيصية المتبعة فوجد إن CT scan كان الأقدر على التشخيص مع إيجابيته العالية وهو المعول عليه في الكشف المبكر ويجب أن يجرى لكل مريض يشك لديه هذا الداء. كان السرطان شائك الخلايا هو النوع الأشيع ثم سرطانات الغدد اللعابية الصغيرة، ولوحظ تقدم مرحلة الورم T عند التشخيص.

وتمت دراسة الإجراءات العلاجية ونتائجها والمتابعة حيث كان معدل فترة المتابعة ١٧ شهراً من تاريخ العلاج ويدل ذلك على قصر فترة المتابعة إضافة للعدد الأكبر الذين ينقطعون عن المراجعة لكشف أي نكس بشكل مبكر، سجلت نسبة البقية ٢٨,٣% لمدة ٣ سنوات و ١٢% لمدة ٥ سنوات أي أنها متدنية وتدل على سوء إنذار هذه الأورام، وللتفصيل درست نسبة البقية تبعاً لمتغيرات متعددة (مرحلة الورم، النمط التشريحي المرضي، وجود نكس وعدمه) فلو حظ نسبة بقية متساوية تقريباً إن لم يكن أكثر بين وجود نكس وعدمه وهذا قد يكون جزئياً ناتجاً عن الصعوبة في التحليل الكلي للحواف التابعة للتجريف الفكي. وتمت دراسة المضاعفات الجراحية، النقائل

على التشريح المرضي لتحديد نوعية وسلامة الآفة وطبيعة العامل الممرض المسبب. كما يقوم البحث بتحديد أنواعها ونسبة حدوثها في مشافينا.

وجد بالدراسة العملية أن هذه الآفات الورمية الكاذبة الناجمة عن الأحماج قد شكلت نسبة لا بأس بها ٥٣,٧ % من الآفات التي تسببها العوامل الممرضة.

ويؤكد البحث على ضرورة إجراء الفحص النسيجي مع التلوينات الخاصة في حالات الضرورة لكشف هذه الآفات وتحديد العوامل الممرضة المسببة، كما يؤكد على ضرورة التعاون بين الأطباء السريريين والمشرحين المرضيين للتفريق بين الآفات الالتهابية والورمية.

مقارنة بين زرع العدسات داخل العين بطريقة داخل الغلاف، عن طريق الثلم الهدبي

Ciliary Sulcus & Envelope

سلوى سلوم

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.م.د. يسرى حدة

لقد أثبتت تقنية استخراج الساد خارج المحفظة مع زرع عدسة بالغرفة الخلفية بطريقة الطرف جدارتها للميزات الكثيرة التي توفرها من حيث السهولة أثناء الاستخراج والزرع وإمكانية الزرع بالثلم الهدبي في حال تمزق المحفظة الخلفية والموضع التشريحي الطبيعي الذي تشغله العدسة بعيداً عن الحاجز الدموي - الخلطي المائي.

تمت الدراسة على مجموعة من مرضى الساد الشيخى حيث قُسموا إلى مجموعتين:

■ المجموعة (أ) تم زرع العدسة لديهم

بطريقة داخل الغلاف.

■ والمجموعة (ب) زُرعت عدسة الغرفة الخلفية لديهم بطريقة الثلم الهدبي.

كانت استعادة العين لوضعها الطبيعي أسرع ونسبة المضاعفات أقل لدى مرضى المجموعة (أ) ولكن بشكل عام لم يكن هنالك أفضلية بين الطريقتين من حيث أفضل قدرة بصرية حصلنا عليها.

التخدير الموضعي للعين بالتقطير في عمليات استحلاب البلورة

Topical Anesthesia for Phacoemulsification

هدى مدني

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أحمد باسم بريدي

مع تطور تقنيات أفضل وأقل رضى لاستخراج الساد والتأهيل البصري، فقد تطورت طرق التخدير لتصبح أفضل وأقل رضى. إن طريقة التخدير الموضعي بالتقطير في عملية استحلاب البلورة تجنب المريض مضاعفات الحقن حول العين المحتملة في طرق التخدير الموضعي الأخرى والتي قد تكون خطيرة أحياناً، كما أنها لا تتطلب ضماداً وتؤدي إلى تحسن سريع في القدرة البصرية، ونظراً لمزايا هذه الطريقة ولدراسة فعاليتها أجريت دراسة في الشعبة العينية في مشفى المواساة الجامعي بين عامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ حيث طُبِّقت لأول مرة في سورية طريقة التخدير الموضعي بالتقطير في جراحة استخراج الساد بطريقة الاستحلاب مع زرع عدسة داخل العين على ٤٢ عيناً لـ ٤٢ مريضاً، كما استخدمت لأول مرة المادة الدوائية بنوكسينات هيدروكلوريد ٠,٤ % (القطرة المخدرة الوطنية ميديكائين) في التخدير

التخدير في نقل وزرع الكلية بمشفى المواساة

Anaesthesia in the Kidney
transplantation Unit at the
Mouassat Hospital

ندى إسماعيل

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عبد القادر دعد

تمت الدراسة النظرية بالعودة إلى:

- رسالة ماجستير للدكتور هشام سليمان:
التخدير في مركز زرع الكلية بمشفى
المواساة ١٩٨٧-١٩٨٨م.
- رسالة ماجستير للدكتورة روبدة حيدر:
التخدير في مركز زرع الكلية بمشفى
المواساة ١٩٩٤-١٩٩٥م.
- رسالة ماجستير للدكتور مالك الغيث:
المضاعفات الجراحية في زرع الكلية
١٩٩٩-٢٠٠٠م.

تمت الدراسة العملية على مرضى الزرع الكلوي في وحدة زرع الكلية بمشفى المواساة خلال عام ١٩٩٩-٢٠٠٠م. وقد تم تحضير المرضى المتبرعين ودراساتهم وتخديرهم كل حسب حالته. ويتم تحضير المرضى الأخذين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وتخديرهم باستبعاد الأدوية التي تطرح عن طريق الكلية وباستبعاد جميع الأدوية المؤثرة سلباً على عمل الكلية المزروعة وإمالة المرضى جيداً ومراقبتهم بعد العمل الجراحي في غرفة الإنعاش والعناية المشددة.

سرطان عنق الرحم ومعالجته

Cervical Cancer and Its Treatment

هزار الزيتاني أبو البرغل

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. صلاح شيخة

الموضعي بالتقطير. وقد طلب من مرضى الدراسة تقييم الألم الذي أحسّوه أثناء الجراحة، كما أجري تقييم التخدير من قبل الجراح، كذلك دُرِس أثر الترتين الجهازى المشارك في إحساس المريض بالألم وسير العمل الجراحي، ودُرِس أيضاً المضاعفات الحادثة أثناء العمل الجراحي ونتائج القدرة البصرية بعد الجراحة.

مضاعفات احتشاء العضلية

القلبية الحاد

Complications of Acute
Myocardial Infarction

عفيف علي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. مروان شامية

تم إجراء الدراسة على ١٠٠ مريض شُخص لهم احتشاء حاد في مشفى الأسد الجامعي لعام ١٩٩٩. وقد قدمنا بالبداية معلومات نظرية عن أسباب الاحتشاء بتشريح الشرايين الإكليلية الوصفي والمرضى وآلية التصلب العصيدي وآلية تشكل الخثار ثم عن أهم المضاعفات وتدبيرها، وفكرة عن تشخيص الاحتشاء وتدبيره.

بدأت الدراسة العملية منذ قدوم المريض إلى الإسعاف بإجراء تخطيط كهربائية القلب ومعايرة الخمان، ثم قبوله في وحدة العناية المشددة ومراقبته يومياً وتسجيل أهم المضاعفات الحاصلة، وتم توزيع المرضى بناءً على العمر والجنس وعوامل الخطورة والمضاعفات ونوع الاحتشاء، وتم التوصل إلى نتائج هامة عن نسبة المضاعفات ومدتها ونسبة الوفيات، وكان من التوصيات الهامة أهمية نقل المريض بسرعة والتطبيق الباكر لحالات الخثرة، وأهمية الإجراءات الإسعافية الجراحية ودورها في إنقاذ نسبة الوفيات.

تشكل آفات العقد للمفاوية السليمة القسم الأكبر من آفات العقد للمفاوية وتتضمن هذه الآفات مجموعة واسعة تتباين مظاهرها النسجية من مظاهر نوعية تمكن من وضع تشخيص دقيق إلى مظاهر لا نوعية. يلتبس المظهر النسجي لبعض الآفات السليمة أو غير التنشؤية كثيراً بالمظهر النسجي لبعض أنماط المفاوما اليهودجينية واللاهودجينية، وتشكل هذه المجموعة معضلة تشخيصية لأي مشرح مرضي.

الدراسة الإحصائية المجراة على مجموع الحالات الواردة إلى المشافي الجامعية خلال ٥ سنوات أعطت فكرة عن نسبة هذه الحالات وتوزعها حسب الجنس وحسب الفئات العمرية المختلفة.

كما أظهرت هذه الدراسة بعض القصور في إمكانية تشخيص مثل هذه الحالات التي يحتاج تشخيصها أحياناً إلى تقانات خاصة أو إلى معلومات ومتابعة سريرية دقيقة.

كسور أمشاط اليد المغلقة عند الكهول

Closed Metacarpal Fractures in Adults

أحمد أسعد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. منذر مسوح

اليد من وجهة نظر سريرية هي أحد أهم أعضاء الجسم، وبدون يد وظيفية تكون سبل رزق المريض غالباً مهددة. وتشكل الأمشاط الهيكل العظمي لراحة اليد، وتتألف من خمسة عظام طويلة تتمفصل بالقرب مع الرسغ وفي البعيد مع السلاميات القريبة مما يعطيها أهمية كبيرة وخصوصاً المشط الأول. ولأن كسور الأمشاط شائعة وتصيب الشباب غالباً وخصوصاً في اليد المسيطرة فإن التقليل من

تهدف هذه الدراسة معرفة نسب حدوث سرطان عنق الرحم في القطر وطرق تدبيرها ومعالجتها ومقارنة النتائج مع دراسات عالمية أخرى.

وقد تم إجراء دراسة استقرائية راجعة على ٢٠٩ مريضات بسرطان عنق الرحم راجعن مشفى دار التوليد وأمراض النساء الجامعي وذلك من ١٩٩٠/١/١ وحتى ١٩٩٩/١٢/٣١.

كان العمر الوسطي للإصابة ٤٨,٣٢ سنة وكان سن الزواج الوسطي ١٥,٨ سنة وعدد الولادات الوسطي ٦,٨ ولادة وقد بلغت نسبة الحدوث لسرطان عنق الرحم في دراستنا ١٠٠٠/٤٢ ألف مراجعة وكان النزف المهلي بمختلف أشكاله هو العرض الأساسي ٦٩%.

٨٦,١% من حالات سرطان عنق الرحم كشفت في المرحلتين الأولى والثانية، ٨٥,٢% من الحالات كانت كارسينوما شائكة الخلايا و١٤,٨% كانت غدية والنسبة للكارسينوما الشائكة فقد كان أكثرها شيوفاً كبيرة الخلايا غير متقرنة ٦,٢% تليها المتقرنة ٢٧% ثم صغيرة الخلايا ١٦,٨%.

أجريت الجراحة بمفردها بنسبة ٣٤,٤% وبالمشاركة مع الأشعة بنسبة ٤١,٧% والأشعة لوحدها بنسبة ٢٣,٩%.

بمتابعة ١٧٤ مريضة توفي من السرطان ٢٥,٣% وفقد ١٦% وبقي على قيد الحياة ٥٥,٢% وكانت نسبة البقيا الإجمالية لخمسة سنوات ٤٢,٠%.

الآفات غير التنشؤية

في العقد للمفاوية

Non Neoplastic Lesions of Lymph Node

سناء جاد الله

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد إياد الشطي

الدراسات العالمية ونتائج أخرى مخالفة. كما تمت دراسة التوزيع الجغرافي للأورام الصلبة في سورية، وتم استخلاص بعض التوصيات الهامة، منها التشديد على افتتاح مراكز متابعة ومعالجة لهذه الأورام في المحافظات الأخرى، وتطوير الكادر الطبي فيها إن وجدت من أجل متابعة مثل هؤلاء المرضى كل في محافظته.

دراسة تبدلات IL-6 مع الإستروجين في تخلخل العظام التالي للإياس

Study of the IL-6 Changes with Estrogen, Correlation with Postmenopausal Osteoporosis

شادن حداد

كلية الصيدلة - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. سحر الفاهوم

تخلخل العظام بعد سنّ الإياس هو اضطراب مشخص بنقص كثلة العظم وزيادة حساسيته للكسور، يرتبط هذا المرض بشكل واضح مع نقص الإستروجين، ويمكن الوقاية منه عن طريق المعالجة المعاوضة بالإستروجين Estrogen Replacement Therapy، ومن الآليات التي اقترحت حول دور الإستروجين في منع تخلخل العظم تعديلته لتحرر سيتوكينات متعددة عرفت بتأثيرها على إعادة صياغة العظم، ومن هذه السيتوكينات IL-6.

يبنّه IL-6 العديد من بروتينات الطور الحاد ومنها: Fibrinogen, SAA, CRP كما له دور في حدوث الحمى، ويُعد أفضل معلم Parameter لمراقبة المضاعفات بعد العمل الجراحي.

وما يهمننا من الوظائف المتعددة لهذا السيتوكين هو دوره في تخلخل العظام بعد سن الإياس (النمط I). إذ إن سبب هذا النمط من التخلخل هو الارتشاف العظمي المتسارع بعد

أهميتها وتجاهل الاهتمام بطرق علاجها الصحية أمر غير مبرر، وهذا ما يفسر كثرة الدراسات وتطور طرق العلاج خصوصاً في العقد الأخير.

هذه الكسور قد تشفى بدون مضاعفات، والقاعدة فيها الاندمال ولكنها أيضاً قد تكون ذات مضاعفات خطيرة عند بعض المرضى كالبيوسة الشديدة أو الاندمال المعيب بشكل يؤذي وظيفة اليد، وأحياناً قد تنتهي بتنكس مفصلي شديد. وتعالج هذه الكسور بعدة طرق إما محافظة أو بالأسياخ عبر الجلد أو الاستبدال الجراحي، وأحياناً التثبيت الخارجي، ومن المهم اختيار الطريقة المناسبة للكسر المناسب والاهتمام بالتحريك المبكر في كل الحالات معتمدين على التثبيت بشكل وظيفي إن كان التثبيت ضرورياً وترك أكبر قدر ممكن من المفاصل حراً في حال كون تثبيتها غير ضروري.

الأورام الصلبة عند الأطفال

Les tumeurs solides chez l'enfants

عادل حب الله

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد زياد الشويكي

دراسة راجعة أجريت في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق بين عامي ١٩٨٧ و ١٩٩٦.

شملت كلّ الأطفال المقبولين في المشفى والمصابين بأورام صلبة خلال فترة الدراسة (المفوما، النوروبلاستوما، النوروبلاستوما، أورام النسج الرخوة، أورام الكبد، أورام الخلية المننثة).

بحثت الدراسة في أعراض وعلامات القبول، وسائل التشخيص وطرق المعالجة ونتائج العلاج، مع المقارنة بدراسات عالمية وعربية، وكانت هناك بعض النتائج المتوافقة مع

الوصول لسن الإياس.

٦- بعد D-dimer معلماً تشخيصياً هاماً في حال الصمة الرئوية.

إن مشاركة النتيجة السلبية لـ D-dimer مع $\text{PaO}_2 \geq 80$ ملم. ز. تستبعد وجود الصمة الرئوية بشكل كامل.

مساهمة مخبرية لتشخيص الإصابات البشرية بداء البروسيلات في القطر العربي السوري

Laboratory Study for Diagnosis of Human Brucellosis in Syria Arab Republic

أيمن رياض النجم

كلية الصيدلة - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. ميخائيل عبيد

وبمشاركة: أ.د. فوزة منعم

قمنا بإجراء مقارنة بين طواقم أربع شركات (غاما - أوميغا - مورغانفيل - أميكو) بطريقة [تفاعل رايت على الصفيحة]، فكان طاقم شركة غاما هو الأفضل. وقارنا طواقم الشركات (ألفوبيوتيك - سيريون - فيروتيك) بطريقة ELISA فكانت طواقم سيريون أكثر حساسية ونوعية وثباتية، قمنا بمقارنة عدة طرائق مصلية [2ME, MAT, SAT, RBT, ELISA] فكانت ELISA من أكثر الطرائق المطبقة حساسية ونوعية. وقمنا بتطبيق الطرائق السابقة على مرضى بداء البروسيلات في مراحل مختلفة من الإصابة [طور حاد N=97، طور تحت الحاد N=60، طور مزمن N=24] فكان هنالك تناقص في نسبة إيجابية (IgM) وزيادة نسبة الإيجابية (IgG, IgA) بطريقة ELISA مع تطور الإصابة نحو الإزمان.

درسنا مرضى بداء البروسيلات العصبي

علامة بعض بروتينات الطور الحاد بالتصلب العصيدي والخثار

Acute Phase Reactants with Atherosclerosis and Thrombosis

زكريا شمس الدين الصغير

كلية الصيدلة - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. وفيقة زرزور

ومشاركة: أ.د. فايزة قبيلي

يهدف البحث إلى دراسة دور جملة التخثر في التصلب العصيدي. وتشخيص فعالية الجملة الحالية للفبرين في العديد من الحالات المرضية. وتحديد المجال المرجعي لـ D-dimer. وإجراء مقارنة للطواقم المخبرية التجارية المتوفرة لـ D-dimer. ودراسة تغيرات D-dimer أثناء الحمل. ودراسة تغيرات كل من IL-6 و CRP، الفبرينوجين لدى مرضى التصلب العصيدي والخثار. وتمت الدراسة على ٢٦٣ عينة.

النتائج:

- ١- بلغ المجال المرجعي لـ D-dimer لدى الأسوياء، واعتماداً على استخدام مقياس العكر بطاقم جاهز لشركة Roche: $\text{D-dimer} = (0.00-0.42) \text{ mg/ml}$
- ٢- تزداد قيمة D-dimer لدى الحوامل مع زيادة العمر الحملي.
- ٣- تسبق القيمة السلبية لـ D-dimer وجود الخثار الوعائي المنتشر، حيث القيمة التنبؤية السلبية $(NPV) = 100\%$.
- ٤- يفيد D-dimer في التحري والتنبؤ عن المريضات اللواتي لديهن خطورة عالية لتطور متلازمة HELLP لديهن.
- ٥- يفيد D-dimer في التحري، ومتابعة العلاج لدى مرضى خثار الأوردة العميقة، وفي استبعاد وجود الإصابة.

أسطوانية ثابتة الأبعاد محضرة على السطح الدهليزية لـ ٣٦ ضاحكاً معداً للقلع تقويمياً، حيث قلعت الضواحك السابقة بعد ثلاثة أزمنة: يومين، أسبوع، شهر. وتم تحضيرها نسيجياً لدراستها تحت المجهر الضوئي.

لم تظهر النتائج فرقاً إحصائياً واضحاً بين ارتكاس اللب تجاه الكوميرميرت وارتكاسه تجاه الراتنج المركب. كذلك لم يلاحظ فرق إحصائي في ارتكاس اللب تجاه نوعي الكوميرمير المستخدمين في هذه الدراسة. أظهرت هذه الدراسة أن الكوميرميرت ملائمة حيويًا مع الألباب البشرية الحية.

التركين الواعي عند الأطفال باستخدام أكسيد النايتروس والميدازولام

Conscious Sedation of Children Using Midazolam and Nitrous Oxide

نبية رسلان

كلية طب الأسنان - جامعة دمشق

إشراف: أ.م.د. محمد التيناوي

تأولت هذه الدراسة ١٢٣ مريضاً طفلاً تراوحت أعمارهم بين (٦-٩) سنوات وكانت معايير الاختيار تتضمن أطفال أصحاء (ASAI) يظهرون سلوكاً سلبياً ويحتاجون إلى جلسة ترميم واحدة على الأقل باستخدام الحاجز المطاطي والتخدير الموضعي وليست لديهم خبرة سابقة بالتركين.

قُسم الأطفال عشوائياً إلى ست مجموعات الأولى أعطيت أكسيد النايتروس ٥٠% والثانية ميدازولام فموي ٠,٢٥ ملغ/كغ والثالثة ميدازولام فموي ٠,٥ ملغ/كغ والرابعة أكسيد النايتروس ٥٠% والميدازولام الفموي ٠,٢٥ ملغ/كغ والخامسة أكسيد النايتروس ٥٠% والميدازولام الفموي ٠,٥

وقارنا النتائج مع مجموعات شاهدة فوجدنا أن ما يميز مرضى داء البروسيلات العصبي عن غيرهم هو إيجابية الاختبارات المصلية في CSF عند مرضى داء البروسيلات العصبي دون سواهم. وقمنا بمتابعة مجموعة من المرضى لمدة زمنية تتراوح ما بين (٨-١٨) شهراً فكانت ELISA من أفضل الطرائق المصلية في متابعة المرضى وكشف النكس، فقد تميز النكس باستمرار (IgA, IgG) بعيارات عالية بالإضافة لعودة ظهور قمة جديدة لـ (IgG) و (IgA). وقمنا بالزرع الجرثومي لمجموعة من المرضى، فكانت نسبة الإيجابية ٤٧%، وعند مقارنة نتائج الزرع الجرثومي مع نتائج الطرائق المصلية المختلفة، كانت نتائج الزرع غير مشجعة.

ردود فعل اللبّ السني تجاه بعض أنواع الكوميرميرت (دراسة سريرية)

Pulp Reactions Toward Some Compomers (Clinical Study)

غلا ياسين

كلية طب الأسنان - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. صفوح البني

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم ارتكاس اللب السني البشري تجاه نوعين من أنواع الكوميرميرت هما AP Dyract و Compoglass F ومقارنة ذلك مع ارتكاس اللب تجاه أحد أنواع الراتنج المركب وهو Z100.

تم تطبيق المواد السابقة على ٧٢ حالة نخر صنف خامس، وتمت مراقبتها لمدة سنة للتأكد من استمرار حيوية هذه الأسنان وذلك بواسطة الفحوصات السريرية والفحص بالرائز الكهربائي.

كما تم تطبيق المواد السابقة على حفر

ملغ/كغ.

تم قياس السلوك وقياس العلامات الحيوية خلال مراحل العمل فتبين أن إعطاء الميذازولام الفموي بجرعته الصغرى ٠,٢٥ ملغ/كغ حقق أفضل النتائج ولم تكن تغيرات العلامات الحيوية تابعة للدواء المعطى بقدر ما كانت متأثرة بظروف العمل والتنبيه المرافق مما يؤكد أمان استخدامه.

في حل معظم المشاكل التي يشكو منها المرضى وتحسين تقييماتهم لأجهزتهم. إلا أن الوصلات بنوعيتها لم تحسن الدعم ولا حالة المخاطية السنخية. وهكذا نجد أن الوصلات الكروية مناسبة لحالات الامتصاص السنخي الشديد بينما يفضل استخدام الوصلات المغناطيسية عند وجود مشاكل رباطية في الدعامات أو عند وجود سنخ مرتفع.

التقييم الدوائي لبعض الأدوية الوطنية المهدنة ومشاركتها مع النايتروس في توجيه سلوكية الطفل في العيادة السنية

Pharmacological Evaluation of Some Locally – Mode Sedatives in Conjunction with Nitrous Oxide in the Management of Child Behavior in the Dental Office

شذى نادر قوشجي

كلية طب الأسنان - جامعة دمشق

إشراف: أ.م.د. محمد التيناوي

تناولت هذه الدراسة ١٢٢ طفلاً تراوحت أعمارهم بين ٣-٦ سنوات وكانت معايير الاختيار تتضمن أطفالاً أصحاء ASAI يعانون من مشاكل سلوكية ويحتاجون إلى معالجة سنية وليست لديهم خبرة سابقة بالتركي.

قسم الأطفال عشوائياً إلى أربع مجموعات: الأولى أعطيت الديازبام الوطني، الثانية الديازبام الأجنبي، الثالثة النايتروس بمفرده، الرابعة مشاركة بين الديازبام والنايتروس.

تم قياس السلوك وقياس العلامات الحيوية خلال مراحل العمل فتبين إن الديازبام الوطني فعال جداً بشكل مماثل للديازبام الأجنبي، وأن المشاركة بين الديازبام والنايتروس أكثر فعالية من إعطاء كل منهما بمفرده. ولم تكن تغيرات العلامات الحيوية تابعة للدواء المعطى بقدر ما كانت متأثرة بظروف العمل

دراسة سريرية مقارنة بين الأجهزة المغطية ذات الوصلات الكروية والأجهزة المغطية ذات الوصلات المغناطيسية

Comparative Clinical Study Between Ball Attachment Overdentures and Magnetic Attachment Overdentures

عمار المصطفى

كلية طب الأسنان - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد علي الحكيم

تألقت عينتنا من ثمانية عشر مريضاً تم تزويدهم في البداية بأجهزة مغطية بسيطة خالية من الوصلات. بعد ذلك قسم مرضى العينة إلى قسمين متساويين، حيث أضيفت الوصلات الكروية إلى أجهزة القسم الأول، والوصلات المغناطيسية إلى أجهزة القسم الثاني. تم فحص هذه الأجهزة قبل وبعد تطبيق الوصلات وذلك من حيث:

١- الثبات.

٢- الاستقرار.

٣- الدعم.

٤- حالة المخاطية السنخية.

٥- تقبل المرضى لهذه الأجهزة.

كانت الوصلات الكروية أكثر فعالية من الوصلات المغناطيسية في تحسين الثبات والاستقرار. وقد ساهمت الوصلات بنوعيتها

والتنبيه المرافق مما يؤكد أمان استخدامه.

تحري الإصابة بفيروس التهاب الكبد (C) عند الأشخاص المنقول لهم دم في مشافي جامعة دمشق

Detecting Hepatitin C Virus (Hcv)
in Persons Subjected to Blood
Transfusion in Damascus University
Hospital

إياد المحمود - كلية الطب - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد طاهر اسماعيل

تمت هذه الدراسة في مشافي جامعة دمشق
في الفترة الواقعة في آب ١٩٩٩ حتى أيار
٢٠٠٠.

كان الهدف دراسة العلاقة بين الإصابة
بفيروس التهاب الكبد C ونقل الدم.

وتمت دراسة نظرية لفيروس التهاب الكبد C
من حيث البنية والأمراضية والانتقال
والأشكال السريرية للإصابة بالفيروس
ودراسة الاختبارات اللازمة لتشخيص
الفيروس ومعالجة الإصابة به.

ثم أجريت دراسة عملية لتحري أضرار
الفيروس C بطريقة الاستشراب المناعي
وكانت نسبة الإيجابية عند المرضى المنقول
لهم دم ١٤ % وبالتالي وجدت علاقة بين
الإصابة بالفيروس C وزيادة عدد مرات نقل
الدم تم جمع النتائج وتصنيفها في جداول
خاصة مع دراسة إحصائية ملائمة.

موانع الحمل الفموية

Oral Contraceptive Pills

يوسف أحمد قرداش - كلية الطب - جامعة
دمشق

إشراف: أ.د. بشار الكردي

الحبوب المستعملة: Microgynon, Triquilar,
Microlut.

هدف الدراسة: تنظيم الأسرة ومعرفة تأثيرات

حبوب منع الحمل الفموية في قطرنا من خلال
زائرات مشفى التوليد الجامعي عامي ١٩٩٨-
١٩٩٩.

طريقة الاستعمال للحب: تناول اليومي
الفموي للحب.

لقد تم التوصل على نتيجة وحيدة وأكيدة وهي
تحسين فقر الدم عند المستفيدة وتنظيم الدورة
الشهرية.

وقد تم التوصل إلى استنتاجات قد لا تكون
دقيقة كما في الدراسات العالمية بسبب عدم
متابعة مرضانا؛ منها مثل ارتفاع الضغط
الدموي الانقباضي، زيادة نسبة شحوم الدم
وعدم التأثير على قيم سكر الدم.

أما التأثيرات الجانبية لهذه الحبوب حسب
أقوال المستفيدة فكانت ضئيلة جداً وقد لا
تذكر.

تضيقات المريء

Esophageal Stenosis

معتر نابلسي - كلية الطب - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. مازن حداد

لقد تضمنت الدراسة مايلي:

دراسة حالات التضييق المريئي التي تم
علاجها في مستشفى الأطفال الجامعي وذلك
في الأعوام: ١٩٩٦-١٩٩٧-١٩٩٨-١٩٩٩-
٢٠٠٠.

وتأتي أهمية هذه الرسالة من كونها أول رسالة
تجري في قسم الأطفال حول التضيقات
المريئية. ولقد تم تصنيف الحالات حسب
المسببات ونسبها المختلفة من تضيقات ناجمة
عن الحروق المريئية بالكاويات إلى تلك
الناجمة عن: الأتريجيا المريئية - الأكالازيا -
القلس والفنق الانزلاقي مع التهاب المريء
الهضمي - التهاب المريئي الهضمي والقلس -
الحلقات الوعائية - انحلال البشرة الفقاعي.

مشافينا، والشروط الواجب توافرها عند استخدام هذا الدواء، والتغيرات التي يمكن أن تطرأ على المريض أثناء استخدامه، والمراقبات التي يجب أن تكون موجودة أثناء استخدامه.

الإصابات الكلوية في فرغرية هينوخ شونلاين

Renal Injuries of Henoch Schonlien Purpura

علاء الأحمد - كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ.د. عدنان الصباغ
مقدمة:

فرغرية هينوخ شونلاين هي التهاب أوعية
جهازية يصيب الأوعية الدموية الصغيرة.
تتألف هذه المتلازمة من مظاهر جلدية،
بطنية، مفصليّة، وكلوية.

هدف الدراسة:

دراسة الإصابات الكلوية في سياق فرغرية
هينوخ شونلاين تمت الدراسة بين عام
١٩٩٧-١٩٩٩ في مشفى الأطفال الجامعي
بدمشق.

النتائج:

كان عدد الحالات خلال فترة الثلاث سنوات
٨٢ حالة وجدت خلالها ٣٦ حالة إصابة كلوية
أي بنسبة ٤٤ %.

المنافشة:

من خلال الدراسة لم نجد اختلافاً في سير
المرض رغم اختلاف طريقة المعالجة وهذا
يتوافق مع الدراسات العالمية.

التوصيات:

بما أن إنذار المرض جيد فإن معظم المرضى
لا يتلقون علاج نوعي. يمكن تطبيق
الستيروئيدات في الإصابات الكلوية الأشد.
أيضاً بالنسبة لخزعة الكلية هناك استطبابات

درست الحالات السابقة من حيث التوزع
لفئات الأعمار والأجناس - ثم درست كل حالة
على حدة من حيث التوزع السابق -
الاختلاطات مثل ذات الرئة وفشل النمو
والإثقاب المريئي والحاجة للتفميم المريئي
وزرع الكولون - كما درست من حيث
التظاهرات السريرية وأجريت مقارنة بين
الأسباب. ومن مجمل ما سبق تم التوصل إلى
مجموعة هامة جداً من النتائج والتوصيات
مقارنة بالدراسات العالمية.

التسكين بالريمي فنتانيل في التخدير العام عند الأطفال ومقارنته باستخدام الفنتانيل

Analgesia with Remifentanyl Hcl in General Anesthesia at Pediatrics and Compared with using Fentanyl

حسين عبد الهادي السماوي -

كلية الطب البشري. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. منى عباس

تم تطبيق الريمي فنتانيل على ١٠٠ حالة
سريرية أجري لها عمل جراحي في الأقسام
المختلفة، وكانت بحاجة إلى التخدير العام.

تم تطبيق الدواء بالجرعات العالمية
المدرسة، والمجربة من قبل منظمة الصحة
العالمية، ودرست جميع التأثيرات الجانبية
للدواء أثناء استخدامه، وتمت مراقبة المرضى
بواسطة وسائل المراقبة الواجب تواجدها عند
استخدام الدواء. وسجلت التغيرات التي تطرأ
على المريض أثناء العمل الجراحي في ورقة
المراقبة الخاصة بكل مريض وتعديل جرعات
التسريب حسب هذه التغيرات.

أجري مقارنة النتائج مع الدراسات العالمية
المتوفرة، وتم استخلاص النتائج والشروط
الخاصة بتطبيق هذا الدواء، وفائدته السريرية
في التخدير العام وإمكانية استخدامه في

حديثة يمكن الأخذ بها.

أهمية التصوير الشعاعي في تشخيص أورام الكلية

The Importance of Raqdiology for diagnosing Kidney Tumors

محمد سليم المهاني.

كلية الطب البشري. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد بسام الصواف

تقسم أورام الكلية إلى مجموعتين كبيرتين:

- أورام سليمة: تتضمن: الأدينوما الانكوستوما - الهيمانجيوما - الميوما - الليوما - الفيبروما - التشوه الوعائي - الانجيوميوليوما - أورام الجهاز قرب الكبي (رينيوما).

- أورام خبيثة: ورم الخلية الكلوية Renal Cell Carcinoma (الأدينو-كارسينوما أو الهيبيرنوما) بنسبة ٨٦%.

- كارسينوما الخلايا الانتقالية - Transitional Cell Carcinoma.

- كارسينوما الخلايا الشائكة Squamous Cell Carcinoma.

- للمفوما والابيضاض.

- الساركوما.

- ورم ويلمز أو النوروبلاستوما.

- النفاقل.

الأعراض السريرية: معظم الأورام الكلوية تتظاهر بواحد أو أكثر من المظاهر التالية:

١- البيلة الدموية.

٢- ألم الخصرة.

٣- كتلة مجسوسة بالخاصرة.

٤- بدون أعراض.

٥- حرارة - نقص وزن.

٦- مظاهر غدية: فرط توتر شرياني - ترجل تندي.

الإضطرابات الشحمية لدى مرضى الداء السكري

Lipid Disorders of Diabetes Mellitus Patients

نجاح العبد الله - كلية الطب. جامعة دمشق.

إشراف: أ.د. محمد محجوب الجبرودي.

هدف الدراسة:

مقارنة نسبة حدوث الاضطرابات الشحمية بين مرضى الداء السكري من النمط الأول (المعتمدين على الأنسولين) IDDM، وبين مرضى الداء السكري من النمط الثاني (غير المعتمدين على الأنسولين) NIDDM تم إعطاء بعض النصائح والتوصيات بشأن الوقاية من الاضطرابات الشحمية لدى هؤلاء المرضى، وبالتالي تخفيض نسبة الاختلاطات الناجمة عن هذه الاضطرابات. تم جمع العينات من المرضى مراجعي مشفى المواساة، الأسد الجامعي ومشفى تشرين العسكري حيث تمت معايرة سكر الدم والكولسترول الكلي والجليسيريدات الثلاثية وكذلك HDLc و LDLc بعد صيام ١٢ ساعة على الأقل. حيث تمت الدراسة على ٣١٨ مريض من النمط IDDM و ١١٢ من النمط NIDDM فكانت نسبة ارتفاع ووالجليسيريدات الثلاثية لدى المرضى من النمط IDDM ٢٢,٣% ونسبة ارتفاع الكولسترول الكلي ١١,٦% ونسبة ارتفاع LDLc ١١,٦% أما نسبة إنخفاض HDLc ٥,٣% أما نسبة ارتفاع ووالجليسيريدات الثلاثية لدى المرضى من النمط NIDDM فكانت ٢٨,٣% ونسبة ارتفاع الكولسترول الكلي ٢٨,٩% ونسبة ارتفاع LDLc فكانت ١٨,٢% أما نسبة إنخفاض HDLc لديهم فكانت ٩,٩%.

فالاضطرابات الشحمية كانت ذات نسبة أعلى لدى المرضى من النمط NIDDM بسبب وجود ظاهرة المقاومة للأنسولين والسمنة لدى مرضى NIDDM ولذلك فإن الاختلاطات الناجمة عن هذه الاضطرابات هي أعلى في النمط NIDDM عنها في النمط IDDM.

دراسة مقارنة بين بتر اللب بماءات الكالسيوم مع بتر اللب بالعظم المجفف والمجمد في الأرحاء المؤقتة عند الأطفال

A Comparative Study Between Calcium Hydroxide Pulpotomy and Freeze Dried Bone Pulpotomy in Primary Molars in Children

جنى السالم -

كلية طب الأسنان - جامعة دمشق.

إشراف: أ. د. محمد نبيه خردجي.

كان هدف البحث تقييم تأثير العظم البشري الإسوي القشري مخسوف المعدن والمجفف والمجمد، مقارنة بماءات الكالسيوم قاسية التصلب عند استخدامها كمادتين مغطتين بعد بتر لب الأرحاء المؤقتة. أجري بتر اللب في ١١٦ رحي مؤقتة لدى ٣٦ طفلاً راوحت أعمارهم بين ٣،٦ و ٩ سنوات. طبقت مادة العظم المجفف والمجمد FDB في ٥٨ رحي في حين طبقت ماءات الكالسيوم $(Ca(OH)_2)$ Life في الأرحاء الباقية النظيرة، غطيت المادتان برفاقة قصديرية معقمة وختمت الحفر بـ IRM ورممت الأسنان بالأملمغ. أجريت المتابعات السريرية والشعاعية بعد مرور ٣ أشهر و ٦ أشهر و ١٢ شهراً.

كانت نسبة النجاح الكلي بعد استخدام $(Ca(OH)_2)$ تفوق تلك المشاهدة بعد استخدام FDB وذلك خلال فترات المتابعة الثلاث. ($P < 0.005$)

لم نلاحظ وجود فروق دالة إحصائية بين نسب تشكل الجسر المتكلس في المجموعتين وذلك خلال فترات المتابعة الثلاث. لم تظهر دراستنا وجود علاقة بين عدد السطوح المنخورة نخراً نافذاً ونتائج المعالجة بالمادتين، في حين تبين أن FDB هو أكثر حساسية من $(Ca(OH)_2)$ عند استخدامه في بتر لب الأرحاء التي يزيد عدد سطوحها المنخورة نخراً نافذاً، على سطح واحد. لم يكن النجاح متعلقاً بوجود أو غياب النزف بعد تطبيق المادتين. في حين كانت نسبة النجاح بعد استخدام $Ca(OH)_2$ أعلى مما هي عليه في مجموعة FDB، وذلك في الأرحاء التي حدث فيها نزف تال لتطبيق المادتين. لم يظهر في دراستنا أن لامتصاص الداخلي علاقة بوجود أو غياب النزف التالي لتطبيق $Ca(OH)_2$ في حين كان غياب الامتصاص الداخلي متعلقاً بغياب النزف بعد المعالجة بـ FDB. لم نحصل على علاقة إحصائية بين حالة جذور الأرحاء ونتائج المعالجة بالمادتين. في حين ظهر أن FDB هي أكثر حساسية من $(Ca(OH)_2)$ عند استخدامها في بتر لب الأرحاء المؤقتة ذات الجذور الممتصة امتصاصاً لا يزيد على ثلثها الذروي.

أظهرت دراستنا أن حشوات الأملمغ لا تصلح لاستخدامها كترميم نهائي بعد بتر لب الأرحاء المؤقتة. استنتجنا من بحثنا هذا تفوق ماءات الكالسيوم على العظم المجفف والمجمد عند استخدامها في بتر لب الأرحاء المؤقتة لدى الأطفال، وننصح بإجراء دراسات أخرى تثبت هذه النتيجة.

كشف الإسهالات الناجمة عن حمة الروتا بطريقة التراص باللاتكس عند الأطفال تحت عمر السنتين

Detection of Rotavirus by Latex agglutination in Cases of Diarrhea

in Children under Two Years of Age

أحمد السحار - كلية الطب. جامعة دمشق.
إشراف: أ.م.د. صلاح الدين شحادة.

الهدف من الدراسة هو معرفة نسبة إنتشار الإسهالات الناجمة عن حمة الروتافيروس إلى الإسهالات الحادة الغير قيحية التي تصيب الأطفال تحت عمر السنتين وذلك من خلال دراسة الإسهال الحاد غير القيحي عند ١٥٠ طفل منهم ٨١ ذكر و ٦٩ أنثى مع دراسة مرافقة لـ ٢٠ طفل سليم لا يشكون من أعراض هضمية مرضية وذلك باستخدام طريقة التراص باللاتكس للكشف عن مستضدات الروتافيروس في البراز.

كانت نسبة الأطفال المصابين بالإسهال مع إيجابية اختبار الروتافيروس ٢٨,٦% (٤٣/١٥٠) منهم ذكور ٥٨,١% (٤٣,٢٥) وإناث ٤١,٨٧% (١٨,٤٣) وبمقارنة الأعمار لوحظ ارتفاع نسبة الإصابة عند الأطفال بعمر ٦-١٢ شهر حيث كانت النسبة ٦٠,٤% (٤٣,٢٦) وكانت نسبة الأعراض السريرية المرافقة لإيجابية اختبار الروتافيروس هي الإقياء بنسبة ٨٦,٠٤% والارتفاع الحروري ٥٥,٨% وشوهد التجفاف في ٥١,١٦% إضافة إلى الإسهال المشاهد عند جميع الأطفال وقد لوحظ أن نسبة الإصابة في أشهر الشتاء أعلى منها في بقية الفصول الأخرى. وبالمقابل لم نجد إيجابية الروتافيروس عند الأطفال السليمين (مجموعة الشاهد) لذا يمكن أن نستنتج أن الخمج بالروتافيروس يشكل نسبة لا بأس بها من الإسهالات عند الأطفال كما أن هذا الخمج كان مترافقاً مع الأعراض في معظم الحالات.

علاج النوب الربوية

Treatment of Acute Exacerbations of Asthma

خالد الجمعة الحديد -

كلية الطب البشري. جامعة دمشق
إشراف: أ.د. محمد مسالمة
الهدف:

كان الهدف من هذا البحث العلمي دراسة مدى تأثير استخدام التيوفيللين الوريدي في علاج النوب الربوية الحادة وذلك عند إشراكه مع السالبوتامول ارذاذاً. مقارنة مع السالبوتامول ارذاذاً فقط.

الطرائق:

تمت الدراسة على ١٠٠ مريض راجعوا قسمي الإسعاف في كل من مشفى الموساة ومشفى الأسد الجامعي وهم يعانون من نوب ربوية حادة حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين حسب النظام العلاجي السابق.

النتائج:

لم نلاحظ أن استخدام التيوفيللين مشتركاً مع السالبوتامول أدى إلى توسع قصبي أكثر مما هو عليه الحال باستعمال السالبوتامول مفرداً.

- يجب إضافة التيوفيللين الوريدي في حال عدم استجابة المريض للأدوية الأخرى مثل منبهات B٢ الإنشاقية والستيروئيدات الجهازية.

الاستنتاجات:

يمكن تخفيف العبء والخسارة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض ويتم ذلك من خلال:

- ١- التعرف الجيد على المرض.
- ٢- اختيار الأدوية المناسبة.
- ٣- علاج النوب الحادة.
- ٤- تحديد وتجنب العوامل المحرصة.
- ٥- تنقيف المرض.

والنيوفيلين دواء رخيص ومفيد في علاج الربو المزمن الذي لم يُسيطر عليه بالأدوية التقليدية والاستخدام الآمن لهذا الدواء يحتاج إلى البدء بجرعات قليلة مع قياس التركيز المصلي لتعديل الجرعات بشكل مناسب وفي النهاية تؤكد على الوقاية من المرض وذلك بالالتزام بالتوصيات السابقة.

تجريف الرحم الاستقصائي

Investigator Uterine Curettage

فواز أسعد - كلية الطب - جامعة دمشق.
إشراف: أ.د. محمد نذير ياسمينية.

تتناول الدراسة أهمية التجريف الاستقصائي كوسيلة تشخيص رئيسية لسرطان بطانة الرحم، إضافة لدوره في كشف الآفات ما قبل الخبيثة في البطانة ولا سيما حالات فرط التصنع بأنماطه المختلفة حيث يترافق فرط التصنيع البسيط مع زيادة طفيفة في حدوث سرطان البطانة على العكس من فرط التصنع المركب لا سيما بوجود الأنموذجية الخلوية، إذ يترافق مع خطورة عالية للتسرطن، كان الهدف الأساسي للتجريف في دراستنا أخذ خزعات من باطن الرحم وباطن العنق للدراسة النسيجية في حالات النزف الرحمي الشاذ، وكان الإنتان وتقيح الرحم أهم مضادات استتباب هذا الإجراء، كما بينا دور التجريف في دراسة الآفات العنقية، وفي تشخيص قصور الدور اللوتيني وذلك بتحديد عمر البطانة بإجراء خزعة بواسطة مجرفة نوفاك في اليوم ٢٦.

وقد سلطنا الضوء على أهمية استخدام تنظير باطن الرحم كوسيلة أساسية لتشخيص سرطان البطانة كون التجريف قد لا يصل لبعض البؤر المصابة في بطانة الرحم، ونوهنا إلى توفر تقنيات جديدة لأخذ الخزعة من بطانة الرحم بواسطة تقنية الرشف، وأجرينا دراسة مقارنة ما بين نتائج التجريف والخزعة المأخوذة

بمجرفة نوفاك في نفس المريضة من مجموعة مؤلفة من ٦٣ مريضة وأبدت هذه الدراسة توافقاً بين التجريف وخزعة نوفاك عند ٧٤,٦% من مجموعة الدراسة، وعدم توافق عند ١٢,٧% من المجموعة، وكانت كمية الخزعة قليلة غير قابلة للتقييم عند ١٢,٧% من مريضات المجموعة.

التهاب السحايا القحي عند الوليد

Neonatal Bacterial Meningitis

مصون السعدي - كلية الطب - جامعة دمشق
إشراف: م.د. د. مطيع الكرم

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أحد أخطر الأمراض التي تواجه حديث الولادة، وتعطي فكرة عن العوامل المؤهبة لهذا المرض وتظاهراته السريرية ومعرفة العوامل الجرثومية المسيطرة وأساليب المعالجة المطبقة والاستفادة من النتائج بهدف الوقاية من هذا المرض وكشفه باكراً ما أمكن وتبويره بالطرق العلاجية الملائمة لرفع نسبة الشفاء والإقلال من الوفيات والاختلاطات العصبية.

هذا وقد تمت الدراسة في مشفى الأطفال في الفترة الواقعة بين ١٩٩٨/١/١ حتى ٢٠٠٠/١٠/٣١ وشملت ٢٤٢ وليد مقبول في شعبة الوليد والحواسن بتشخيص التهاب السحايا.

أجري للمرضى زرع دم وتحسس، بزل قطني مع إجراء دراسة كاملة للسائل الدماغي الشوكي تشمل الفحص الكيماوي الخلوي والتحري المباشر والزرع، تحاليل مخبرية دموية لكشف الاضطرابات الكيماحيوية، CT للدماغ وذلك حسب الوضع السريري للمريض.

وخلصت الدراسة إلى نتائج تجلت بتوصيات عدة كتوجيه الأمهات إلى ضرورة مراجعة

المشفى عند حدوث أي طارئ على الوليد، أهمية العناية بظروف التعقيم والنظافة في قاعات العناية بالوليد بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المخبرية والعناية بصحة الحامل ورفع مستواها الثقافي والصحي واستعمال الصادات وقائياً عند اللزوم.

دراسة اعتلال التخثر المنتشر داخل الأوعية (DIC) عند مرضى الإبيضاضات النقوية الحادة (AML)

Disseminated Intravascular Coagulopathy in Patients Affected with Acute Myeloid Leukemia

منصور الشحات - كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. أصف ديوب

إن الهدف من الدراسة هو تحديد نسب الإصابة باعتلال التخثر المنتشر داخل الأوعية عند المرضى المصابين بابيضاض دم نقوي حاد ودراسة الهيبارين في الوقاية منه.

تضمنت الدراسة ٥٠ مريضاً مصاباً بابيضاض دم نقوي حاد راجعوا شعبة أمراض الدم في مشفى المواساة ومشفى الأسد الجامعي خلال عام ٢٠٠٠ م.

حيث قام الباحث بدراسة هؤلاء المرضى من حيث استعراض قصصهم المرضية وأجري لهم الفحوص السريرية المناسبة ودرس الفحوص المخبرية التي أجريت لهم، كما درس الاستقصاءات التي اعتمد عليها لتشخيص الإبيضاض النقوي الحاد وتحديد نوعه.

ثم قام الباحث بإجراء مسح لاعتلال التخثر المنتشر داخل الأوعية عند هؤلاء المرضى بإجراء معايير دموية للفيبرينوجين ونواتج تدرك الفيبرين وزمن البروترومبين وزمن الترومبلاستين الجزئي ومن خلال ذلك قام بتحديد تواتر حدوث اعتلال التخثر المنتشر

داخل الأوعية في كل نوع من أنواع الإبيضاضات النقوية الحادة ثم تعرّض لدور الهيبارين عند هؤلاء المرضى في الوقاية من هذا الاختلاط الخطير ثم قام الباحث بمقارنة النتائج التي حصل عليها مع الدراسات العالمية السابقة.

ومن خلال استعراض النتائج التي حصل عليها تبين أن أشيع أنواع الإبيضاضات الحادة التي تترافق مع اعتلال تخثر هو M٣ ويأتي بعد ذلك M٥ و M٢ وهذا يتوافق مع النسب العالمية، وكذلك تبين أن للهيبارين دور هام في الوقاية.

الموت المفاجئ من الناحية الطبية الشرعية

Sudden Natural Death from the Forensic Point of View

عبد اللطيف قباتي - كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. زياد درويش

يهدف هذا البحث إلى دراسة أسباب الوفيات المفاجئة وتحديد الأسباب الرئيسية المسببة لها ضمن واقع الممارسة الطبية الشرعية وتحديد نسبة الوفيات المفاجئة من مجموع الوفيات العام ضمن دراسة إحصائية عامة لذلك. حيث تمت دراسة الوفيات التي تم الكشف عنها في مركز الطبابة الشرعية بدمشق خلال عامي ١٩٩٨-١٩٩٩ حيث تم تحديد سبب الوفاة بشكل أساسي هنا اعتماداً على الفحص الظاهري للجثة والقصة وظروف الحادث، وتم دراسة الوفيات المفاجئة الطبيعية ضمن هذه الوفيات حيث شكلت الأمراض القلبية السبب الرئيسي لها بنسبة ٣٢,١ %، وتم دراسة حالات الوفيات التي تم فيها تشريح الجثة خلال الفترة الواقعة بين عامي ١٩٩٣-٢٠٠٠ فكان عددها ٢٥٦ حالة وفاة مشرحة وكان عدد

أما القسم الثاني من الدراسة فقد أجري في مشفى الأسد الجامعي ومركز الطب النووي وضم ٣١ مريضاً بعد استئصال موثة جذري و١٧ مريضاً بعد معالجة شعاعية و ١٢٠ مريضاً خلال المعالجة الهرمونية وكانت تجرى قياسات دورة للـ PSA وتكشف عودة الورم بإجراء التنظير البولي MRI. CTSCAN...

وتبين بهذه الدراسة أن قيم الـ PSA بعد المعالجة تتماشى مع شفاء أو عودة الورم. ومن هذه الدراسة يمكن أن نستخلص أن الـ PSA هو مشعر ورمي فعال في كشف سرطان الموثة ومتابعة قيمه بعد المعالجة تعكس صورة صادقة عن استجابة أو عدم استجابة المريض للعلاج.

إحصار الكاحل والتخدير العام والتخدير الشوكي وفق الجافية

Ankle Block and General Anesthesia and Spinal or Epidural Anesthesia

محمود جاكيش - كلية الطب - جامعة دمشق
إشراف: أ.د. هند الدغلي

الهدف من الدراسة هو بيان فوائد حصار الكاحل من أجل تخدير مرضى عمليات القدم بأقل خطورة ممكنة وبطريقة آمنة.

حيث تمت الدراسة على ١٥٠ مريض في مشفى المواساة والأسد الجامعي خضعوا لعمليات جراحية مختلفة على القدم مثل بتر القدم - كسور أمشاط - تنظير جروح - إغلاق جروح وتم تقسيم المرضى إلى ٣ مجموعات الأولى أجري التخدير بواسطة حصار الكاحل والثانية تخدير عام والثالثة تخدير فوق الجافية أو شوكي. وتمت المقارنة بين المجموعات الثلاث عن طريق تسجيل النتائج على جداول خاصة أعدت لهذا البحث حيث

الوفيات المفاجئة ضمنها ١٥٣ حالة ٥٩,٨% حيث شكلت الأمراض القلبية السبب الرئيسي لمعظم الوفيات حيث بلغت نسبتها ٦٤,٧% وشكلت الإناث حوالي خمس المجموع الكلي للوفيات المفاجئة. ولوحظ أن عدد الوفيات التي يتم تشخيصها من خلال تشريح الجثة منخفض بشكل كبير ٤% وكما لوحظ أن هناك توافق بين نتائج دراستنا والدراسة العالمية من حيث كون الأمراض القلبية السبب الرئيسي للوفيات المفاجئة الطبيعية حيث تشكل ثلثي حالات الوفيات المفاجئة الطبيعية.

دور الـ PSA في تشخيص ومتابعة مرضى سرطان الموثة

The Role of PSA in Diagnosis and Follow up of Prostate Cancer Patients

أحمد اللباد - كلية الطب - جامعة دمشق.
إشراف: أ.د. إبراهيم برغوث.

تهدف الدراسة في هذا البحث إلى تحديد دقة الـ PSA في كشف سرطان الموثة مقارنة بالمس الشرجي DRE إضافة إلى إثبات أهمية هذا المشعر الورمي في متابعة الاستجابة العلاجية لسرطان الموثة.

أجري القسم الأول من الدراسة في مشفى المواساة والأسد الجامعي وكان عدد المرضى المدروسين ٦٤١ مريضاً أجري مساً شرجياً مع اختبار الـ PSA وكانت تجرى الخزعة موجهة بالإيكو عبر الشرج أو الأصبع في حال المس الإيجابي أو إذا كانت قيم الـ PSA أكبر من ١٠ انغ/مل أو نسبة الـ PSA الحر إلى الكلي أقل من ١٨% لقيم الـ PSA الكلي بين ٤ و ١٠ انغ/مل. وتبين بهذه الدراسة أن دقة الـ DRE في كشف سرطان الموثة هي ٦٣,٥% في حين كانت دقة الـ PSA ٩٦,٥%.

أظهرت أن حصار الكاحل يمتاز بالبساطة والأمان وقلة الاختلاطات وبإمكانية التسكين بعد العمل الجراحي. ثم وضعت النتائج والتوصيات من أجل الحصول على تخدير أفضل ومتطور.

الإصابات القلبية عند وليد الأم السكرية

Casdiac Malformation in Infants of Diafetic Mothers

أحمد حمود علي - كلية الطب - جامعة دمشق
إشراف: أ.د. منذ شيخ الحدادين

كان هدف الدراسة هو دراسة حالات الإصابة القلبية لدى وليد الأم السكرية وبيان مدى أهميتها لديهم.

تضمنت الرسالة مقدمة نظرية جيدة، وتتألف الدراسة العملية من جزأين: جزء راجع لفترة خمسة سنوات (١٩٩٥-١٩٩٩) وتضمن الـ ٩٧ حالة. وجزء مستقبلية خال عام كامل (١٩٩٩-٢٠٠٠) وتضمن ٦٠ حالة. وبين الدارس نسبة هذه الإصابات للقبول المتعلق بأبناء الأم السكرية كما بين نسبة وعلاقة الجنس بالحدوث. كما بين نسبة الحدوث لكل نمط من الإصابات القلبية بالنسبة لأبناء الأم السكرية وبالنسبة للإصابات القلبية كما بين نوعية التزامن مع الأفات القلبية الأخرى وكذلك مع الاختلاطات غير القلبية. وبين الإنذار لكل نوع من أنواع الإصابات مع مقارنة بدراسة داخل القطر وخارجه.

واستخدام الدارس وسائل تشخيص شاملة تضمنت الإيكو دوبلر للقلب مع إجراء صورة صدر شعاعية وكذلك تخطيط قلب كهربائي، إضافة إلى إجراء تحاليل مخبرية وكذلك إجراء إيكو بطن (لدراسة الكليتين) وإجراء إيكو دماغ وأحياناً تصوير طبقي محوري للدماغ.

وعرض الدارس نتائجها التي بينت أهمية الإصابة لدى وليد الأم السكرية وكونها شكلت نسبة كبيرة نسبة لبقية الإصابات، مع مناقشة هذه النتائج ومقارنتها مع دراسات أخرى. وخرج بتوصيات جيدة تتضمن أهمية الضبط الجيد للسكري عند الأم الحامل السكرية وكذلك أهمية الدراسة القلبية لدى وليد الأم السكرية.

استخدام الحدث العصبي في إحصار الظفائر والأعصاب المحيطية في الطرف العلوي

Utilisation Nervostimulateur Pour Bliquer Les Plexus It Nnever Perpheriales de La Branehe Superieur

فادي طنوس . كلية طب . جامعة دمشق
إشراف: أ.د. محمد علي أرناؤوط

الهدف من الدراسة إدخال تقنيات جديدة في إحصار الأعصاب المحيطة والظفائر العصبية في الطرف العلوي وذلك باستخدام الحادث العصبي المحيطي nervostimulator كذلك الإبر المعزولة من أجل خفض نسبة الفشل والاختلاطات المترافقة مع هذا التدخل التخديري. وإمكانية استخدام أكثر من مخدر موضعي.

لقد تمت الدراسة على أكثر من مئة مريض خضعوا لتدخل جراحي على الطرق العلوي حصراً بشرط أن تتوفر لديهم الشروط اللازمة لإجراء الحصار باستخدام المحرض لقد العصبي لقد اعتمدنا في اختبار المرضى التي تتوفر لديهم الشروط الآتية على ما يلي:

١- موافق المريض لإجراء التخدير باستخدام الحادث العصبي.

٢- الأرضية النفسية للمريض الملائمة لإجراء هذا النوع من التدخل.

٣- أن يكون داخل جراحي على الطرف العلوي وأن لا تكون مدته أطول من مدة الحصار المتوقعة.

٤- عدم إمكانية التخدير العام.

٥- توافر عوامل خطورة مختلفة (قصور قلب، داء سكري، ربو،... إلخ) لقد اعتمدنا فس دراستنا هذه في تقسيم المرضى إلى مجموعتين:

١- المجموعة الشاهدة A: طبق الحصار

بدون الحادث العصبي.

٢- المجموعة B: طبق الحصار مع

استخدام الحادث العصبي.

تمت الدراسة الإحصائية والعلمية تبعاً لي:

١- العمر والجنس.

٢- العمل الجراحي ومدته.

٣- الأمراض المرافقة.

٤- عوامل الخطورة.

٥- المواد المخدرة.

٦- نوع المقاربة والتكنيك المستخدم.

لقد صنفنا النتائج في جداول خاصة وتمت المقارنة بين مختلف الطرق المستخدمة ثم وضعت النتائج والتوصيات وأجريت مقارنة مع دراسات عالمية حديثة من أجل الحصول على نتائج أفضل.

التهابات النسيج الداعمة عند الحوامل

Periodontitis In The Pregnants

تهامة يوسف .

كلية طب الأسنان . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد عصام عوا

الحمل حالة فيزيولوجية مترافقة بتغيرات عدة تتعكس آثارها على الحفرة الفموية بشكل عام، وعلى الأنسجة حول السنية بشكل خاص.

ودر استنا هذه سريرية، مناعية، ونسجية للنسج الداعمة خلال الحمل.

بلغت العينة ٤٠ حاملاً، ودرست لهم المشعرات السريرية الآتية: مشعر اللويحة، النزف، الالتهاب اللثوي، الضخامة، ومشعر عمق الجيوب.

وأخذت عينات دموية من الحوامل لتحري C_٢ والأضداد المناعية وأجريت لهن خزعات لثوية وبالنتيجة لوحظ ارتفاع المشعرات السريرية لدى المصابات بالتهاب اللثة والتهاب النسيج الداعمة، وارتفاع C_٢ بالمصل مترافقاً مع ارتفاع مشعر اللويحة، وارتفعت الأضداد عند المصابات بخراجات حول سنية وأورام حملية.

ونسجياً سيطرت للمفاويات والعدلات في الإلتهاب اللثوي والمصوريات في إتهاب الانسجة الداعمة.

مقارنة بين التخدير العام الإنشائي والتخدير العام المتوازن في عمليات استئصال اللوزات عند الأطفال

A Comparassion Between Inhalational And Balanced general Anesthesia In Childen

مراد طلال . قسم التخدير والإنعاش .

كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عبد القادر دعدو

الهدف من الدراسة هو إجراء مقارنة بين طريقتي التخدير العام الإنشائي والمتوازن من حيث التخديرية - الاختلاطات أثناء الجراحة - اختلاطات فترة الصحو - فترة البقاء بالإنعاش حيث تمت الدراسة على ٢٠٠

٨٠,٧% وأكثر الاختلاطات الولدية شيوعاً
كان نزف الخلاص ٢١,٩%, وتم إجراء ٢١
استئصال رحم ولادي بنسبة ٦,٩٧% وتم إنقاذ
مريضات بوضع دكة مكان النزف وإخراجها
من المهبل. وشكل الخداج ٣٩,٥% وأكثر من
نصف أسباب الوفيات ما حول الولادة.

امراضية النفخات المسموعة في سن الدراسة الابتدائي

Pathogenicity Of Heard Murmurs In Childhood (Primary School)

يوسف خالد. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. مفيد الجوخدار

أن سماع النفخات القلبية عند الأطفال أمر
شائع كما هو معروف، وقد يكون هناك كثير
من التشخيص الخاطئ فيما يخص أمراضية
هذه النفخات، وبراعتها.

فقد كان الهدف من الدراسة معرفة نسبة
انتشار النفخات القلبية عند الأطفال في سن
الدراسة الابتدائي، بالإضافة لمعرفة نسبة
انتشار النفخات البرينة والمرضية، ونوع كل
منها، وسببها، وأفضل الطرق في التشخيص،
وأرخصها، وأسهلها.

تم في هذه الدراسة إجراء الفحص السريري
الكامل مع التركيز على الفحص القلبي لعينة
من أطفال المدارس الابتدائية ٤٠٦ طفلاً
وظلة، حيث تم تحديد عدد النفخات المسموعة
ونوعها ونسبة كل منها.

أعيد الإصغاء القلبي لمجموعة الأطفال الذين
تم إصغاء نفخة قلبية لديهم وعددهم ٧٨ ثم تم
إجراء التصوير بالإمواج فوق الصوتية لهذه
المجموعة، وبناء على ذلك تم تحديد نسبة
النفخات البرينة والمرضية ونوع كل منها.

**وقد تبين من دراستنا أن انتشار النفخات
وبشكل عام هي ٢٠%، وأن نسبة عالية من
النفخات المسموعة هي نفخات برينة ٧٧%،**

مريض في مشفى الموساة بقسم عمليات
اللوزات وتم اختيار المرضى حسب تقييم
الجمعية الأمريكية ASA على الفئة الأولى فقط
وكان نوع العمل الجراحي المزمن إجراؤه
عمليات استئصال اللوزات عند الأطفال
وكانت الأعمار تتراوح بين (٥ - ١٠) سنوات
أجريت طريقتي التخدير (العام والإنشائي
والعام المتوازن) وتم تسجيل النتائج على
جدول خاصة أعدت لهذا البحث ثم جرى
جمع وتسجيل البيانات التي حصلنا عليها
وأجريت جداول مقارنة بين الطرق المختلف
ثم وضعت نتائج هذا البحث والتوصيات من
أجل الحصول على أفضل النتائج عند تخدير
الأطفال لعمليات استئصال اللوزات واختيار
الطريقة الأفضل.

ارتكاز المشيمة العيب

Placenta Previa

ندا العجي . كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. خالد مرعشلي

في هذا البحث العلمي الإحصائي تمت دراسة
٣٠١ حالة ارتكاز مشيمة معيب مشاهدة في
دار التوليد وأمراض النساء الجامعي في
دمشق بطريقة تحليلية خلال الفترة الممتدة من
١٩٩٧/١٠/١ إلى ٢٠٠٠/١٠/١. وكانت
نسبة حدوث الارتكاز المعيب ٦,٣١% ونسبة
تكراره ٥,٣%. تمت دراسة عوامل الخطورة
مثل التقدم في السن، تعدد الحمل، الحمل
المتعدد، سولبق عمل جراحي على الرحم،
المجبنات المعيبة، جنس المولود والتدخين.
وكانت دقة التصوير بالأمواج فوق الصوتية
لتشخيص الارتكاز المعيب ٩٦,٥%. بينت
الدراسة علاقة شدة النزف وسن الحمل عند
بدنه مع درجات الارتكاز المعيب. وكانت
طريقة الولادة الغالبة هي القيصرية بنسبة

The Antimicrobail Activity Of Some Root Canal Sealer

سمر عقيل .

قسم مداواة الأسنان . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. فيصل عبود

بمشاركة: أ. د. إلياس معلوف

إن الغاية الأساسية من المعالجات اللبية القوية الجيدة هي الحشو التام لمجموعة الأقتنية الجذرية والإقلال ما أمكن من الجراثيم الموجودة فيها وخاصة في حالات التمثوت اللبي والافات الذروية عندما تكون الجراثيم موجودة بشكل كبير، وهذا الأمر يتحقق بوسائل التحضير الجيد للأقتنية والغسل والتطهير ثم الحشو القتيوي الذي يضمن سداً ذروباً فعالاً، ولكن التعقيد التشريحي لمجموعة الأقتنية الجذرية يسهم دوماً في تشكيل مستودع جرثومي يسبب حدوث الفشل في المعالجات اللبية.

لذلك كان من الضروري استخدام معاجين حشو للأقتنية الجذرية تتوفر فيها خاصة الفعالية المضادة للجراثيم لضمان نجاح المعالجة اللبية.

إن هدف البحث هو معرفة الفعالية المضادة للجراثيم لعدد من معاجين حشو الأقتنية الجذرية وهي: أكسيد الزنك والأرجينول Zoe والدياكييت DIAKET والانودوميتازون enadoethasoneK، والسيل أبكس sealapex.

تمت الدراسة عن طريق إجراء:

١- دراسة سريرية جرثومية: وذلك لمعرفة أكثر الجراثيم واللاهوائية المسببة لمتوت اللب، ولقيس فعالية المعاجين المدروسة ضد الجراثيم بواسطة دراسة مناطق التثبيط الجرثومي لهذه المعاجين في الأغار، باختبار انتشار الأغار وذلك بواسطة أخذ نتحات جرثومية من الأقتنية الجذرية المتموتة وبعد إجراء الدراسة

٢٣%، فقط هي نفخات مرضية، كما أظهرت الدراسة أهمية التركيز على الفحص السريري الجيد وخاصة الإصغاء القلبي في رفع نسبة التشخيص الصحيح للنفخات المسموعة، وبالتالي توفير كثيراً من الجهد والمال، والقليل من قلق الأهل الحاصل عند معرفتهم بوجود نفخة قلبية لدى ولدهم.

التلاسييميا

Thalassaemia

يوسف الدالاتي . كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد عدنان سومان

إن الهدف من الدراسة هو إحصاء جميع المصابين بمرض التلاسييميا والذين راجعوا مشفى الأطفال والمواسة والأسد الجامعي.

ضمن هذه الدراسة الإحصائية ١٨٦ مريض مصاب بالتلاسييميا حيث قام البحث بدراسة توزع المرضى حسب المنطقة الجغرافية ودرجة القرابة بين الوالدين، ودراسة الأغراض والعلامات السريرية، ودراسة الفحوص المخبرية التي أجريت للمرضى، ودراسة الاختلاطات، وأخيراً دراسة الطرق العلاجية المستخدمة.

من خلال استعراض النتائج تبين أن التلاسييميا مرض شائع في بلدنا سوريا، والدور الهام للمقاربة المنهجية للمرضى الذين يشك بأن لديهم المرض في التشخيص الصحيح وبالتالي وضع الخطة العلاجية الملائمة وبذلك نتجنب أي مداخلات علاجية غير ملائمة والتي تكون ضارة للمريض أحياناً من خلال استعراض النتائج تبين أيضاً أهمية التشخيص المبكر والعلاج والمتابعة.

الفعالية المضادة للجراثيم لعدد من معاجين الأقتنية الجذرية

المخبرية أجري اختبار التحسس للمواد الأربعة المدروسة ضد الجراثيم على أوساط تحوي هذه المواد بشكلها اللين والصلب.

٢- دراسة حيوانية: وذلك لتقييم النشاط المضاد للجراثيم لمعاجين حشو الأقفية الجذرية المدروسة في الوسط الحي الممثل تحت الجلد لعظم الفك السفلي عند الأرناب، حيث تم زرع أنابيب بولي إيثيلين تحوي الجراثيم المأخوذة من الأقفية الجذرية المنموتة مع المعاجين الأربعة المدروسة تحت الجلد في عظم الفك السفلي للأرناب ثم نزعته هذه الأنابيب بعد ٢٤ ساعة و ٧٢ ساعة وجرى مقارنة لتعداد المستعمرات الجرثومية قبل وبعد التجربة لمعرفة مدى تأثير المعجون على الجراثيم الموجودة في الأنابيب.

دلت نتائج الفحص المجهرى للنتحات الجرثومية على وجود العصيات الإيجابية الغرام والعصيات سلبية الغرام والمكورات إيجابية الغرام والمكورات سلبية الغرام بشكل مفرد أو مختلط وبنسب متفاوتة عند المرضى ولكن في الغالب كانت الجراثيم بشكل مختلط.

كانت الزمر الجرثومية الموجودة في حالة الانتانات الجذرية على الغالب هوائية لأن الحفرة اللبية مفتوحة والأنواع الجرثومية الموجودة كانت متشابهة مع تلك الموجودة في النبيت الجرثومى الفموي وأغلب الأنواع كانت المكورات العقدية إيجابية الغرام. عند دراسة متوسطات أقطار مناطق التثبيت الجرثومي إحصائياً تبين أن الفعالية المضادة للجراثيم كانت مرتبطة بنوع المعجون وإن هناك فرقاً ذو دلالة إحصائية بين المعاجين الأربعة بالحالة اللينة حسب الترتيب التالي: أكسيد الزنك والأوجينول ٩,٥٨ مم،

الأندوميتازون: ٨,٧٦ مم، السيل أيكس ٤,٨ مم، وأيضاً كان هناك فرقاً ذو دلالة إحصائية بين المعاجين الأربعة بالحالة الصلبة حسب ما يلي: أكسيد الزنك والأوجينول ١٠,٢ مم، والدياكيث ٩,٣٢ مم، والأندوميتازون ٧,٣٦ مم. ولكن لم يكن هناك فرقاً ذو دلالة إحصائية بين الفعالية المضادة للجراثيم لمواد الحشو بالحالتين اللينة والصلب.

في الدراسة الحيوانية لم يكن هناك نمو للمستعمرات الجرثومية عندما وضعت المعاجين ممزوجة مع الجراثيم في أنابيب البولي إيثيلين بعد ٢٤ ساعة و ٧٢ ساعة من الزرع على جدران الأقفية الجذرية في الحالة السريرية.

كلن هناك نمواً للمستعمرات الجرثومية تفاوت حسب نوع المعجون ومدة الزرع عند وضع المعجون في أنبوب البولي إيثيلين ووضع الجراثيم عند النهاية المفتوحة للأنبوب ولمسافة ٢ ملم وذلك بعد فترتي الزرع ٢٤ ساعة و ٧٢ ساعة.

عند دراسة القيم المتوسطة لنمو المستعمرات الجرثومية بعد ٢٤ ساعة سجلت القيم التالية: معجوني الدياكيث والأندوميتازون ٠,٤ ، معجون أكسيد الزنك والأوجينول ١,٤ ، ومعجون السيل أيكس ٢,٠٢.

أما القيم المتوسطة لنمو المستعمرات الجرثومية بعد ٧٢ ساعة فكانت لمعجوني الدياكيث والأندوميتازون ٠,٤ ، معجون أكسيد الزنك والأوجينول ١,٦ ، ومعجون السيل أيكس ٢، ولكن لم يكن هناك دلالة إحصائية واضحة بين متوسطات نمو المستعمرات للمعاجين الأربعة بعد ٢٤ ساعة وبعد ٧٢ ساعة.

درست العلاقة بين نتائج الدراسة المخبرية ونتائج الدراسة الحيوانية بعد ٢٤ ساعة وبعد ٧٢ ساعة فلو حظ أنه يوجد ترابط إحصائي

ذوي الأعمار المتقدمة/، حيث يترافق التقدم بالسن مع تبدلات لا يمكن تجاوزها تناول عمل الأعضاء والاستجابات الدوائية وتتناول تبدلات وظائف الأعضاء ما يكشف الشدة فقط.

هناك أمراض مرافقة عند المسنين ويجب تدبيرها جيداً قبل العمل الجراحي .

إن فوائد التخدير الناحي أكبر من التخدير العام في تحديد المضاعفات في الجهاز القلبي الوعائي وتكون الصمات والخثرات وعلى الجهاز الهضمي والرئوي وكذلك تنقص مدة إقامة المريض في المستشفى بعد العمل الجراحي.

يجب العناية بالمرضى بشكل جيد بعد العمل الجراحي وتسكين آلامهم وتشجيعهم على الحركة المبكرة لوقايتهم من التهاب الوريد الخثري العميق كما يجب اعطاؤهم الصادات للوقاية من الخمج.

دراسة عودة انفتاح الشرايين الأكليلية بعد المعالجة بالستربتوكيناز في احتشاء العضلة القلبية الحادة

Studying The Patency Of Coronary Arteries After Treatment With In Acute Myocardial Streptokinase Infarction

مازن عليان . كلية الطب . جامعة دمشق
إشراف: أ. د. مروان شامية

لا يزال احتشاء العضلة القلبية مشكلة هامة رغم التقدم المذهل في التشخيص والمعالجة في العقود الثلاثة الأخيرة . وقد أجريت هذه الدراسة المستقبلية مزدوجة التعمية على المرضى المقبولين بتشخيص احتشاء عضلة قلبية حاد في مشفى الأسد الجامعي خلال الفترة الواقعة بين ١١/٤/١٩٩٩ و

بين متوسطات أقطار مناطق التثبيط للمعاجين الأربعة المدروسة بالحالة اللينة في اختبار التحسس في الدراسة المخبرية ونتائج نمو المتسمرات الجرثومية في الدراسة الحيوانية بعد ٢٤ ساعة ٧٢ ساعة.

تبين استناداً إلى نتائج الدراسة أن معجون أكسيد الزنك والأجينول هو الأفضل بين المعاجين الأربعة المدروسة من حيث فعاليته المضادة للجراثيم رغم كون المعاجين الثلاثة الباقية فعالة أيضاً وبشكل جيد.

التخدير في عمليات تبديل مفصل الورك عند المرضى ذوي الأعمار المتقدمة

Anesthesia In The Operation Of Hipreplacement In The Elderly

أمنة أحمد . كلية الطب . جامعة دمشق
إشراف: أ. د. محمد علي أناؤوط

إن تنكس مفصل الورك غالباً ما ينجم عن التهاب المفاصل الريثاني أو التهاب الفقار المقسط.

إن عملية تبديل مفصل الورك الكامل هي عملية كبيرة وتحتاج إلى تقنيات تخديرية عديدة ومتنوعة وفهماً جيداً لمخاطر هذه العملية وتعقيداتها.

يجب تقييم مرضى التهاب المفاصل قبل العمل الجراحي بشكل جيد وذلك بسبب احتمال وجود صعوبة في تدبير الطريق الهوائي والنبيب الناجم عن التشوهات التشريحية المرافقة وكذلك يجب تقييم الجهاز القلبي الوعائي والتنفسي والعصبي والكلي والكبد وذلك بسبب تشارك المرض المفصلي مع أمراض جهازية مرافقة.

وبسبب التبدلات الفيزيولوجية عند المرضى

وبلغت نسبة الإصابة بالمشعرة ٩,٨٤ % من اللواتي لديهن أعراض التهاب مهبلية.

الاستنتاجات

بذلك نجد أن طريقة الزرع أفضل من الفحص المباشر للكشف عن هذا الطفيلي، وأن عدم وجود الأعراض والعلامات لا ينفي الإصابة.

دراسة نسيجية مقارنة بين الأكياس الالتهابية وبعض الأكياس ذات المنشأ السني

histologic Comparative Study Between The Inflammatory Cysts And Some Odontogenic Cysts

شريف سليم بركات .

كلية طب الأسنان . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. قصي عزيز

الأكياس هي أجواف مرضية مبطننة ببشرة وتحتوي ضمنها على مادة سائلة أو هلامية. إن البنية النسيجية البسيطة لجميع الأكياس متشابهة ومع ذلك يميز الباحثون ثلاث أنماط لها: الأكياس الالتهابية والأكياس المنشأ والأكياس غير سنية المنشأ. وقد قمنا من أجل وضع معايير نسيجية تميز بين مختلف هذه الأكياس المدروسة وبدراسة ١٣١ كيساً جذرياً و ٧ أكياس متبقية و ٣٥ كيساً تاجياً و ١٤ كيساً سنياً متقرناً بونت بالهيماتوكسين والإيوزين و أختير عدد منها للدراسة الكيميائية النسيجية حيث لونت بكل من كاشف شيف وأزرق التولويدين وماسون ثلاثي الكروم وللدراسة الكيميائية النسيجية المناعية حيث لونت بـ السيتوكيراتين، ١١٦ C.K، ٨ C.K، ١٢ BE ٣٤ C.K وكاشف بروتيينات المورثة ١٢ bc. ولم نرى أي فرق بينهما بالملونات الكيميائية النسيجية المناعية، ولم تبد جميع هذه الأكياس قدرة على التحول الورمي وكانت جميعها متماثلة بأخذها للملونات

٣٠/١١/٢٠٠٠. وشملت ٨٣ مريضاً. وكان هدفها تقييم فائدة وأمان الستربتوكيناز المطبق وريدياً بالمشاركة مع الهيبارين والإسبرين في إعادة فتح الرشيان الإكليلي المسدود وانعكاس ذلك على وظيفة العضلة القلبية.

وقد تبين بتصوير الأوعية الأكليلية المجرى خلال الأسبوع الأول بعد احتشاء العضلة القلبية الحاد ارتفاع نسبة عودة انفتاح الشرايين الأكليلية لدى مجموعة الستربتوكيناز مع اختلاطات ذات خطورة منخفضة مع أخذ نتائج الدراسات العالمية بعين الاعتبار.

مما يؤكد تطبيق الستربتوكيناز في الوقت المناسب لكل مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد بغياب مضادات الأستطباب .

دراسة مخبرية حول الإصابة بداء المشعرة المهبلية لدى مراجعات مشفى التوليد

Laboratory Study About Trichomonas Vaginalis Among Tawlid Hospital Patients

الهدف

تهدف هذه الدراسة إلى تقصي انتشار الإصابة بالمشعرة لدى مراجعات مشفى التوليد ومعرفة أفضل الطرق للكشف عنها، كذلك نسبة تواجد الأعراض والعلامات الخاصة بهذا الداء لدى المصابات.

الطرق المستخدمة:

تم استخدام طريقتي الفحص المباشر والزرع لمفرزات الرتج الخلقي للمهبل.

النتائج

تبين أن طريقة الفحص المباشر قد فشلت في بعض الحالات عن الكشف عن المشعرة، بينما أمكن للزرع أن يكشفها. وتبين أن هناك نسبة ٣٨,٠٩ % من المصابات كنَّ غير عرضيات،

الكيميائية النسيجية المناعية.

دراسة في اختبار الجهد: تقييم معايرة، حساسية، نوعية، مقارنة مع تصوير الشرايين الإكليلية

Research In Exercise Test :
Evaluation Of Criteria , Sensificity,
Comparing With Coronary
Angiography

فادي ابراهيم ديابو . كلية الطب. جامعة
دمشق

إشراف: أ.د. مروان شامية

الهدف من هذا البحث هو دراسة نسب
المعايير المختلفة لاختبار الجهد وحساسية
ونوعية كل منها، لاختيار المعايير الأفضل
لاستطباب القثطرة الإكليلية، وقد تم دراسة
١٥٠ مريضاً أجرى لهم اختبار جهد وقثطرة
إكليلية بفاصل لا يتجاوز ستة أشهر، وتبين
بالمقارنة بين المعايير المختلفة لاختبار الجهد
ونتائج القثطرة الإكليلية أن المعيار الأفضل
كان تزحل الوصلة ST للأسفل بشكل أفقي أو
متجه للأسفل، أو حدوث ألم خناقي محرض
بالجهد حيث كانت الحساسية ٧٥%
والنوعية ٧١%، وتبين أهمية عدم اعتبار
التزحل المتجه لأعلى ببطء إيجابياً لأن ذلك
يجعل النوعية متدنية بشدة، كما أظهرت
الدراسة أن فترة العودة ما بعد الاختبار لها
أهمية كبيرة حيث سجل فيها ٩٣% من
التبدلات الإيجابية.

اللطاخة العنقية

Cervical Smear

حسن تشلي.

قسم التوليد وأمراض النساء. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. جميل طالب

الأساس Background

بالرغم من كونه لطاخة papanicolou تمثل
الطريقة الأكثر فعالية لمنع وتحري الأفات ما
قبل السرطانية لعنق الرحم فإن معدل المسح
الخلوي منخفضاً في دار التوليد الجامعي
ومعدل السلبية الكاذبة مرتفعاً وقيم الحساسية
والنوعية منخفضة.

الطرق methods

يشمل المسح الخلوي ١٢٤٠ امرأة وأخذت
لطاخات عنقية لـ ١٠ مريضات لديهن سرطان
عنق رحم مثبت بالخزعة كما أخذت عينات
من عنق الرحم (اتحري الميكوبلاسما
بالزرع) ولطاخات في نفس الوقت لـ ٢٣
امرأة وأخذت لطاخات عنقية ومهبلية في نفس
الوقت لـ ٤٨ امرأة وتعم تقييم دقة اللطاخة
العنقية بأخذ لطاخات وخزعات عنقية في نفس
الوقت لـ ٨٠ امرأة.

النتائج results

توزعت نتائج اللطاخات كما يلي

١٥٦ (١٢,٥٨%) ضمن الحدود الطبيعية
٩٨٦ (٧٩,٥١%) تبدلات خلوية سليمة
٩٨ (١٠٠٠,٧٩%) شاذة بلغ معدل المسح
الخلوي ١٣,٧% ٩ عوامل الخطورة لتطور
الأفات ما قبل السرطانية لعنق الرحم
(مجموعة الأعمار ٤١ - ٥٠ سنة، بدئ
النشاط الجنسي بعمر مبكر التبدلات الانتهاجية
في عنق الرحم) لم يثبت دور مانعات الحمل
الفموية أو اللولاب كعوامل خطورة إن
تسجيل التبدلات الانتهاجية في اللطاخة العنقية
هو مشعر سيئ على وجود إنتان
بالميكوبلاسما العمر المتوسط للنساء
المصابات بسرطان عنق الرحم ١٦,٣ ومعدل
السرطان شائك الخلايا (٨٦,٦٦%) ضرورة
إجراء الخزعات العنقية في كل حالة تبدي فيها
اللطاخة وجود خلايا شاذة لا يمكن الاعتماد
على اللطاخة المهبلية في تشخيص أفات عنق
الرحم معدل السلبية الكاذبة (٢٤,٥%) معدل

الإيجابية الكاذبة (٣٠,٤%) الحساسية (٥٣,٣%) النوعية (٨٦%) القيمة التنبؤية للاختبار الإيجابي (٦٩,٥%) القيمة التنبؤية للاختبار السلبي (٧٥,٤%). خلاصة conclusions

المرجلات المعدية المعوية

Gastrointestinal Polys

لمى علي ورده. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: د. مازن الحداد

تهدف دراستنا إلى إلقاء الضوء على واقع دراسة المرجلات في مستشفى الأطفال ومقارنة الدراسة مع الدراسات العالمية، إضافة إلى وضع توصيات لدراسة أكثر فائدة كنتائج في المستقبل.

■ أجريت الدراسة بشكل راجع بين عام ١٩٩٧ ونهاية عام ١٩٩٩ حيث تم تسجيل ٦٦ حالة مرجلات معوية.

■ تراوحت الأعمار بين ٢,٥ سنة، الفترة الأشيع للإصابة كانت بين ٣-٥ سنوات بنسبة ٢٢,٧%.

■ العرض الأشيع كان النزف المستقيمي حيث سجل كعرض وحيد في ٤٦,٩% من الحالات ومتوافقاً مع ظهور مرجل من الشرج كتكتلة هابطة في ٤٠,٩% من الحالات.

■ من أصل الـ ٦٦ حالة: ٤٠% أجري لها تنظير مستقيم و ٢٤% حالة أي ٣٦,٣% أجري لها تنظير كولون ومستقسم وحالتان فقط ٣% أجري لها تنظير هضمي علوي.

■ كان المكان الأكثر تكراراً لتوضع المرجل هو المستقيم ٨٤,٥% من الحالات و ٧,٦% من الحالات في الكولون وخمس حالات أي ٧,٦% أيضاً في كل من الكولون والمستقيم.

■ من أصل الـ ٥٦ حالة التي تواجد فيها المرجل في المستقيم ٤١ حالة فقط أجري لها مس شرجي وكان إيجابياً في ٢٩ حالة فقط أي إيجابيته ٧٠,٧% في كشف وجود مرجل مثبت.

■ أما العلاقة مع الجنس فكانت نسبة الإناث ٣١% والذكور ٦٩% أي نسبة الإناث إلى الذكور ٤٦%.

■ لم يدرس قياس المرجلات أثناء التنظير أو بعد الاستئصال في كل الحالات السابقة.

■ وجدت حالتان من داء مرجلات شبابي وحالة واحدة من داء مرجلات عائلي وباقي الحالات مرجلات مفردة أي ٩٥,٤%.

■ لن ترصد أي متلازمة خلال السنوات الماضية الثلاث كغاردنر أو توركوت أو بوترجيرز.

■ لم ترصد أي حالة خبائة تالية في أي من الحالات السابقة.

■ تم إجراء التشريح المرضي في ٣٩ حالة أي نسبة ٥٩% فقط.

■ من أصل الـ ٦٦ حالة أجريت صورة ظليلية للمستقيم والكولونات في ١٥ حالة أي بنسبة ٢٢,٧% وكانت إيجابية الأشعة في الصور المجرة ٢٠% وفي ٣ حالات من الـ ١٥ السابقة أجريت صورة ظليلية وكانت كلها سلبية.

وبائيات العدّ الشائع

Acne Vulgris Epidemiology

محمد عزت الحريري.

كلية الطب البشري. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صالح داود

العدّ مرض جلدي شائع، يصيب المراهقين بشكل أساسي وبنسبة عالية، وصلت في بعض

Bacteriological And Epidemiological Study Of Early- syria Onset Periodontitis In Using DNA Probes, And The Application Of Doxycycline And Osteografts In The Treatment

علي أبو سليمان.

كلية طب الأسنان . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد عصام عوا

يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة وبائية لتحديد مدى انتشار التهابات البلسنج الداعمة المبكرة في سوريا، وكذلك إجراء دراسة جرثومية باستعمال مسابر DNA لكشف وتحديد نسبة جراثيم A.a, P.i, P.g عند المرضى المصابين بتطبيق الدوكسي سيكلين والطعوم العظمية. قمنا بفحص ٢٥٠ مريضاً أعمارهم بين ١٤ - ٢٥ سنة خضعوا للدراسة السريرية والدراسة الجرثومية حيث أرسلت عينات الجراثيم إلى سويسرا لكشف وتحديد نسبة تواجد الجراثيم. كانت نتائج الدراسة الوبائية أن ١٥٧ مريضاً (٦٢,٨%) لم يكن لديهم التهابات نسج داعمة مبكرة، في حين كلن انتشار الجراثيم على الشكل الآتي بلغت نسبة انتشار جراثيم p.i ٩٧,٥% وجراثيم P.g (٨٠%) وجراثيم A.a (٢٢,٥%).

أظهرت نتائج المعالجة أن تطبيق الطعوم العظمية مع الدوكس سيكلين في علاج التهاب النسج الداعمة الشبابي يعطي أفضل النتائج.

تأثير المستحضر الدوائي دورزولاميد
الخافض للضغط داخل المقلة في
الرزق الأولي مفتوح الزواية

The Intreocular Hypotensive Effect
Of Dorozolamide In Primary Open
Angle Glaucoma

تميم درويش.

الدراسات إلى ١٠٠% منهم. يشخص العدّ سريرياً وبسهولة، وأشيع مكان لتواضع العدّ هو الوجه، وتتراوح تظاهراته من عدّ خفيف الشدة إلى عدّ مكيب شديد. ويمكن أ، يظهر العدّ في جميع الأعمار وبشدة ودرجات مختلفة. بلغ حجم العينة ٧٩٣٤ طالب وطالبة بأعمار تتراوح بين ٩ - ١٨ بنسبة كان عدد المصابين بالعدّ منهم ٥٤٦١ أي بنسبة ٦٨,٨٣% وكانت نسبة الانتشار عند الذكور ٧٠,٤% وعند الإناث ٦٦,٩٧%. وقد أجريت الدراسة في محافظة درعا واللاذقية لمعرفة تأثير العوامل الجغرافية على العدّ فكانت نسبة انتشار العدّ في درعا ٦٩,٨٤% بينما في اللاذقية ٦٦,١٦% ولم يلاحظ وجود فرق إحصاء جوهري في نسبة الانتشار في المحافظتين. وتقع هذه النسب ضمن مجال النسبة العالمية (٣٥ - ١٠٠%) كانت روة انتشار العدّ عند الذكور بعمر ١٧ سنة وعند الإناث بعمر ١٦ سنة، ولوحظ أن أشيع مكان لتواضع العدّ هو الوجه، وبلغت نسبة انتشار العدّ الشديد عند الذكور ٤,٥١% وعند الإناث ٢١,١٥% اعتماداً على طريقة leeds. وقد كانت أعلى نسبة لبدء العدّ عند الذكور في عمر الـ ١٥ سنة وعند الإناث ١٤ سنة. نستنتج أن العدّ شائع خلال فترة المراهقة وتقترح الدراسة إجراء برامج تثقيفية بالمدارس لتعريف المراهقين بمرضهم وتقديم النصائح والإرشادات لهم.

دراسة جرثومية وبائية لالتهابات
النسج الداعمة المبكرة في سوريا
باستخدام مسابر DNA وتطبيق
الدوكسي سيكلين والطعوم العظمية
في المعالجة

قسم أمراض الرأس.كلية الطب. جامعة دمشق إشراف: أ. د. يسرى حدة

يهدف البحث لمعرفة تأثير المستحضر الدوائي دورزولاميد على الضغط داخل المقلة في الرزق الأولي مفتوح الزاوية واثاره الجانبية ومقارنته مع التيمولول على عينة مشابهة تمت الدراسة على مجموعتين انتقائيتين من مرضى الرزق مفتوح الزاوية.

المجموعة الأولى ٤١ مريض عولجوا بالتيمولول ٠,٥ % مرتين والمجموعة الثانية ٢٥ مريضاً عولجوا بالدرزولاميد ٢ % ٣ مرات يومياً. تمت المتابعة أسبوعاً لمدة شهر وكانت النتيجة أن التيمولول ٠,٥ % يخفض الضغط داخل المقلة بمقدار ٢٣ % عند الساعة (٠) ٢٦,٢٢ % عند الساعة (٢) . أما الآثار الجانبية فقد كانت خفيفة وشكلت الحرقه النسبة الأكبر بالمجموعة الأولى والطعم المر والحرقه بالمجموعة الثانية.

تجربة مشفى الأسد الجامعي في سرطان الثدي

The Experience Of Al Asssd Hospisal Of Breast Cancer

عبد الله سراج. كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. سهيل سمعان

أجري البحث في مشفى الأسد الجامعي بطريقة الدراسة بين أعوام ١٩٩٦ - ٢٠٠٠ . على عينة مرضى بلغت ٣٩٣ مريضة مصابات بسرطان الثدي. اعتمد التشخيص على الخزع قبل الجراحة. أما المرحلة السريرية فقد حددت بعد إجراء الجراحة.

تم التركيز في الدراسة على عوامل الخطورة التالية: العمر - القصة العائلية - عدد الحمل - وتم إهمال سن أول طمث - وسن اليأس والعوامل الغذائية والبدانة... وذلك بسبب نقص البيانات . وكذلك تم التركيز على حجم المرض والنموذج التشريحي المرضي ودرجة الخباثة والمرحلة السريرية وعدد العقد المصابة وكذلك تم إجراء المستقبلات الهرمونية لعينة محدودة من المرضى.

الهدف من الدراسة: الدراسة إحصائية للحالات التي تراجع مشفى الأسد الجامعي وتحديد عوامل الخطورة في هذه العينة. وتحديد نسبة إيجابية وسلبية المستقبلات الهرمونية في هذه العينة.

النتيجة: كانت قريبة في عوامل الخطورة مع الدراسات العالمية ولكن بالنسبة للمرحلة السريرية فكانت معظم الحالات متأخرة وهذا يدل على تأخير التشخيص.

حمض الفوليك والفيتامين B₁₂ وهوموسيستين الدم في الأدواء الوعائية الخثارية في البالغين

And Blood Folic Acid, Vitamine B₁₂ Homocysteine In Thrombovascular Diseases In Adults

هدى سبج. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. وديعة الريحاوي

أ. د. محي الدين جمعة

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم ارتفاع الهوموسيستين الكلي (they) في الدم فب بلادنا كعامل خطورة وعائية مستقل عن العوامل الأخرى وعلاقة ذلك بعوز الفيتامين B₁₂ وحمض الفوليك FA.

الطرائق: تمت دراسة (١١٢) مريضاً ٩٦ ذكر و ١٦ أنثى) مصاباً بداء الأوعية الإكليلية: إما بخناق الصدر مثبت تخطيطاً، أو باحتشاء

العضلة القلبية مثبتت سريريا وتخطيطيا. وأجري تصوير للشرابين الإكليلية لـ ٦٠ % من المرضى. أما المجموعة الشاهدة فتشكلت من ٤٦ فرداً (٣٢ ذكراً و ١٤ أنثى) من الأصحاء ظاهرياً، أعمارهم مماثلة لمجموعة المرضى. تمت مقايضة لـ (thy) بطريقة fpia ولـ (١٢B) و (FA) بطريقة التآلق الكيميائي.

النتائج: إن الحدود العليا للقيم السوية لـ thy للذكور هي ٧-١٥ umol/L وينقص مستواه في الإناث بـ ٥-١٠ umol/L تقريباً وجد أ، thy مرتفع في ٢٥ % تقريباً في مرضى الشرايين الإكليلية في الجنس، ككما ترافق ارتفاعه بنقص FA إلى أقل من ٢,٢ ug/ml في ٨ % وبقيس B_{١٢} إلى أقل من ١٠٠ pg/ml. ولم يظهر ثمة ارتباط شدة الإصابة ومستوى ارتفاع thy في الدم حسب تصوير الشرايين الإكليلية.

الجراثيم المسببة لالتهابات المفاصل الفقيحة وتحسسها للصادات

The Bacterial Spectrum In Bacterial Arthritis And Their Antibiotic Sensitivity

هناء عيلوط . كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد محبوب جبرودي

هدف الدراسة: دراسة الجراثيم المسببة لالتهابات المفاصل الفقيحة وتحسسها للصادات الحيوية والعوامل المؤثرة على نموها وزراعتها وعزلها من العينات المرضية.

الطرائق المستعملة في البحث: التحري المباشر عن وجود عوامل ممرضة في العينو المدروسة، زرع العينات على أوساط: ١- مرق الثيوغليكولات. ٢- صلبة: EMB, Blood, Agar, Choclet-Agar وسط Moliar Hinton من أجل اختبار التحسس، الفحوص الكيميائية الحيوية من أجل نوع العامل

المرض المعزول باستخدام منظومة Api.

نتائج البحث: ضمت العينة ٤١ مريضاً ومريضة، كانت الإصابة بمفصل وحيد بنسبة ٩٠ % وإصابة متعددة بنسبة ١٠ %. توافرت العوامل المؤهبة بنسبة ٢٩,٣ % مفصل الركبة هو المفصل الأكثر إصابة بنسبة ٥٧,٥ %. الجراثيم المعزولة كانت العنقوديات المذهبة بنسبة ٥٢,٥ %, العنقوديات البيضاء بنسبة ٧ %, الأنتروباكتريا بنسبة ١٨ %, العصيات السلية بنسبة ٤ %, العصيات الزرق بنسبة ٧ %, المكورات البنية بنسبة ١١,٥ %. الاستنتاجات: لوحظ دور الرص في إحداث الإصابة، لوحظ وجود إصابات بالعصيات الزرق، نتائج زورع عميقة بسبب تناول الصادات الحيوية العشوائي، تحسس الجراثيم لمركبات السيفلوتين والسيفاتاكسون بنسبة عالية.

النزف الهضمي العلوي

Upper Gastrointestinal Bldding

ياسر سنبل. كلية الطب البشري. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. نوفل حجة

إن الهدف من الدراسة هو تحديد نسب أسباب النزف الهضمي العلوي لدى مجموعة الدراسة.

تضمنت الدراسة الإحصائية ٢٠٦ مريضاً لديهم نزف هضمي علوي راجعوا مشفى المواساة ومشفى الأسد الجامعي بدمشق وذلك خلال عامي ١٩٩٩ - ٢٠٠٠.

حيث قام الباحث بدراسة هؤلاء المرضى من حيث الشكاية المرضية واستعراض قصصهم المرضية السابقة وأجرى لهم الفحوص السريرية المناسبة ودرس الفحوص المخبرية التي أجريت لهم، كما درس وسائل الاستقصاء التي طبقت على كل مريض منهم واخيراً

عملية منسوسة هي عمل جراحي معقد، ويكون مفيداً في السيطرة طويلة الأمد على ضغط العين والوقاية من تردي الساحة البصرية خاصة في المرضى الذين لا يتقيدون بالعلاج الدوائي أو عندما لا يكون ارتفاع ضغط العين مرغوباً به بعد العمل الجراحي مباشرة.

العلاقة المخبرية للبدانة بارتفاع

شحوم الدم عند النساء في سوريا

Dyslipidaemia In Obese Female In Syria

رنا فواز الجمهاني. كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد محبوب جبرودي - وبمشاركة: أ. د. عائدة الخيمي

الهدف من الدراسة: البحث عن علاقة البدانة ونمطها بقيم شحوم الدم.

طريقة البحث: تمت دراسة درجة ونمط البدانة وعتبار شحوم الدم على ٢٦٠ أنثى من المرفقات لمراجعات قسمي الجراحة والداخلية في مشفى المراساة حيث اعتبرت كل أنثى لديها الوزن / مربع الطول $BMI > 25$ كغ/م^٢ بدنية، ونمط البدانة اعتبر مركزياً إذا كان محيط الخصر/محيط السور $WHR > 0.85$ كما استخدم لإجراء المعايير جهاز الهيتاشي ٧٠٤. وبعد الدراسة الإحصائية كانت النتائج: ٢٠ % من النحيلات لديهن فرطاً بشحوم الدم مقابل ٢٩ % من البدينات وكان عيار $chol$ الدم لدى البدينات أعلى قليلاً منه لدى النحيلات. وكذلك الأمر كان ازدياد عيار TG وانخفاض HDL يتناسب طردياً مع ارتفاع BMI . التوصيات: نشر الوعي الصحي لمكافحة البدانة، ومعالجة فرط شحوم الدم، واتباع دوماً حمية مناسبة ورياضة يومية.

الأختلاطات العلاجية للابيضاضات

الحادة

Therapeutic Compilcation Of Actue Leukermia

تعرض إلى الطرق العلاجية التي طبقت للمرضى.

ثم قام الباحث بتحديد نسب أسباب النزف الهضمي العلوي لدى هؤلاء المرضى وقام بالمقارنة بين هذه النسب التي حصل عليها وبين النسب المحلية والعالمية السابقة.

ومن خلال استعراض النتائج التي حصل عليها تبين أن أشيع سبب للنزف الهضمي العلوي هو القرحة الهضمية وخاصة العفجية منها، وكان ثاني أشيع سبب للنزف الهضمي العلوي هو دوالي المري والمعدة، وهذا يتوافق مع النسب المحلية والعالمية السابقة.

نتائج استخراج الساد خارج المحفظة في الحالات المترافقة بالزرق مفتوح الزاوية

The Results Of Extra-Capsular Cataract Extraction In Cases Associated With Open Angle Glaucoma

عبير فارس. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. جوزيف فتوح - وبمشاركة:

أ. سامح عيسى

الهدف من الدراسة: دراسة اختلاطات و نتائج استخراج الساد خارج المحفظة في الحالات المترافقة بالزرق مفتوح الزاوية، سواء كان الزرق بدنياً أو ثانوياً للساد.

خضع بعض المرضى للعمل الجراحي مشترك (ساد، زرق) في آن واحد، بعضهم أجري الساد بطريقة خارج المحفظة مع الاستمرار بالعلاج الدوائي للزرق.

فترة المتابعة ثلاثة أشهر تمّ فيها تحسن القدرة البصرية ومدى انخفاض ضغط العين بعد الجراحة.

النتائج: إن استخراج الساد خارج المحفظة مع

بهيـرة الأيوبي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عدنان سومان

إن الهدف من هذا البحث هو دراسة أهم الاختلاطات العلاجية الناجمة عن المعالجة الكيماوية المستخدمة في حث الهدأة الأولية لابيضااضات الدم الحادة في دراسة عملية مستقبلية non concurrent مع متابعة السجلات الطبية للمرضى المراجعين لمشفى الموساة في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٩٩-٢٠٠٠.

أجريت الدراسة على مئة وأثنين من مرض الابيضااضات الحادة الفقوية والمفجية، تم دراسة أهم الاختلاطات العلاجية وتحديد المرتبطة بتنشيط النقي أي النزوف والأخماج وتنشط السلسلة الحمراء.

ومن خلال استعراض النتائج تبين تساوي نسبة الاختلاطات (واحد أو أكثر) في نوعي الابيضااض مع ارتفاع نسبة تواتر الابيضااض الفقوي الحاد AML^٣ ثم AML^٢ وارتفاع نسبة تواتر الاختلاطات في هذه الأنماط وخاصة الاختلاطات الخبيثة.

حاطت الباحثة في هذه الدراسة بحث أهم الاختلاطات الناجمة عم المعالجة الكيماوية المستخدمة في حث الهدأة الأولية لابيضااضات الدم الحادة وتحديد تلك المرتبطة بتنشيط.

تدبير سيلان السائل الدماغي الشوكي من الأذن والأنف.

The Management Of Cerebrospinal Fluid From The Ear And Nose

علي كاحلي أو غوللاري.

كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد أكرم الحجاز

تتحدث هذه الدراسة عن سيلان السائل الدماغي الشوكي من الأذن والأنف وهو مرض خطير إذا لم يعالج لما له من عقابيل قد تكون ميتة. وقد تم في هذه البحث إجراء الدراسات الإحصائية على عينة بلغت ٣٣ مريض من مشفى الموساة (قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وقسم الجراحة

العصبية) ومشفى الأسد قسم الجراحة العصبية خلال ١٠ سنة مع مقارنتها مع الدراسات العالمية المتماثلة وتمت الدراسة على عدة متغيرات منها العمر (تمركزت الحالات دون الثلاثين من العمر ٨٤,٨% والجنس الذكور ٦٩,٧% والسبب حيث شكلت الحوادث ٧٢,٧% ١٥,١% الرضوض الجراحية) والمكان الرئيسي للسيلان من الأنف ٩٠,٩% ومن الأذن ١٢,١% والشكوى الرئيسية التي كانت متنوعة وكان أشيعها سيلان رائق من الأنف ٦٦,٦% ثم التهاب سحايا متكرر ٣٣,٣% ودرس المعدل الوسطي لمدة الأعراض (٣٢,٦ شهراً) ودرس كذلك مرافقات سيلان السائل الدماغي الشوكي من الأنف حيث رافق التهاب السحايا ٥١,٥% من الحالات كما تم دراسة الموقع التشريحي للناسور وشكل سقف الغربال نسبة ٢٤,٢% والصفحة المصفوية نسبة ٢١,٢% ووجد أن الاعتماد في التشخيص كان على الفحوص الشعاعية وكانت إيجابية الطبقي المحوري لكشف الناسور فوق ٨٠%، كما تمت دراسة النتائج العمل الجراحي التي أجريت من قبل أخصائي الشعبة الأذنية في مشفى الموساة ١٣ مريض بثلاث طرق مختلفة من ناحية نوع الطعم المستخدم واستعمال مادة لاصقة ونوع الدكة المستعملة ومدة بقاء الدكة داخل الأنف ووجد أن لا يوجد فرق بالنتائج وكلها أعطت نتائج ممتازة ولم يسجل أي حالة نكس أو إختلاط باكراً بعد العمل الجراحي وقد لوحظ قفز الشعبة الأذنية في علاج هذا النوع من المرض عام ٢٠٠٠ حيث عالجت ٧٧% من الحالات المراجعة لجامعة دمشق بنتائج ممتازة وشافية ومن هذا نستنتج أن للجراحة التنظيرية عن طريق الأنف الدور الأكبر ويجب أن يكون الأساسي لمعالجة نز السائل الدماغي الشوكي من الأنف الأقل مدة للبقاء في المشفى وأقل نكساً وإختلاطات وعقابيل ونسبة نجاحه العالية ويمكن أن يكون للجراحة العصبية دور ثانوي بحال الجراحة التنظيرية.

سرطانات الشفة السفلى وجراحاتها

Surgery Of The Lower lip Cancer

بدر الدين غنيم. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. أكرم الحجار

تحدثت هذه الدراسة عن مرض هام جداً لأنه يصيب الشفة السفلى التي لها أهمية كبيرة من الناحية الوظيفية والجمالية في الجسم، وقد تم في هذا البحث إجراء الدراسة الإحصائية على عينة تتكون من ٦٠ مريضاً تم استخلاصها من المرضى المقبولين في الشعبة الأذنية في مشفى المواساة خلال ٧ سنوات في الفترة الواقعة بين عامين ١٩٩٣ - ١٩٩٩ ومقارنة هذه بالدراسة العالمية المماثلة.

استخدم في الدراسة عدة متغيرات (العمر - الجنس - المهنة - السكن - الأعراض - أساليب المعالجة) وقد بينت الدراسة أن سرطان الشفة السفلى أكثر ما يصيب الكهول وخاصة في العقدين السابع والثامن، وقد بينت أيضاً أن الدراسة أن ١٧% من المرضى لديهم أفاق جلدية سابقة أو مرافقة مما يؤكد وجود عامل مشترك لهذه الأفات وإذا قلنا أن ٥٠% من المهن المذكورة بمرضى سرطان الشفة السفلى هي مهنة الزراعة فذلك يوحي إلى أن العامل له علاقة بالتعرض المديد للأشعة الشمسية وهذا يشجعنا إلى نشر الوعي بالوقاية من هذه الأشعة.

وقد بينت الدراسة أن ٧٥% من الحالات المذكورة لديها إيمان على التدخين وبالمقابل ٢٥% من المرضى غير مدخنين وذها يؤكد دور التدخين في إحداث هذه الآفة لكن لا يشترط في المريض أن يكون مدخناً.

وقد بينت الدراسة أيضاً أن ٦٠% من المرضى راجعوا بتقرح على الشفة ٣٣,٣% فهم راجعوا بإندفاع على الشفة أي أن الأعراض البدائية كانت واضحة ومع ذلك فإن ٢٥% من المرضى لم يراجعوا إلا بعد سنتين من ظهور الأعراض وقد يكون السبب في تأخير المريض لمراجعة المشفى هو إهمال هذه الأفات أو تطبيق معالجات شعبية كالكي والأعشاب وغيرها (فقد تبين أيضاً أن حوالي ثلث المرضى عولجوا بمعالجات مختلفة قبل مراجعتهم المشفى)

وقد شكلت السرطان الشائعة (S.C.C) النسبة الأعلى ٩٣,٤% من سرطان الشفة السفلى حتى

أنه يمكننا القول أم سرطان الشفة السفلى الشائعة هو السرطان الشائع الخلايا وقد كان الشكل التقرحي من S.C.C هو الأغلب ٦٣,٣% وهو الأشد عدوانية ٤٤,٧% انتقاله للعقد وقد حدثت النفاثات العقدية بنسبة ٣٣,٣% وقد وجدنا أن ٥٠% من العمليات المجرة هي الاستئصال+ تقريب مباشر وقد ظهرت الاختلاطات بنسبة ٥٤% وكان أهمها النكس العقدي ٢١,٦% وقد طبقت المعالجة الشعاعية كمعالجة ممتدة في المراحل المتقدمة والحالات الناكسة وبالنتيجة فالبرغم من السير البطيء للورم وسهولة التشخيص فإن العلاج لم يكن سهلاً كما هو متوقع وخاصة عند نكس الورم لذلك يجب أن يكون العلاج جذرياً وتاماً منذ البداية مع تطوير أساليب حديثة في الجراحة الترميمية للضياعات الناتجة عن الاستئصال للمحافظة على الناحية الوظيفية والجمالية لهذا العضو الهام .

سرطان المبيض

Ovarian Cancer

الهام دروج. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صلاح شيخه

دراسة إحصائية راجعة لمريضات سرطان المبيض المقبولات بمشفى دار التوليد الجامعي بدمشق خلال الفترة ما بين ١٩٩٠/١/١ حتى ٢٠٠٠/٨/٣١ وكان عددهن ٢١٧ مريضة بنسبة ٤١,٢% ألف مراجعة، وقد شكلت السرطانات البشرية النسبة العظمى بنسبة ٧٦,٥% وكانت الإصابة أكثر توارداً عند العقيمت والعازبات بنسبة ٤٤,٧% وكان الألم الحوضي العرض الأكثر شيوعاً بنسبة ٦٤,٥% وكان العمر الوسطي للإصابة بالسرطان البشرية هو ٥١,٣ سنة وتوزعت الحالات حسب المرحلة السريرية كما يلي: ١- ١٥,٧% ٢- ١٩,٩% ٣- ٤٥,٨% ٤- ١٨,٦% وقد شكلت المعالجة الجراحية متنوعة بالعلاج الكيميائي النسبة العظمى للمعالجة ٨٤,٤% تلاه الجراحة بالعلاج الكيميائي والأشعة

النتائج والمناقشة

كانت نسبة الإناث إلى الذكور ١/١,٧ وبلغت نسبة مرضى الصدف النقطي ١٧,٥٠ % من مجموع المرضى المراجعين في حين بلغت ٣,٧٨ % من مجموع مرضى الصدف بشكل عام وهي مرتفعة ضمن النسبة العالمية (١,٦-٤٤) % ووجد أن أكثر من نصف الحالات حدثت في العقد الأول من العمر بنسبة ٦,٦٥ % وكان البطن المكان الأشيع لبدء الإصابة بنسبة ٤٠ % . أما القصة العائلية فوجدت عند ربع المرضى بنسبة ٢٤,٩ % وغالبية الحالات حدثت بعمر أقل من ٢٥ سنة.

أما الخمج فكان المحرض الأكبر للإصابة حيث وجد في ٤٤,٩ % من المرضى، ولوحظ ارتفاع في مستوى الـASO عند ٧٦ مريض من أصل ١٢٨ أي بنسبة ٥٩,٤ % مقارنة مع الشواهد حيث كان ٣٢,٥ % وهي مقارنة تقريباً لنتائج الدراسة Telefer.N.R. وآخرون حيث وجد دليل مصلي على الخمج بالعقديات في ٥٨ % من مرضى هذه الدراسة وهذا يؤكد دور العقديات في إمراضية المرض. ووجد أن السنترونيديات الموضعية كانت المعالجة الأكثر فائدة في السيطرة على الآفات، وسجل بشكل تالي للشدة النفسية زغلتهاب البلعوم واللوزات.

الخلاصة

الصداف النقطي مرض جلدي يصيب الأطفال وصغار البالغين وتتم العقديات بأن لها دور كبير في تحريضه وذا ما تأكدنا منه خلال دراستنا ومن خلال نتائج الدراسة نلاحظ أن المرض يميل ويبدأ غالباً بفصل الشتاء إلا أنه يمكن التنبؤ بسير المرض وإنذاره وإمكانية الشفاء أو التحول لأشكال أخرى من الصدف حيث تحولت أربع حالات إلى صدف شائع خلال فترة المتابعة ولذلك فإن متابعة أطول مطلوبة.

الأخماج البولية عند الأطفال

Children`s Urinary Infections

غيثاء الخليل. قسم الطب المخبري.

كلية الطب البشري. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد محجوب الجبرودي

بنسبة ٦,٦ %، وكان معدل البقيا لـ ٥ سنوات للسرطانات البشروية ٣٤,١ % ولغير البشروية ٧٧,٤ % وكلنت نتائج فتح البطن للنظرة الثانية: استجابة كاملة بنسبة ٣٥,٥ % بقايا مجهريه بنسبة ٢٢,٩ % كتلة مريحة بنسبة ٤١,٦ % وقد كانت نتائجنا قريبة من النتائج العالمية باستثناء زيادة نسبة البقايا المجهريه بالنظرة الثانية وذلك بسبب مراجعة المريضات بمراحل متقدمة أكثر.

الصدف النقطي

Guttate Psoriasis

محمد عماد عيطه.

كلية الطب البشري. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صالح داود

الصدف النقطي هو أحد الأشكال السريرية للصداف الشائع، أكثر ما يصيب الأطفال وصغار البالغين بعمر أقل من ٣٠ سنة ويتظاهر على شكل حطاطات حمامية صغيرة بقطر ١-١٠ ملم قطرات المطر تتوضع خاصة على الذراع والأجزاء الذاتية من الأطراف غالباً ما يكون هناك قصة لخمج تنفسي علوي بالعقديات المحقية الحالة للدم B من المجموعة A، وهو يصيب كلا الجنسين بالتساوي ويحدث في أقل من ٢ % من مجموعة مرضى الصدف في الولايات المتحدة الأمريكية.

المرضى وطرق الدراسة

بلغ عدد المرضى ٢٠٥ مريض ومريضة من مجموع خلال عامين ١٩٩٩-٢٠٠٠ وتراوح أعمارهم بين عدة أشهر و٤٥ سنة وكانت الغاية من الدراسة دراسة المرض بشكل مفصل سريرياً حيث أخذت قصة مريضية دقيقة تضمنت السوابق الشخصية والعائلية وبدء ظهور المرض وعلاقته السنة المختلفة ووجود قصة خمج سابق للعقديات المحقية.

وقد درس المرضى جيداً من ناحية الشكل السريري والآفات وتوزعها وشدها والأمراض المرافقة كما تمت معايرة أضداد الحالة العقدية (ASO) وقورنت من النتائج التي وجدت عند الشواهد، كذلك أجرينا دراسة نسيجية ومضائية لعدد من مرضى الدراسة.

مروان الحموي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. رعداء السمان

الوهن العضلي الوخيم أحد الأمراض المناعية النادرة في بلادنا، يتميز بضعف العضلات الهيكلية الذي يتفاقم بالجهد ويتم تشخيصه بتخطيط العضلات الكهربائي والاختبارات الدوائية وعبارة أضرار مستقبلات الأسيتيل كولين إستراز في الدم .

وكان هدف الدراسة مقارنة مع دراسات على ٧٦ مريضاً في مشفى الأسد الجامعي وتم التركيز على توزع المرض من حيث العمر، الجنس، تطور الأعراض، نتائج استئصال التيموس التشريحي المرضي ونتائج استئصال التيموس والعلاج الدوائي على تطور المرض، وخلصت أخيراً إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

دراسة حول داء اللشمانيا الحشوي

عند الأطفال

Visceral Leishmaniasis In Children

أسد الأبراهيم. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. مجيب ملح

أجريت الدراسة في مشفى الأطفال الجامعي في دمشق وقد تم عرض مقدمة نظرية حول داء اللشمانيا عموماً وداء اللشمانيا خصوصاً.

تمت دراسة الحالات بين عامي ١٩٩٣ وحتى عام ٢٠٠٠ وقد بلغت ٦٣ حالة منها ٦ حالات مستقبلية خلال فترة الدراسة وقد تمت دراسة التوزع الجغرافي لهذه الحالات حسب مناطق القطر المختلفة والأعراض التي راجعوا بها والعلامات السريرية الموجودة عند القبول والتوزع الجنسي والعمر للمريض.

وأجريت دراسة مخبرية لجميع المقيولين تضمنت الخضاب وتعداد الكريات ووظائف الكبد والكلية وبزل نقي العظم وتم تطبيق المعالجة بالغلوكانتيم وفق خطتين للمعالجة، ووجد أ، داء اللشمانيا ما يزال مشكلة منتشرة في المناطق الجنوبية من سوريا ولا بد من التشخيص المبكر وتوفير العلاجات الحديثة للحالات المعقدة.

أورام البرانشيم الكلوي

الغاية من البحث هي معرفة أنواع الجراثيم المسببة للأخماج البولية عند الأطفال بإجراء فحص مباشر للبول والراسب البولي، ومن ثم إجراء عملية الزرع على الأوساط الزرع المختلفة لتحديد أكثر الجراثيم تواتراً وإحداثاً للخمج البولي، ثم إجراء التحسس للصادات لتحديد أهم الصادات الفاعلة في تلك الجراثيم. لقد برهنت النتائج على أن الجراثيم سلبية الغرام لا سيما الإيشيريكية القولونية والكليسييلة هي الأكثر فاعلية في تلك الجراثيم. كما وتظهر دراستنا ازدياد ملحوظاً في نسبة الإصابة بالخمج البولي المكتسب بعد دخول المشافي، كما تؤكد على ازدياد نسبة تعبد الجراثيم على الصادات المستخدمة في تلك الحالات ورفع احتمالات تكرار الخمج بنفس الجرثوم أو جرثومين مختلفين.

تدبير سرطان الكولون

Managerment Of Colon Cancer

طارق الجمال. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. أحمد أبو قاسم

يشكل سرطان الكولون ١٥-١٧% من الخبايا عند الإنسان ويعتبر السبب الثاني للوفيات. ويزداد معدل حدوثه مع تقدم العمر.

ونظراً لأهميته الكبيرة فقد هدفت دراستنا إلى لفت الإنتباه لضرورة الكشف المبكر عن سرطان الكولون وبالتالي تحقيق نسب شفاء عالية.

تمت الدراسة على سجلات بشكل راجع خلال الأعوام ١٩٩٦-٢٠٠٠ وتضمن البحث ٢٣٠ مريضاً، وشمل دراسة توزع الحالات حسب العمر والجنس إضافة لطرق التشخيص والعلاج الجراحي والكيميائي المتمم.

بالنتيجة تبين أن ذروة حدوث سرطان الكولون ٦١ سنة ويصيب الذكور أكثر من الإناث وهناك زيادة بنسبة حدوثه بالأعمار المبكرة في بلدنا.

كل ذلك يقودنا لضرورة إجراء المسح الدوري واتباع الوقاية الغذائية.

الوهن العضلي الوخيم

Myasthenie Grave

Renal Parenchyma Tumors

برهان كنوزي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. ابراهيم برغوث

أجريت هذه الدراسة الإحصائية على ٤٠ مريضاً قبلوا في شعبة الجراحة البولية في مشفى المواساة الجامعي في الفترة بين عامي ١٩٩٧ و ٢٠٠٠ وذلك بهدف أرشفة الحالات وتسهيل الرجوع إليها ومقارنة إحصائياتنا مع الإحصائيات العالمية.

أخذت المعلومات اللازمة من ملفات المرضى وسجلات الشعبة البولية وأرشفيف الأشعة، وقد أجريت لمعظم المرضى الفحوص الدموية الروتينية، والدراسة الشعاعية (الأمواج فوق الصوتية، الصورة الظلالية، والتصوير الطبقي المحوري)، وخضع معظمهم للعمل الجراحي ثم جمعت نتائج التشريح المرضي المتوافرة، وبالنسبة أجريت الإحصائيات اللازمة حول جميع هذه النقاط.

وبالنسبة للنتائج فقد تم فيها تحديد معدل توزع أورام الكلية بين الجنسين وحسب الفئات العمرية والمناطق الجغرافية، ومعدل ظهور الأعراض المختلفة (خاصة الألم والبيلة الدموية)، ونسبة مصادفة الأشكال التشريحية المرضية، وإمكانية الاستغناء عن استئصال الكظر في حالات منتقاة. وجميع هذه الأمور قورنت مع الدراسات العالمية المماثلة.

وأدرجت في النهاية بعض المقترحات والتوصيات بهذه الخصوص.

العقم وتحري الإباضة

Infertility Detecotion Of Ovalation

أسامة العمر. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عماد الدين تنوخي

هدف الدراسة

تقييم الزوجين العقيمين - العامل الذكر ي ، العوامل الأنثوية - فصور الطور اللوتينيني - فرط برولاكين الدم - العامل البوقي - العامل الرحمي والبريتواني.

القسم العملي من الدراسة

تمت الدراسة في مشفى دار التوليد وأمراض النساء بدمشق من تاريخ ١٩٩٩/١١/١ ولغاية ٢٠٠٠/١٠/٣١، عدد الحالات ١٩٥ حالة، تم تقييم حالات فرط البرولاكتين، ثر الحليب، مخططات الحرارة، مخاط عنق الرحم، بروجسترون المصل، مقارنة ما بين أجهزة ما فوق الصوت المهبليّة والبطنيّة.

النتائج

من أدقّ مشخصات حدوث الإباضة هي استخدام الإيكو البطني والمهبلي ومخاط عنق الرحم وقيم بروجسترون المصل .

الاستنتاجات

وجوب استخدام أجهزة ما فوق الصوت البطنيّة والمهبليّة في الأيام ١٢-١٤ من الدورة لتشخيص حدوث الإباضة ومعايرة الهرمونات وخاصة البروجسترون في اليوم ٢١ من الدورة.

مقاومة الرئويات على الصادات

(الفانكوميسين)

Vancomycin resistant

Pneumococcus

آلاء محمد علي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. مجيب ملحم

تتطرق هذه الرسالة لإنتانات الرئويات بشكل عام ونشوء المقاومة على الصادات وخصوصاً السلاح الأخير حالياً في معالجة الرئويات وهو الفانكوميسين.

احتوت الدراسة على ٣٨ عيّنة راجعة ومستقبليّة في مشفى الأطفال منذ ١٩٩٧/٧/١ حتّى ٢٠٠٠/١/١، حيث اهتمت الدراسة بالحديث عن هدف الدراسة وهو تسليط الضوء على إنتانات الرئويات وأشكالها السريرية والأسباب المؤهبة لها. كما تعرض الدراسة مقاومة الرئويات على مختلف أنواع الصادات، ونبين هنا المشكلة العالمية التي وقع فيها مخابرنا (مخابر مشفى الأطفال) في قراءة قطر تحسس عينات الرئويات للفانكوميسين بشكل خاطئ، وكيف تمّ تصحيح الخطأ، وهذا يعتبر إنجاز متواضع في هذه

الدراسة. وكان لابد من التطرق بعلاقة الإنتانات بالرئويات بالعمر والجنس وفصول السنة ونسبة الوفيات مع مقارنة مع دراسات عالمية حديثة إسبانية وأمريكية.

في نهاية هذا البحث نتعرض للنتائج التي توصي بعدم استخدام الأدوية أو الصادات بشكل عشوائي، واختيار الصادر المناسب وتحت إشراف طبي كي لا تصل مشكلة المقاومة الدوائية إلى طريق مسدود، وكلنا أمل في تعاون الجهات الطبية في هذا المجال.

أورام البلعوم الأنفي الخبيثة

Malignant Nasopharyngeal Tumors

حسن خطاب. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. كرم الحجار

يتضمن هذا البحث موضوع هام وهو أورام البلعوم الأنفي الخبيثة حيث اشتملت الدراسة على قسمين هما الدراسة النظرية والدراسة الإحصائية لعينة المرضى خلال عشر سنوات وبلغت عينة المرضى ٨٥ مريض شخص لهم بالخزعة وجود سرطان في البلعوم الأنفي. لوحظ من خلال الدراسة أن نسبة الذكور هي ضعف نسبة الإناث وأن ذروة الإصابة بالنسبة للعمر هي في العقد الثاني والسابع وكانت نسبة سرطان البلعوم الأنفي خلال العام ٢٠٠٠ هي ٥% من مجموع سرطانات الرأس والعنق التي راجعت الشعبة. ولقد شكلت كارسينوما البلعوم، في الخاصة الغالبية العظمى من الحالات ٧١ حالة حيث كانت الكارسينوما غير المميزة هي الأكثر ٧٦% منها بينما شكلت الكارسينوما الشائكة ما تبقى أما الد ٤٤ حالة الأخرى فتوزعت على اللمفوما الكارسينوما الغذائية الكيسية والسااركومات. وكان الغرض الرئيسي الذي راجع من أجله المريض هو ظهور كتلة في العنق بنسبة ٧٠% من الحالات يليه الأعراض الأنفية ٤٠% والصداع ٣٦% وانسداد الأنف ٣١% وكان شكل الورم الكتلتي هو المسيطر بالموجودات التنظيرية ولقد أجري CT في حوالي نصف الحالات حيث شخص ارتشاح الورم بالعظم في ١٥% من الحالات وكان الخط الأول للنقل العقدي هو العقد الوداجية العلوية وكان الخط الأول

في معالجة المرض هو العلاج الشعاعي، ما عدا حالة كارسينوما غذائية كيسية وحالة ساركوم عضلي أجري لهما جراحة عبر الحنك، ولكن هناك ضعف كبير في متابعة المرضى بعد تحويلهم إلى مركز الطب النووي حيث راجع ١٠% ٨ حالات فقط من المرضى الشعبة بعد فترات مختلفة من علاجهم وكانت نسبة الشفاء في هذه العينة الصغيرة هي حلتين من المرضى فقط ومن هنا نتسنتج ضرورة الأهتمام بمعالجة كتلة في العنق مجهولة المنشأ أو ظهور أعراض أذنية ناجمة عن خلل وظيفة غفير العلاج الشعاعي وحتى لو شفي من مرضه وذلك من أجل تقييم فائدة هذا العلاج واتخاذ الوسائل العلاجية المناسبة في حال فشله. وكذلك ضرورة التعاون مع بقية الأقسام مثل قسم التشريح المرضي وقسم الطب النووي بما يحقق الفائدة القصوى للمريض .

اللاارتخانية

Achalasia

منى ليلا. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. مازن مصري زاده

هي مرض قليل الشيوع ولكنها الأشيع بين اضطرابات المري الحركية. لا يزال سببها مجهولاً رغم اتهام آليات عديدة في إحداثها. تصيب الجنسين بالتساوي ويمكن أن تظهر في أي عمر مع أن البدء يكون عادة أشيع في الأعمار المتقدمة. ويراجع المرضى عادة بواحد أو أكثر من الأعراض السريرية التالية: عسرة البلع، العكس، نقص الوزن والألم الصدري.

كانت عسرة البلع هي العرض الأشيع والتي وجدت عند جميع مرضى الدراسة تلاها من حيث الشيوع القلس ثم نفخ الوزن أشيع لدى مرضى المسنين.

تم التشخيص من خلال القصة السريرية والصورة الظليلية للمري والتنظير العلوي. وقياس ضغوط المري الذي كان إيجابياً في جميع الحالات أما فهدفنا تخفيف الأعراض ومنع الاختلاطات ولا يمكن تصحيح التكتس العصبي الحاصل.

تبقى عسرة البلع هي العرض السريري الأكثر شيوعاً في جميع الأعمار. أم الألم الصدري فهو

ظاهرة سريرية مهمة لدى مرضى اللار تخائية خاصة الشباب وتبقى الظليلية للمري وسيلة تشخيصها مهمة في كثير من حالات اللار تخائية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق في تشخيص جميع حالات اللار تخائية.

الأذيات البولية في الجراحة النسائية

Urethral Injuries In Gynecological

ندى سلطان. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. كنعان السقا

أجريت دراسة إحصائية للأذيات البولية الحادثة في مشفى التوليد الجامعي أو الواردة إليه في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٩٨/١٠/١ و ٢٠٠٠/١٠/١ بسبب الجراحة النسائية وكان عددها ثلاثين أذية، وكان هدف الدراسة كشف الأذية البولية مبكراً في حال وقوعها ومعالجتها بالشكل الأمثل لتجنب المريضة الكثير من الاختلاطات والعقاييل السيئة التي قد تصل إلى درجة فقد الكليتين أحياناً، والوصول إلى أفضل الوسائل الممكنة لتفادي الأذية البولية في الجراحة النسائية والإقلال منها قدر الإمكان، وإعطاء مجموعة من التوصيات المستقبلية التي تهدف إلى تحسين الممارسة في هذا المجال.

تبديل مفصل الورك في كسور المفصل الحرقفي الفخذي

Hip Arthroplasty For hip joint Fractures

عماد خضور. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. هيثم غنام

تأتي أهمية كسور الجوف الحقي بسبب احتمال أذية البنى العصبية الوعائية التي تمر بجوارها إضافة إلى ما تخلفه من اضطراب في السطوح المفصالية وبالتالي الداء التنكسي الذي قد يحتاج تبديل المفصل.

أما كسور عنق الفخذ بنوعها داخل وخارج المحفظة فهي شائعة عند المسنين بسبب مشاكل الترقق العظمي وتترافق بنسبة عالية بزيادة الجراحة العظمية التصنيعية وقد تمت هذه الدراسة

على مجموعتين من المرضى الذين راجعوا مشافي كلية الطب بجامعة دمشق (الأسد الجامعي والمواساة) خلال عامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ .

عموماً يستطع تبديل المفصل في حالات فشل العلاج المحافظ في إزالة شكاوى المريض من الألم والعجز الوظيفي ويأتي في مقدمة هذه الاستطابات:

التهاب المفصل بكافة أشكاله الرثواني والقيحي والتنكسي سواء البدائي أو التالي لكسور الجوف الحق وعنق الفخذ إضافة للآورام التي تصيب القسم القريب من الفخذ الحقي....

في الماضي كان T.H.R (تبديل المفصل الكامل) يجري للمرضى فوق ٦٠ سنة ومع تحسن الإسمنت والتقدم في تصاميم المفصلات اللا إسمنتية بات يجري لمرضى أصغر سناً، بينما يتم تصنيع المفصل وحيد القطب للمرضى المسنين جداً مع متطلبات وظيفية قليلة وهو يسمح بالعودة إلى تانشاط باكراً كما يخلصنا من الغريسة في الجوف. وهنا يظهر أهمية تصنيع المفصل النصفى ثنائي القطب Biporal الذي يتغلب على المشاكل السابقة وهو مستطع لدى المسنين مع عمر متوقع جيد ومتطلبات وظيفية قليلة أو الشباب الذين لديهم نخرة جافة.

وبالطبع لا تخلو عملية تبديل المفصل من المضاعفات والاختلاطات (كسر الفخذ - لانتاني - انتان - خلع - تكلس هاجر انضمام خثري - انحلال عظمي - شلل العصب الوركي - تقيف قلب مفاجئ...) وقد أظهرت الدراسة نتائج جيدة باستخدام تبديل الورك الكامل، أما بالداء التنكسي التالي لكسور الجوف الحق فقد أعطى T.H>R بأشكاله الثلاث (الاسممتي واللاسسمتي والهجين Hybrid) نتائج جيدة جداً حيث كانت الاختلاطات قليلة والوظيفة جيدة وقد استخدمت حلقات الدعم (بورش) عند الضرورة بنجاح. فقد خلصت الدراسة إلى ضرورة الفحص الشعاعي للورك لجميع مرضى كسور الفخذ والعلاج الوقائي للترقق العظمي وخاصة عند النساء بعد سن اليأس كما أكدت ضرورة تبديل المفصل النصفى أو الكامل عند مرضى الترقق حسب عمر المريض ومتطلباته الوظيفية دون إضافة الوقت والجهد في مشاكل التثبيت الداخلي.

إصلاح الفتوق الحجابية بالتنظير

Laparoscopic Hiaial hernia repiar

حسام عدي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عبد الغني الشبلي

تهدف الدراسة إلى استعراض خبرة مشافي جامعة دمشق بإصلاح الفتوق الحجابية بالتنظير خلال ١٩٩٨-٢٠٠٠، وقد شملت ٢١ حالة لجميع المرضى تنظير هضمي علوي فيما أجري قياس ضغوط المريء لسبعة مرضى فقط. تم إجراء الطي حسب توبيه في ٤ حالة وطي أمام في حالة واحدة. بلغت نسبة نجاح العمل التنظيري ٩٠%. كانت أسباب الفشل البدانة > ١٠ كغ والتurf. تم البدء بالحمية السائلة في اليوم التالي في ٢٠ حالة. أعيد التداخل الجراحي على مريض التurf بعد ٢٠ ساعة تكرر التurf. حدثت عسرة بلع عابرة في ٩ مرضى (٨ منهم بعد الطي حسب تسين) وعسرة بلع دائمة في حالتي استدعنا إعادة التداخل الجراحي. لم تسجل أي حالة نكس خلال مدة المتابعة التي تراوحت مدة المتابعة من ٣٥ يوماً حتى ٣٨ شهراً.

تدبير القرحة الهضمية السادة

Management Of Obstructing Peptic Ulcers

حسام محمد العطران.

كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. حمزة الأشقر

تعتبر القرحة الهضمية من الأمراض الشائعة نسبياً حيث يتوقع أن يصاب ١٠-١٥% من الناس بها خلال حياتهم ورغم توفر الكثير من الأدوية الفعالية في معالجتهم إلا أنه لا تزال هناك اختلاطات تستدعي الجراحة، ومن بين هذه الاختلاطات انسداد مخرج المعدة الذي يصيب حوالي ٥% من مرضى القرحة.

تمت الدراسة العملية بالطريق الراجع على أضايبير المرضى الذين تم قبولهم لاشتباه أصابهم بتضييق أو انسداد مخرج المعدة، كان عدد الحالات ٥٨ حالة وجد لدى ٢٨ منهم انسداد أو تحت انسداد مخرج معدة من منشأ قرحي و ١٥ مريضاً لديه اسداد

ورمي والباقي لم يكن لديه انسداد.

اعتمد التشخيص على التنظير الهضمي العلوي وتم تدبير جميع الحالات جراحياً، ومعظم المرضى أجري لهم قطع معدة ومقارنتها مع الصائم B II كانت نسبة الاختلاطات محدودة كما لم توجد وفيات مرتبطة الجراحة.

سرطان الكولون لدى اليافعين

Colon Cancer In Adults

سامر حاماتي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. سهيل سماعيل

أجريت هذه الدراسة الإحصائية على ٢٢١ مريضاً قبلوا في مستشفى الأسد الجامعي يقسم الجراحة العامة في الفترة ما بين عامين ١٩٩٥-٢٠٠٠ وذلك لمعرفة نسبة هذا السرطان في المرضى بأعمار دون الأربعين سنة ومقارنتها مع الإحصائيات العالمية.

هذا وقد أخذت المعلومات من ملفات المرضى وأرشيف التشريح المرضي حيث كان العمل الجراحي قد أجري بعد القيام بالتحاليل الطبية والدراسة الشعاعية تم خضع المرضى بعدها للعمل الجراحي وذلك بحسب مكان تواضع الورم.

بالنسبة للنتائج فقد تم فيها تحديد نسبة هذا الورم حسب الأعمار ونسبة الأعراض التي راجع بها المرضى المشفى والتوزع حسب المحافظات وعلاقتها بالعوامل الإنذارية كالحمية الدسمة ونسبة مراحل التشريح المرضي وقد تم مقارنة كل ذلك مع الدراسات العالمية.

وقد وجد النتائج التالية: نسبة المرضى دون ٤٠ سنة مصابين بسرطان كولون كانت ٣٤,٤٨% في العام ١٩٩٥. و ٣٦,٣٦% في العام ١٩٩٦، و ٣٧,٩٣% في العام ١٩٩٧ و ٣٧,٣٧% في العام ١٩٩٨، و ٣٠% في العام ١٩٩٩، و ٢٨,٨٤% في العام ٢٠٠٠ وبوسطي ٣١,٦٧% لمجموع السنوات. وهو أعلى بكثير من النسب العالمية التي تتراوح ٨-٣%.

أما النسبة للأعراض فقد وجدت أن أعلى نسبة عرضية كانت تغطى دمى بنسبة ٨٩% وقد كانت أعلى نسبة للورم بالنسبة لتوزع المحافظات في

محافظة دمشق بلغت ٢٦,٢٤ % تليها خمص
بنسبة ٢٥,٧٩ %.

أما بالنسبة لتوزع الجنس: فقد كانت الذكور
٥٥,٧٢ %، والإناث ٤٤,٢٨ %.

وبالنسبة للعوامل الإنذارية فقد وجد التدخين
بنسبة ٣١ % من المرضى، أما وجود قصة عائلية
إيجابية بورم الكولون فكانت ٢,٨ %، ووجود داء
بوليبات وجد بنسبة ٧,٤١ % أما وجود داء كولون
فرحي فوجد بنسبة ٢,٨٥ %.

وقد اقترحنا التوصيات التالية:

- أرشفة أصابات المرضى في المشافي
بشكل جيد، وكتابة قصة مرضية جيدة.
- عدم إهمال أي شكوى كولونية خاصة
التغوط المدمى لدى أي مريض حتى لو كانت
دون الـ ٤٠ سنة، وإجراء تنظير هضمي
سفلي بحال وجود شكاية كولونية لنفي ورم
كولون.

مقارنة بين تقنية التخدير فوق الجافية والتخدير
المشترك CES

Compare CSE To Epidural Anesthesia

فريد عبد البر الفاخوري.

كلية الطب. جامعة دمشق.

إشراف: أ. د. أمير درويش

الهدف من الدراسة هو المقارنة ما بين التخدير
فوق الجافية مع التخدير الشوكي وفوق الجافية
المشترك من حيث مستوى الحصار وبدء التأثيرات
الجانبية.

حيث تمت الدراسة على حوالي ١٤٠ مريض في
مشفى المواساة والأسد الجامعي والتوليد بجامعة
دمشق خضعوا لعمليات جراحية مختلفة من
الجراحة العظمية والبولية والنسائية التي يمكن أن
تجري تحت التخدير الناحي وتم تقسيم هذه العينية
إلى مجموعتين الأولى أجري لها التخدير فوق
الجافية والثانية التخدير المشترك وهو يجمع ما بين

:

—

—

:

()

.

.

:

:

.

:

.

.

:

()

:

:

.

.

.

.

.

:

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

:

"

"

.(792-712)

.

.

.

.

.

.

.

.

:

)

:

(

.

—

—

(512)

.2006-2003

:

—

—

.

.

..

.

:

:

:

—

.

.

.

:

.

.

—

:

()

:

()

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

.() :

:

:

:

:

.

.

.

.

.

"

"

.

"

.

"

"

.

"

"

.

.

.

"

.

.

.

.

.

.

.

:

)

:

(

.

.

.

.

.

.

.

.

.

()

.

.

:

:

.

:

):

:

(

.

.

.

.

.

.

(745) :
 () :

.
)
 . (

.
 .
 ()
 .() ()

:

⋮

⋮

.

.

.

.

.

:

.

() ()

.

:

.

.

:

:

-

:

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

:

"

"

.

.

:

.

(to let the cat out of the bag)

.()

.

:

.

(*dogs

(It rains cats and dogs)

.(*cats and cows) and cats)

() :

.(*) (*)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

:

:

:

.

.

.

.

.

.

.()

.

.

:

.

:

:

.

:

-1

.

-2

.

-3

.

:
 " " :
 " " " "
 .
)
 (...)
 (...)
 ... ()
 .
 :
 " " :
 " : —
 " :
 " : —
 " " " " "

:

:

:

.

:

.

.

:

.

:

—

.

.Lexical meanings

—

grammatical

.

. meanings

.

.

.

:

:

.

.

.

)

()

()

(

.

.

)

(

.

:

"La quantification en français"

:

.

)

.(

.

.

:

:

(1999) – (1995) – (1992)

.

)

(

)

)

–

(

(

.

.

⋮

.

.

.

.

.

:

:

(-)

:

.

.

:

:

:

:

:

-1

.

:

-2

.

.

.
:
-3
-1 :
-2
-3 .
-4
:
-4
.
-1 :
-5
."1986"
-2
.
-3
.1999
-4
.1992
-5
.1991

.2004 -6

.2001 -7

-8

.20200

: -6

:

:

. -

. -

. -

:

. -

-

:

. -

-

.

: -7

2007

-23

—

.169 .

3

.

.

:

:

:

:

:

.

.

:

.

:

.

:

:

-1

.

.

-

-

:

-2

:

-3

:

-1

.

.2005-2004 :

-2

:

-3

116

37

331

. 178

96

41

4

141

•

•

•

•

•

•

تدير النزف الهضمي عند الأطفال

Managment Of Digestive Hemorrhage In Children

... :

.

.

.

.

تكوثر الكريات الوراثي

Hereditary Spherocytosis

... :

.

.

.

%

.

%.%

%

-

.

الآفات الشريانية السادة المزمنة

Chronic Occlusive Arterial Disease

... :

.

.

.

.

.

جملة كيل وكيد وعلاقتها مع الأمراض

Kell And Kidd Blood Group Systems And Their Relationship With Some Diseases

... :

ABo

..

K

:

)

.(

)

Jka

.(

)

.(

البروبوفول. الجديد في التخدير الوريدي

Propofol – A New Intravenous Anesthetic Agent

... :

هبوط الضغط المراقب

Controlled Hypotension

... :

()

فقر الدم الانحلالي المناعي عند الوليد

Immuno Hemolytic Anemia In The Newborn

... :

RH

RH

RH

Anti D

الأجسام الأجنبية في الطرق الهوائية عند الأطفال

Foreign Bodies In Children's Air Ways

... :

دراسة ميدانية للسلمونيلا عند الأطفال في مريف دمشق

Field Study For Salmonella In The Children In Damascus Villages

... :

% ,

تصوير الطرق الصفراوية والبنكرياسية بالطريق الراجع

Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)

... :

الزمر الجرثومية والفطورية عند مرضى الأختلاج الرئوية (غير السليلة) في مشفى المواساة

Bacterial Agents And Mycoses In Patients With Pneumonia (Non Tuberculous) In Mouassat Hospital

... :

..

:

■

■

(EMB)

...()

:

:

التهاب الوريد الخثري والصمة الرئوية

Thrombophlebitis And Pulmonary Embolism

... :

المضاعفات الدموية في قصور الكلوي المزمن

Hematological Complications In Chronic Renal Failure

... :

صداف الفروة

Psoriasis Of The Scalp

.. :

:

▪

▪

▪

تنظير البطن

Laparoscopy

... :

:

:

-

.

:

-

.

:

-

.

..

.

-

.

-

.

.

:

-

.

تنظير الصدر

Thoracoscopy

. . . :

Jacobacos

النواسير المثانية المهبلية

Vesico Vaginal Fistula

. . . :

■

■

■

■

.

.

دور تنظير عنق الرحم في الكشف عن السرطان

The Role Of Colposcopy In Dedecting Cervical Cancer

. . :

/ /

/ /

:

.% CIN

.

.

-

%

.

%

.

انغلاف الأمعاء

Intussusception

... :

.

.

% -

% -

% -

:

(...).

دراسة حول عمليات قطع رأس المعنكلة في مشفى الأسد الجامعي

A Study Of Pancreatico – Dudeuectomy At Assad University Hospital

... :

.

: () Wipple

-

-

-

-

استعمال مشتقات السيكلوديسرين في تحسين انحلالية الفينيتوين بواسطة تقنية المعقدات
الانضمامية

Improving Solubility And Dissolution Rate Of Phenytoin Via Inclusion
Complexation Technique

... :

Phenytoin

HP- β -CD

Phenytoin

.(:)

HP- β -CD

.HP- β -CD

مناحيات الحمة المضخمة للخلايا

Immunity Of Cytomegalovirus (CMV)

...

...

الفيتامين E وأنظمة غلوتاثيون بيروكسيداز والسيلينيوم وعلاقتها ببعض الأمراض الناجمة عن زيادة تشكّل الجذور الحرة وخاصة انحلال الدم والتصلب العصيدي

Vitamine E, glutathion peroxydase, et la selenium, leur corelation avec certain pathologie comme l'hemolyse, l'atherosclerose resultant de l'augmentation de la formation des radicaux libres dans l'organisme

...

...

Free

.Radicals

Lipoferoxides

:

HO

-Superoxyde O₂

.MDA

MDA

.(HPLC

α -) E

.TAS

.GPX

:

(Ldlc)

إصابات الدرق المناعية الذاتية

Autoimmune Thyroid Diseases

... :

3, 5, 3 Triiodothyroine: T3

Tetraiodothyronine: T4.

المشاركة بين الصادات الحيوية وتأثيرها بالمعالجة (الأمينوغليكوزيدات والبيتا لكتام)

The Combination Of Antibiotics (Aminoglycosides And B- Lactams)

... :

... :

MIC

.Checker – Board

% /

.(FIC<1)

دراسة الفرسات عبر الجذرية وتقويم نتائجها السريرية

Studying Transradicular Implants And Evaluating Its Clinical Results

. . . :

.Frank, Orlay, Walton :

تعديل الإطباق باستخدام الحاسوب لمعالجة الاضطرابات الفكية الصغية

**Occlusal Adjustment By Using Computer For Traeating
Temporomandibular Disorders**

. . . :

T-Scan

:

-

-

:

-

-

-

T-Scan

دراسة مقارنة لبعض أساليب تشخيص النخر عند الأطفال

Caries Diagnosis In Children: A Comparative Study

... :

:

-

-

-

-

دراسة مقارنة للسد الذروي لحشوات الكوتابيركا المطبقة بطريقة التكثيف الجانبي

وطريقة التكثيف العمودي الحراري وطريقة حقن الكوتابيركا المتليفة بالحرارة

**A Comparative Study Of The Sealing Ability Of Lateral Condensation,
Vertical Condensation, And Thermoplasticized Injectable Gutta-Percha**

... :

%

%

.stereoscope

دراسة مقارنة بين مواد نقل العضة وطرائق نقلها إلى المطبق في التيجان والجسور وتأثيراتها

السريفة

**A Comparative Study Between Bite Registry Methods To Articulator In
Crowns And Bridges And Its Clinical Effects**

... :

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد علي أرناؤوط

يستقطب مشفى الأسد الجامعي ومشفى
المواساة ومركز الطب النووي العديد من
مرضى الدرق من جميع أنحاء القطر العربي
السوري، ويوجه معظمهم لقسم الجراحة لتلقي
العلاج اللازم.

دفعني الكم الهائل من عمليات الدرق لإجراء
دراسة شاملة عن هذا الموضوع وأخصها
بدراسة تخديرية تضمن للمريض الأمان
والسلامة خلال العمل الجراحي وبعده دون
مضاعفات أو عقابيل.

تعد الغدة الدرقية أكبر غدة صماء في جسم
الإنسان، تقع في المنطقة الأمامية للعنق، ولهذا
الموقع أهمية تشريحية - تخديرية والدرق التي
تعمل على تركيب وإفراز Tri-iodo-
thyronine T3 و T4 thyronine
Thyroxine الأساسيان لاستقلاب الجسم
تخضع لتأثير عدة عوامل فيزيولوجية ناظمة
لوظيفتها وأهمها محور تحت المهاد - النخامي
- الدرق. إن نقص إفراز هذه الهرمونات
الفعالة يؤدي إلى متلازمة القصور الدرق،
وفرط إفرازها يؤدي إلى متلازمة فرط النشاط
الدرق، ناهيك عن ضخامات الدرق كلها
يدخل تحت مضمار أمراض الغدة الدرقية.

تناولت الدراسة المريض الدرق من القصة
المرضية للفحص السريري للفحوص
المساعدة، وجمعت المعلومات حول تخدير
مريض فرط النشاط الدرق، العاصفة
الدرقية، القصور الدرق، السلعات الدرقية
البسيطة، وسرطان الدرق.

تعرضنا إلى كيفية تحضير المريض للعمل
الجراحي - مباشرة واستمرارية التخدير -

طرق تحري الزمر ABO في البقع الدموية القديمة بالاعتماد على مصول بشرية غيرية

Methods of Determent ABO System
in the Old Blood Stains by
Reteroimmunoserum

معن غانم

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. حسين نوفل

يهدف البحث دراسة طرق تحري الزمر
ABO في البقع الدموية «القديمة» بالاعتماد
على مصول بشرية غيرية، فقد تم ذكر
العينات، وعددها، وحجمها ومنشئها.

كذلك تحدث الباحث عن الخصائص المناعية
للكريات الحمراء وأهمية الكشف عن الزمر
ABO. ثم درس أهم الطرق المتبعة في الكشف
عن الزمر ABO التي تقسم إلى: تحري
الأضداد، امتصاص الأضداد البسيطة، تفاعل
الامتصاص فالانشتطار، اختبار الارتصاص
المختلط. ثم انتقل إلى معايرة المصور
بمرحلتي التمديد والمعايرة.

وفي الدراسة العملية تم تطبيق طرق الكشف
عن الزمر ABO في البقع الدموية وتوضيح
مبدأ كل طريقة والمراحل العملية التي تمت
بها. ثم ذكرت النتائج والتوصيات العملية التي
تبين أهمية هذه الطرق في الطب الشرعي، مع
ذكر الطريقة الأفضل لكشف مستضدات
الزمر ABO في البقع الدموية.

تخدير مرضى الدرق

Anesthesie Des Malades
Thyroidiens

رزان أبو الخير

حتى دمر البلد، وتحديد أهم العوامل الجرثومية والطفيلية عند مرضى الإسهال، وقياس الترابط بين نسبة انتشار المرض الهضمي وتركيز ملوثات النهر الحيوية في النقاط الموافقة، وتحديد أثر عوامل خطر البيئة على مرض الإسهال نسبة للأمراض الهضمية الأخرى. بلغت مجموعة الدراسة ٢٢٠ مريضاً هضماً في الفترة الزمنية من ٧/١٢ حتى ١٠/٧ من عام ١٩٩٩. ترافق ازدياد نسب انتشار المرض الهضمي الإسهالي عند وجود بعض العوامل البيئية والإصحاحية في منطقة المركز الصحي، ذات اعتداد إحصائي $P \leq 0.05$. وأهم هذه الأمراض حسب زرع البراز كانت جراثيم السالمونيلا نوع أريزونا بنسبة ٢% عند مرضى الإسهال، وكانت تحوي ٥٦% على الإيشريكية القولونية، و ١٩% من فحوص البراز كانت إيجابية الطفيليات. يلاحظ من ترصد مياه بردي ترابط إيجابي خفيف ما بين مؤشر الـ pH وعدد مستعمرات الكولي فورم الوسطي مع نسب انتشار المرض الهضمي في المراكز الصحية حيث كانت قيمة معامل الارتباط $+0.42$ ، $+0.287$ على التوالي. مما يستدل على أن التلوث البيئي للمياه والإصحاح من المشاكل الهامة ويتطلب مساهمة مجتمعية وعملاً جدياً من قبل السلطات الصحية والبيئية.

كيسات الطرق الصفراوية

Cholelith Cyst

عاصم حسون

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. نعيم ميدع

كيسة الطرق الصفراوية هي توسع في جزء من أجزاء الشجرة الصفراوية ويمكن أن يشمل القنوات داخل وخارج الكبد، حيث تنشأ الطرق الصفراوية جنينياً من الرتج الكبدي في

المراقبة والصحو والمضاعفات الباكراً والمتأخرة والعقاييل، وأخيراً العناية بعد العمل الجراحي.

أجريت الدراسة الإحصائية على ٣٠٠ حالة (١٥٠ من مشفى الأسد الجامعي، و ١٥٠ من مشفى المواساة) وزعت حسب العمر، الجنس، التوزيع الجغرافي، نوع الآفة، نوع العمل الجراحي، الطريقة التخديرية المتبعة. بعد ذلك تكررت المضاعفات الباكراً والمتأخرة، وتبع ذلك النتائج والتوصيات.

ولقد لوحظ أنه بتأمين وسائل المراقبة الحديثة والتقنيات التخديرية المتبعة تؤمن للمريض السلامة وتقلص نسبة كبيرة من المضاعفات الباكراً والمتأخرة وتسهل العمل الجراحي.

وبائيات الأمراض الهضمية الناجمة

عن التلوث الحيوي لنهر بردي

Epidemiology of Gastrointestinal Diseases Related to Microbiological Pollution of Barada River

محمد ماهر قتلان

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أحمد ديب دشا

تعتبر الأمراض الهضمية الناجمة عن تلوث المياه من المشاكل الهامة في العالم النامي، وخاصة لما تفرضه من خدمات صحية كثيرة وخسارة اقتصادية كبيرة. ومن هنا تم إجراء دراسة وصفية، مقطعية عرضية لتحديد أهمية العوامل البيئية المؤثرة على المرض الهضمي في خمسة مراكز صحية ممتدة من الزبداني

وبمشاركة: م. د. محمد علي سلامة

الهدف من الدراسة: تأكيد أو نفي وجود فائدة حقيقية عند إضافة الـ theophylline الوريدي إلى منبهات المستقبلات الأدرنجية β المستنشقة في التدبير الإسعافي لنوبة الربو الحادة.

طريقة الدراسة: شملت الدراسة ١٣٠ مريضاً راجعوا قسم الإسعاف في مشفى المواساة بنوبة ربو حادة خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٠ وقد تم تصنيف شدة نوبة الربو إلى نوبة بسيطة أو نوبة خطيرة.

قسم المرضى إلى مجموعتين بشكل عشوائي. أعطيت المجموعة A الـ Salbutamol بالإرذاذ بالوإشتراك مع الـ Theophylline الوريدي، في حين أعطيت المجموعة β الـ Salbutamol بالإرذاذ فقط.

تمّ تقييم حالة المرضى قبل العلاج وبعده بالاعتماد على الأعراض والعلامات السريرية بالإضافة إلى غازات الدم الشرياني وقياس الـ PEFR (معدل الجريان الزفيري الأقصى).

النتائج: تشير النتائج إلى عدم وجود فائدة حقيقية عند إضافة الـ Theophylline الوريدي إلى منبهات β_2 المستنشقة في التدبير الإسعافي لنوبة الربو الحادة.

الأسبوع الرابع من الحمل وتتشكل لمعاتها خلال الأسبوع السابع منه، وتتألف من القناتين الكبديتين اليمنى واليسرى اللتين تتحدان وتشكلان القناة الكبدية المشتركة التي تصب عليها القناة المرارية وتشكل القناة الجامعة. هذه القنوات تتقل الصفراء التي تتشكل في الكبد إلى الأمعاء. ولقد وضعت عدة نظريات تقسر سبب حدوث هذا المرض أهمها القلس الصفراوي المعكولي التالي لنشوء اتحاد القناتين البنكرياسية والصفراوية، كما وضعت عدة تصانيف للمرض أهمها تصنيف ألونسوليغ فقسمه إلى خمسة أنماط (V, IV, III, II, I) وأشيعها النمط I والذي هو توسع مغزلي في الطرق الصفراوية خارج الكبد، وإن أهم تظاهراته السريرية الألم البطني واليرقان والكتلة البطنية. كما أن أهم الوسائل التشخيصية الصدى والتصوير الطبقي المحوري CT والـ ERCP وأشيع مضاعفات هذا المرض التهاب الطرق الصفراوية المتكرر والتهاب البنكرياس والتحصي الصفراوي والتسرطن، وحسب دراستنا ومقارنة بالدراسات العالمية فإن العمل الجراحي المفضل هو استئصال الكيس مع إعادة البناء مع الصائم بمفاغرة بشكل ROUX en Y بسبب قلة مضاعفاته وكونه يزيل المرض نهائياً مقارنة بالزح الداخلي للكيس الذي يجب التحلي عنه إلا في حالات خاصة جداً.

الخطط العلاجية في حالات الربو القصبي عند المتقدمين في السن

Therapeutic Plans in Bronchial Asthma in Elderly Patients

سفير حبيب

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. هند داود

الدراسة الشعاعية لأورام الدماغ فوق الخيمة بالطبقي المحوري والرنين

كثرة حدوثه لديهن.

بالنسبة لعوامل الخطورة فقد كانت نسبة الإصابة بالداء السكري الصريح ٢٠,٩% وهي أعلى من النسبة العالمية للداء السكري ٢-١% بينما كانت ارتفاع الضغط الشرياني ١٧% وهي مماثلة للنسبة العالمية لهذا الداء تقريباً.

بالنسبة لسرطانة بطانة الرحم كان لدينا ١١١ حالة أي بنسبة ٨٦,٠٤% توزعت على المراحل التالية: ٥١,٩٣ مرحلة I، ١٣,١٧ مرحلة II، ٧,٧٥ مرحلة IV. أما الأنماط التشريحية المرضية تشكلت: الكارسينوما الغدية ٩٢,٦٦%. شائكة الخلايا ٣,٦٦%. رائعة الخلايا ٢,٧٥%. مخاطية ٠,٠٩%.

أما طرق المعالجة فقد كانت المعالجة الجراحية وحدها تمثل أكبر طرق العلاج المتبعة في مركزنا ٧٩,٨١%. أما الجراحة والأشعة فكان لـ ١٣ حالة فقط ١١,٩٢%. أما الأشعة لوحدها فكانت لـ ٨ حالات فقط ٧,٣٣%. أما العلاج الكيماوي فكان لمريضة واحدة فقط.

بالنسبة لساركوما الرحم فكان هنالك ١٨ حالة من أصل ١١١ (١٦,٢١%) وهي متفقة حوالي ضعف النسبة العالمية التي تقدر ٦,٢% كانت على المراحل التالية: I ٥ II ٤ III ٤ IV ٥.

بالنسبة للأنماط التشريحية المرضية فقد كان غرن عضلي أملس LMS ١٥. غرن اللحمية البطانة ESI ٢. أورام موللر المختلطة MMT ١. وبالنسبة للعلاج: بالجراحة. ١٢ الأشعة. العلاج الكيماوي ٢. الجراحة والأشعة ٢

المغناطيسي

CT Scan and MRI of the Supratentorial Brain Tumors

يقظان نجار

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد بسام الصواف

تعتبر أورام الدماغ فوق الخيمة شائعة في بلادنا، فهي تشكل نسبة ١٠% من أورام الجسم عامة. لذلك كان لابد من الإهتمام بها، وتطوير وسائل تشخيصها، وتحديد علاماتها الشعاعية بدقة، ليصار إلى كشفها وتشخيصها المبكر.

هدف الدراسة هو الربط بين نتائج التصوير الطبقي المحسوب والتصوير بالرنين المغناطيسي في أورام الدماغ، مع تبيان دور كل منهما وأهمية حقن المادة الظليلة في كشف الأورام الدماغية وتحديد طبيعتها، مع ربط ذلك كله مع الدراسات العالمية.

سرطان جسم الرحم

Uterine Corpus Cancer

عبد المنعم محمود نتوف

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد نذير ياسمينية

في الفترة بين كانون الثاني ١٩٩٢ و ١٥ أيلول تم قبول ١٢٩ مريضة سرطان رحم في مشفى دار التوليد الجامعي وعولج منهن في مركز الطب النووي ٢١ حالة.

كان العمر الوسطي للإصابة ٦٣ سنة وتراوح بين ١٦-٨٥ سنة وهو يعادل وسطي الدراسات العالمية ٦١ سنة. معدل الولادات كان ٥,٧ ولادة وتراوح بين (١٥-٠) ولادة وكانت نسبة الحدوث عند عديمات الإنجاب ٢٠,١٥ وهذا يخالف الدراسات العالمية عن

الجراحة + الأشعة + كيماوي ٢.

وبالنسبة للمتابعة: خلال فترة ٣ سنوات من عام (٩٦-٩٢) لسرطانة البطانة. كان عدد المتابعات ٧٢ مريضة حصلت الوفاة السرطانية بنسبة ١٨,٠٥ ووفاة عارضة مريضة وحيدة والمفقودات ١٠ (١٣,٨٨)%. وكان معدل البقاء على قيد الحياة ٦٣,٨٨%. أما حالات المتابعة لمدة ٥ سنوات للأعوام ٩٢-٩٤ فكانت عدد المتابعات ٤٦ مريضة منهن ٢٤ أحياء وفاة سرطانية ٧ مفقودات وحالة وفاة عارضة بعد العمل الجراحي. بالنسبة للساركوما الرحمية كان عدد المريضات المتابعات لمدة ٥ سنوات ٩ مريضات للأعوام ٩٢-٩٣-٩٤ توفي منها بالسرطان ٤ والأحياء ٤.

**الخصائص المورفولوجية المدرسية
والمناعية النسيجية لورم مصورات
الميناء (الأميلوبلاستوما) واحتمال
وجود علاقة بين النمط النسيجي
والسير والإنذار**

**Ameloblastoma: Morphological and
Immunohistochemical
Characteristics and the Possible
Relation Between Histological Type,
Behaviour and Prognosis**

معتز عزيز

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. شريف سالم

يعتبر ورم مصورات الميناء من أهم الأورام

السنية المنشأ وذلك من الناحية السريرية والعلاجية والإنذارية، إذ إنه يشكل ١% من مجموع أورام وأكياس الفكين. وتأتي أهميته من كونه ورماً سليماً يتصف بالغزو الموضعي، ونسبة النكس فيه عالية، ولما يمتلكه من أنماط نسيجية متنوعة. اعتمدت دراستنا على عيّنات (١٨ حالة) مأخوذة من مرضى المشافي الجامعية، حيث درست بعد الإدماج بالبارافين، وطُبقت عليها ملونات عادية وكيميائية نسيجية مع بعض الملونات المناعية النسيجية شملت (BCL-2 - سيتوكراتين - لامينين - فيمينتين).

كان الهدف من الدراسة تشخيص الأنماط النسيجية المختلفة للأميلوبلاستوما في مجموعتنا، ومحاولة تحديد المظهر النسيجي، إضافة إلى دراسة السلوك الحيوي للخلايا الورمية فيه ومحاولة كشف طبيعتها المخربة الناكسة، مع محاولة ربط الإنذار بالنمط النسيجي ودرجة التمايز.

دلّت نتائج دراستنا على:

١- ضرورة دراسة كافة الآفات السنية الكلسية تشريحياً مرضياً وبخاصة التاجية منها، وذلك لما تحمله هذه الآفات الكلسية من إمكانية وجود الورم المصور للميناء في جذرها.

٢- على الرغم من قلة الحالات المدروسة نسيجياً مناعياً في دراستنا، فإن هناك ما يشير إلى زيادة الفعالية التكاثرية للأنماط القاعدية من هذه الأورام (إيجابية التلوين بال BCL-2).

٣- إن الشكلين النسيجي الحرشفي والكيسي يتواجدان بكثرة في دراستنا، وهما يمثلان الشكل النهائي التمايزي لهذه الأورام.

٤- لم نجد في مجموعتنا أية تبدلات شكلية

لخبائثة خلوية أو نسيجية.

خبرة مشفى المواساة في تبديل مفصل الركبة الكامل

The Experience of Al-Mowassat Hospital in total knee arthroplasty

مازن محمود

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. معاوية عبد الهادي

في هذا البحث تمت دراسة ومتابعة ٦٠ حالة تبديل مفصل ركبة كامل لـ ٤٢ مريضاً، تمّ إجراؤها في الشعبة العظمية بمشفى المواساة بين عامي ١٩٩٨-١٩٩٩، وتمت متابعة المرضى لمدة سنتين تقريباً، وكانت النتائج جيدة جداً ومشجعة على السير قدماً في هذا النوع من الجراحة؛ إذ إن أكثر من ٨٠% من المرضى قد زالت معاناتهم من الألم نهائياً بعد الجراحة، كما أن أكثر من ٨٣% من المرضى تخلصوا نهائياً من استخدام العقاقير المسكنة، كما تحسنت القدرة على المشي عند المرضى بشكل كبير.

تمت مقارنة نسبة حدوث المضاعفات في هذا البحث مع دراسة أجنبية حديثة، وكانت نسبة حدوث المضاعفات في بحثنا ضمن معدل حدوثها في الدراسة الأجنبية.

راجعة بلغ عدد حالاتها ٣٨ حالة، ومن ١٩٩٨/٨/٢٢ حتى ١٩٩٩/٨/٢٢ كدراسة مستقبلية بلغ عدد حالاتها ١٠ حالات، وبذلك بلغ عدد الحالات الكلي ٤٨ حالة.

احتلّ التهاب السحايا وأمراض القلب الخلقية المزركة مراكز الصدارة كعوامل مؤهبة، حيث بلغ عدد حالات التهاب السحايا كعامل مؤهب ١٨ حالة (٣٧,٥%) بينما بلغ عدد حالات أمراض القلب الخلقية المزركة كعامل مؤهب ١٧ حالة (٣٥,٤٢%).

وبلغ عدد حالات الخراجات الدماغية المتعددة ١٣ حالة (٢٧%)، وبلغ عدد الحالات المفردة ٣٥ حالة، وكان الفص الجبهي هو الفص الأكثر إصابة. وبلغ عدد الوفيات ٢٠ حالة وعدد الناجين ٢٨ حالة، عانى ٢٣ منهم من عقابيل عصبية، بينما نجا ٥ دون عقابيل عصبية.

تمّ إجراء دراسة إحصائية لهذا البحث بإشراف الدكتورة هيام بشتور (أستاذة مساعدة في قسم طب المجتمع - جامعة دمشق - كلية الطب البشري) تمّ فيها إجراء تحليل إحصائي وصفي وتحليلي للبيانات، وأجريت المقارنة الإحصائية باستخدام الاختبارات الإحصائية الملائمة كاختبار Chi Square، واختبار Fisher، واعتمد المغزى الإحصائي في نقطة في $P<0.05$.

الدراسة الشعاعية لأمهات الدم الأبهريّة البطنية

Radiological Study of Abdominal aortic aneurysms

فراس عدلان

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد بسام الصواف

الخراجات الدماغية عند الأطفال

Brain Abscesses in Children

عدنان عزوز

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. هاني مرتضى

تمت دراسة حالات الخراجة الدماغية عند الأطفال بعد عمر الوليد في الفترة الممتدة بين ١٩٩٣/٨/٢٢ حتى ١٩٩٨/٨/٢٢ كدراسة

اللجوء إلى الوسائل الأخرى عند الحاجة.

التشخيص الشعاعي لسرطان البروستات

Radiological Diagnosis of Prostate Cancer

عماد الشاوي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد بسام الصواف

تستخدم وسائل تشخيصية متعددة في دراسة سرطان البروستات، ففي حين تعتبر الصورة الظليلة لجهاز البول والصدى عبر البطن فحوصاً موجهة لوجود الورم، يعتبر المرنان - وخاصة باستعمال المسبار الشرجي - ذو حساسية عالية في كشف الأورام المبكرة في الغدة.

ويبقى الربط بين موجودات المس الشرجي وعيار P.S.A والصدى عبر الشرج مع أخذ خزعة المشخص الأكيد لسرطان البروستات. ويتم استقصاء النقائل البعيدة والضخامات العقدية بواسطة التصوير الطبقي المحوري أو الرنين المغناطيسي.

ومن هنا ينبغي إجراء التصوير بالصدى عبر الشرج لكل مريض يشتبه لديه بضخامة موثية غير متجانسة سواء بالصدى عبر البطن أو بالمس الشرجي، مع أخذ خزعة عند الضرورة والمتابعة بالطبقي المحوري أو المرنان عند إيجابية الخزعة.

اضطرابات النظم القلبية في فترة ما حول العمل الجراحي

محمد طيب حاكمي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

هناك وسائل تشخيصية متعددة تقيد في دراسة أم الدم الأبهرية البطنية، إلا أنه تم التركيز على التصوير بالصدى والتصوير الطبقي المحوسب حيث تبين أنهما الوسيلتان الأكثر مصداقية في تشخيص أم الدم مما يسمح للجراح بوضع التدبير العلاجي المناسب بدقة حيث يكون لديه تصور واضح عن قطر أم الدم وامتدادها فوق الشريانين الكلويين أو تحتها وبيان وجود تسرخ أو تمزق...

كما يفيد كلاً من الصدى والتصوير الطبقي المحوري بمتابعة المريض بعد العمل الجراحي ودراسة المفاغرات المجراة بالشكل المناسب، ومن هنا كان على الشعاعي أن يلم إماماً كاملاً بالمظاهر الشعاعية لأم الدم الأبهرية البطنية في كل أداة تشخيصية متوفرة وعليه أن يدرك مصداقية كل وسيلة في التشخيص المطلوب.

سرطانة الخلية الكلوية

Renal Cell Carcinoma

محمود زهرة

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد بسام الصواف

هناك وسائل تشخيصية متعددة تقيد في دراسة سرطانة الخلية الكلوية إلا أن التصوير بالطبقي المحوري قبل وبعد حقن المادة الظليلة يعتبر الوسيلة النوعية لاستقصاء هذه الآفة ولا يقدم الرنين المغناطيسي أي فائدة زائدة على التصوير الطبقي المحوري إلا في حالة خثار الوريد الكلوي أو الأجوف السفلي. بينما ينحصر دور تصوير الشرايين عند الحاجة إلى استئصال الكلية بشكل جزئي.

ومن هنا فإنه يجب إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي لجميع مرضى المرحلة الأولى والثانية بعد التصوير الطبقي المحوري ويمكن

إشراف: أ.د. أمير درويش

الباب الأول: ويشمل تشريح الجهاز الناقل العصبي العضلي، فيزيولوجيا النقل العصبي القلبي الفيزيولوجيا المرضية لتشكيل اضطرابات النظم القلبية، أنواع اضطرابات النظم القلبية، تصنيف أدوية اضطرابات النظم القلبية، اضطرابات النظم وتدبيرها حسب التسلسل الزمني للتخدير وتخدير المرضى المصابين باضطرابات نظم قلبية سابقة، دراسة اضطرابات النظم القلبية في العمليات الكبرى.

الباب الثاني: الدراسة الإحصائية والنتائج:

شملت الدراسة ١٠٠ مريض في كل من مشفى المواساة، الأسد، الأطفال، التوليد، وتم تصنيفهم حسب العمر، الجنس، نوع العمل الجراحي، وجود أمراض مرافقة، طريقة التخدير واستخدام الأدوية.

النتيجة: إن اضطرابات النظم القلبية شائعة لكن غالبيتها ليس لها عقابيل سريرية.

المرضى المقلوبين هم أكثر عرضة من غيرهم لاضطرابات النظم القلبية في فترة ما حول العمل الجراحي قد تؤثر مدة العمل الجراحي سلباً على النظم القلبي من خلال تراكم المواد الإنشائية داخل الجسم.

التخدير لعمليات استئصال البروستات بالتنظير

Anesthesia in Transurethral Resection of the Prostate

ريم عبد الحي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق.

إشراف: أ.د. هند الدغلي.

تجرى عمليات استئصال البروستات بالتنظير

بشكل واسع في المشافي تحت التخدير العام أو الناحي وتتعرق بمضاعفات كثيرة أشيعها النزف والإنتهاب ومتلازمة امتصاص سوائل الإرواء التي تشكل تهديداً للحياة ومنه كان لا بد من الإلمام بالفزيولوجيا الخاصة بالتوازن المائي الصودي وكيفية تدبير الإنسمام المائي.

بما أن معظم مرضى أورام البروستات من المسنين فإن تقييمهم من قبل العمل الجراحي يكتسب أهمية خاصة وكذلك اختيار نوع التخدير الأكثر أماناً بالنظر للأمراض المرافقة المتواردة لديهم. والخيارات التخديرية تتضمن التخدير العام والتخدير الناحي بنوعيه الشوكي وفوق الجافية ولكل منهما طرق لإجرائه ومضاعفاته وإستطبابه.

أجريت الدراسة على ١٠٠ مريض قسموا إلى فئات بحسب الأعمار والأمراض المرافقة ثم بحسب نوع التخدير وتمت دراسة تبدلات النبض والضغط وسكر الدم والشوارد إضافة لدراسة المضاعفات وتدبيرها ومقارنة هذه النتائج بين نوعي التخدير لتحديد نوع التخدير الأمثل في هذا الإجراء الجراحي.

التسكين بالريمي فنتانيل في التخدير العام

Analgesia with Remi fentanil Hcl in General Anesthesia

فاتن رستم

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. هند الدغلي

إن إعطاء منبهات المستقبلات M الأفيونية يعتبر عنصراً أساسياً في التخدير وتستخدم هذه المسكنات لتخفيف إرتكاس الشدة الناجم عن تنبيه مستقبلات الألم بسبب الجراحة، كذلك تفيد هذه المسكنات في إنقاص المتطلبات

ورئوية والنفخ خارج البريتوان والأذيات الحرارية للأحشاء وانتفاها وتوسرها والتهابات البريتوان وإصابة الأوعية... إلخ.

في هذه الرسالة تمت دراسة تنظير البطن لـ ٤٠٧ حالة في الفترة الممتدة من ١٩٩٨/١٠/١ إلى ١٩٩٩/١٠/١، ٧٤,٦% من هذه الحالات كانت لاستقصاء العقم.

من هذه الدراسة وجدنا أن تنظير البطن عملية قليلة المراضة والمضاعفات ولكنها بحاجة إلى تدريب مستمر ومهارة وخبرة عالية.

كسور عنق الفخذ داخل المحفظة عند البالغين

Intracapsular Femoral Neck Fractures in Adults

حيان خضر

كلية الطب البشري - جامعة دمشق
إشراف: أ.د. منذر مسوح

هدف الدراسة: تحديد الطريقة الأمثل لعلاج كسر عنق الفخذ داخل المحفظة عند المريض المسن غالباً وذي الكثافة العظمية الناقصة بشكل يجنبه المضاعفات الشائعة لهذه الكسور ويحقق عودته إلى الحياة الوظيفية بأسرع ما يمكن.

الطرق المستعملة: استخدمت عدة طرق في العلاج صنفتم إلى ثلاث مجموعات: التثبيت الداخلي تبديل المفصل النصفى - تبديل المفصل الكامل.

النتائج: كانت النتائج جيدة جداً في حالات التثبيت الداخلي للمرضى ذوي الكثافة العظمية الجيدة في حين استخدم تبديل المفصل النصفى عند المرضى المتقدمين بالسن. أما تبديل المفصل الكامل فاستخدم بنجاح كحل علاجي

بالنسبة للمنومات والمخدرات الإنشاقية، إن الأدوية الحديثة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قصر مدة التأثير وعدم التراكم والاستقلاب الذي يعتمد على الوظيفة الكبدية أو الكلوية ويحقق الرمي فنتايل ذلك، وهو يضمن خلال العمل الجراحي تسكيناً مثالياً وضبطاً هيموديناميكاً إذا عايرنا الجرعة بالشكل الصحيح وتبقى المشكلة هي إحداثه لتباطؤ القلب وهبوط الضغط الشرياني ولكن إعطاء الجرعة الصحيحة يؤمن الثبات الهيموديناميكي ويقلل الحاجة للأتروبين ولمقبضات الأوعية. يتمتع الدواء بمزايا عديدة فهو آمن عند مرضى القصور الكبدي والكلوي، الصحو باكر وسريع، يخفض جرعة المنومات ويقلل الحاجة كثيراً للنالوكسون كما أنه يسهل الخدمة التمريضية وينتج عودة الوظائف العصبية بسرعة ترضي الجراح والمخدر ولكن من مساوئه: الحاجة لتسكين الألم المتوقع بعد العمل الجراحي نتيجة سرعة غيابه، والكلفة العالية نسبياً.

تنظير البطن في الأمراض النسائية

Laparoscopy in Gynecology

علي قهرمان

كلية الطب البشري - جامعة دمشق
إشراف: أ.د. عماد الدين تنوخي

تنظير البطن عمل جراحي قديم لازال يسير في تطور مستمر وله استطبابات علاجية مثل ربط البوقين وتشخيصه مثل استقصاء العقم ولأيد من الدقة الكبيرة عند وضع الاستطباب واستبعاد مضادات الاستطباب وهناك مضاعفات لهذا العمل الجراحي بعضها خطير يهدد الحياة وهذه المضاعفات تحذيرية قلبية

لهذه الكسور لإصلاح حالات فشل الطرق السابقة.

الاستنتاجات: نوصي باستخدام وسائل التثبيت الداخلي عند المرضى الشباب مع كثافة عظمية جيدة ونحتفظ بتبديل الورك لحالات فشل التثبيت الداخلي أو تقدم سن المريض المترافق بنقص الكثافة العظمية.

تدبير كسور العظم الزورقي ومضاعفاتها

Management of the Navicular Bone Fracture & Its Problems

محمد خير العوير

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أحمد الحلبي

كسور العظم الزورقي هي الكسور الأكثر تواتراً في المعصم بعد كسور النهاية السفلية للكعبرة. وإن لهذه الكسور أهمية اقتصادية بسبب طول فترة التثبيت بالجبس وأهمية العظم الزورقي في المعصم بالإضافة لكثرة المضاعفات وما يتلوها من إعاقة عن العمل خاصة وأن هذه الكسور تُصادف بشكل شائع عند اليافعين.

المشكلة في هذه الكسور أن خط الكسر قد لا يظهر على الصورة الشعاعية إلا بعد ٢-٣ أسابيع، وبهذه الحالة يُعتمد على الفحص السريري وخبرة الطبيب.

المشكلة الثانية كثرة مضاعفات كسور العظم الزورقي وخاصة كسور القطب القريب، حيث تترافق بنسبة عالية من النخرة الجافة وعدم الاندمال مما يستدعي العمل الجراحي الجديد في علاج كسور الزورقي:

١ - برغي هربرت.

٢ - تنبيه بؤرة الكسر كهربائياً.

أورام القلب

Cardiac Tumors

طلعت عامر

كلية الطب البشري - جامعة دمشق.

إشراف: أ.د. كمال عامر

يقع القلب في المنصف المتوسط ويتكوّن من: التامور - القلب.

القلب هو عضو عضلي مجوّف هرمي تقريباً، يتألّف من أربعة أجواف هي: الأذنان الأيمن والأيسر والبطينان الأيمن والأيسر.

تعتبر أورام القلب من الآفات النادرة الحدوث ويعتبر الورم المخاطي myxoma أشيع الأورام القلبية حدوثاً، وغالباً ما يكون قابلاً للشفاء في حين يعتبر الغرن القلبي sarcoma أندر أنواع التنشؤات القلبية حدوثاً وأسوأها إنذاراً.

تشكل أورام القلب السليمة ٧٥% من مجمل أورام القلب، ونصف هذه الأورام السليمة أورام مخاطية، في حين تشكل الأورام الخبيثة ٢٥% من أورام القلب، وغالباً ما تكون من نوع الغرن القلبي. ويعتبر مرضى الأورام المخاطية المرضى الأفضل إنذاراً.

وبالنسبة، فإن أورام القلب من الأورام نادرة الحدوث، غالبيتها من النوع السليم ذي الإنذار الحسن، وهناك نسبة قليلة من الأورام الخبيثة ذات الإنذار السيء.

التهابات الجيوب الفطرية

Fungalsinusitis

محمد جمعة

كلية الطب البشري - جامعة دمشق.

إشراف: أ.د. أكرم الحجار.

إصابة الحجاج (٢٥%) مقابل (٠%) عند المرضى بدون إصابة حجابية. إن توقيت العمل الجراحي بعد شهر من التشخيص وهذا يعكس التأخر في إجراء العمل الجراحي وقد حدثت إصابة داخل القحف عند ٤ مرضى و ٣ منهم توفوا.

إن الإصابة بالفطور العفنة mucor هي إصابة مهددة للحياة وتتطلب تشخيصاً وعلاجاً مبكراً ويعتمد العلاج على استخدام مضادات الفطور خاصة الامفوتريسين B أو الأجيال الحديثة منه مع تنظير النسيج المصابة، وعند وجود إصابة حجابية متقدمة يجب إجراء تفريغ الحجاج خوفاً من إصابة الجملة العصبية المركزية في حين يمكن تجنب تفريغ الحجاج إذا استجابت الإصابة للعلاج المبكر بمضادات الفطور وتمت السيطرة على العامل المؤهب.

إن AFS كيان مرضي جديد ناجم عن إصابة فطرية خارج مخاطية تثير استجابة ارجيه وهو شكل غير غازي ولكن يمكن أن يتوسع ويؤدي لإصابة الحجاج والقحف لذلك يجب تشخيصه مبكراً. وعلاجه يعتمد على إزالة المخاطية المصابة مع إعطاء كورتيكوزون موضعي أو بالطريق العام والمعالجة المناعية مبشرة وقد شخصت حالة واحدة فقط في الدراسات المحلية من أصل أكثر من ٢٠٠ حالة أجري لها جراحة جيوب تنظيرية أي أقل من ٠,٥% مقابل ١٠-٥% للمرضى في الدراسات العالمية وهذا يعكس قلة تشخيص هذه الإصابة.

إن الإصابة بالرشاشيات يمكن أن تتظاهر بعدة أشكال وقد سجلت منها حالتان في الدراسة المحلية.

إن داء البواغ الأنفي هو إصابة غير شائعة تتظاهر بانسداد أنف ورعاف وقد سجلت منها حالة واحدة في الدراسة المحلية.

إن التهابات الجيوب الفطرية هي كيان مرضي غير نادر وله أربعة أنماط: التهاب الجيوب الفطري الأرجي AFS والفطروم وهما شكلان غير غازيان، والتهاب الجيوب الفطري الخاطف والتهاب الجيوب الفطري المزمن والمختل indolent chronic sinusitis وهما شكلان غازيان.

شملت الدراسة ١٩ حالة التهاب جيب فطري خلال ١٠ سنوات بين عامي ١٩٩٠-٢٠٠٠ وكانت الإصابة بالفطريات العفنة هي الأشيع (١٥ حالة) مقابل حالة واحدة فقط بـ AFS وحالتان للإصابة بالرشاشيات وحالة داء بوانغ انفي.

بالنسبة لمرضى الإصابة بالفطريات العفنة فقد كان وسطي عمر الإصابة ٤١ سنة (٨ ذكور و ٧ إناث) وكان السكري هو العامل المؤهب في ١٤ حالة (٩٣,٥%) بينما كان القصور الكلوي المزمن هو العامل المؤهب في حالة واحدة (٦,٥%).

إن ١٢ مريض حدث لديهم إصابة حجابية (٨٠%) بينما ٣ مرضى لم يوجد لديهم إصابة حجابية (٢٠%) شمل العلاج إصلاح العامل المؤهب وإعطاء الامفوتريسين ب في ١١ حالة (٧٢,٥%) وعولجت حالة واحدة بابودايد البوتاسيوم (٦,٥%) كما شمل العلاج إجراء الجراحة والتي تراوحت ما بين تنظير النسيج المصابة حتى تفريغ الغربال والوتدي ولم يجز تفريغ الحجاج أو استئصال الفك العلوي في أي حالة. حدثت الوفاة عند ٣ مرضى (٢٠%) وهؤلاء المرضى كان عندهم حمض خلوني. إن نسبة الوفيات عند مرضى

المحلية وقد استخدمت كل من الطرائق التالية في التشخيص:

الصورة الشعاعية البسيطة، التصوير الطبقي المحوري، التصوير بالرنين المغناطيسي، تصوير الشرايين الظليل.

تبين لنا من الحالات المدروسة أن المرنان له الدور الأكبر في كشف وتقييم الورم السحائي وتحديد طبيعته خاصة إذا أشركناه مع الحقن الوريدي للمادة الظليلة.

تأخر النمو داخل الرحم

Intra uterine growth retardation

أمل صيفي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. مروان زيات

أجريت هذه الدراسة لمعرفة نسبة حدوث نقص وزن الولادة نسبة لسن الحمل (SGA) ولتقصي معظم العوامل التي يظن أنها تؤثر على نسبة حدوث. حيث بلغت نسبة حدوث ١٠,١١% ولوحظ أيضاً زيادة نسبة المواليد ناقصي وزن الولادة عند أمهات تحت عمر ١٨ سنة مع ارتفاع طفيف في نسبة حدوث عندما يتجاوز عمر الأم الـ ٣٥ سنة، وازدادت النسبة أيضاً عندما قلت المدة بين كل حمل والذي يليه عن ٣ سنوات، وكذلك تزداد الخطورة عند وجود سوابق لإنجاب طفل ناقص وزن الولادة، وبدراسة الأمراض المزمنة عند الأم الحامل وعلاقتها مع تأخر النمو الجنيني وجد أن ارتفاع الضغط الشرياني يضاعف فرصة إنجاب وليد ناقص الوزن وبشكل عام اضطراب المشيمة سواء بالوضعية أو الوظيفة أو الحجم يؤدي إلى زيادة معدل نقص النمو الجنيني. للأمواج فوق الصوتية دور مهم جداً في تشخيص صغر

المظاهر الشعاعية لفتق النواة اللبية

Radiologic features of disc herniation

عامر العارف

كلية الطب البشري - جامعة دمشق.

إشراف: أ.د. محمد بسام الصواف.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان العلامات الشعاعية لفتق النواة اللبية في الناحية الرقبية والصدرية والقطنية وتحديد المظاهر الأكثر دقة للتشخيص الأكيد لفتق النواة اللبية من أجل تمييزه عن التبارز القرصي حيث أنه في كثير من الأحيان يتم الاختلاط بين التشخيصين.

أما الطرائق المستعملة في التشخيص فقد تم الاعتماد على التصوير الظليل للقناة الشوكية والتصوير الطبقي المحوري والتصوير بالرنين المغناطيسي. ثم تم إجراء مقارنة بين نتائج التصوير الطبي ونتائج التداخل الجراحي مع ربط ذلك كله مع الدراسات العالمية فوجد المرنان له الدور الأدق في تشخيص فتق النواة اللبية.

التشخيص الشعاعي للورم السحائي

Radiologic Imaging of Meningeal Tumour

مأمون يراني

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد بسام الصواف

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الطرائق التصويرية المتبعة في تشخيص الأورام السحائية مع بيان دور كل منها في كشف الأفة وتحديد طبيعتها مع ربط ذلك كله مع الدراسات العالمية ومقارنتها مع الدراسة

تشخيص وتدبير أمراض الركبة بالتنظير

Diagnosis and treatment of the
knee ailments with arthroscopy

أحمد محمد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. مروان موسى

الركبة هي الأكثر أهمية بالنسبة للتنظير لأن
أمراضها قابلة للمعالجة بالتنظير.

تقسم الركبة إلى حبرات. ومفتاح النجاح
للتشخيص الدقيق والمعالجة بواسطة التنظير
هو المدخل النظامي وطريقة الانتقال من
حجرة إلى حجرة.

المدخل هي: - أمامي وحشي.

- أمامي أنسي.

- خلفي أنسي.

- جانب داغصة وحشي.

تتم دراسة الركبة بالتنظير عن طريق مدخل
أمامي وحشي حيث يدرس أولاً الجيب فوق
الداغصة ثم المفصل الفخذي الداغصي - التلمة
بين اللقمتين - الحجرة الأنسية - الميزابة بين
اللقمتين - الحجرة الخلفية الأنسية - الحجرة
الوحشية وأخيراً الحجرة الخلفية الوحشية.

أهم الاضطرابات المرضية:

- تمزقات الغضاريف الهلالية.

- تنكس الغضاريف المفصليّة.

- Osteochondritis dissecans -

- Osteomalicia -

- تمزق الرباط المتصالب الأمامي.

- الأجسام الحرة.

تمت دراسة عدد من المرضى في مشفى الأسد
الجامعي والمواساة حيث:

- توزع الحالات بالنسبة للعمر.

- توزع الحالات بالنسبة للجنس.

حجم الجنين وفي متابعة المريضات. ومن
الدراسة تبين أن الوقاية هي حجر الزاوية في
متابعة هذه الحالات وأن معالجة الأمراض
المسببة والوقاية منها كلها عوامل هامة للوقاية
من المضاعفات والتي قد تؤذي الجنين.

آفات الطبقة المغذية الحملية

Gestational trophoblastic disease

إيمان النصار

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. صلاح شيخة

تمت دراسة مريضات الطبقة المغذية الحملية
في مشفى دار التوليد الجامعي خلال الفترة من
١٩٩٦/١/١ ولغاية ١٩٩٩/١٢/٣١.

درست مريضات الرحي العدارية وتم وضع
جداول ومخططات تبين من دراستها أن نسبة
الحدوث عالية في طرفي سن الإنجاب وأن
نسبة التحول للخباثة ترتفع عند عديدات
الولادة وعندما يكون حجم الرحم أكبر من سن
الحمل المقدرة عند الإفراغ وعند حاملات
الزمرة AB ولدى مريضات الرحي العدارية
زمرة III ولدى ترافق الحالة مع كيسات
لوثينية.

ودرس حالات الخباثة وتبين من دراسة
الجداول والمخططات أن النسب العالية
لحالات الخباثة هي في طرفي سن الإنجاب
وعند عديدات الولادة ولدى حاملات الزمرة
A ولوحظ زيادة نسبة الداء الانتقالي بحالات
الخباثة غير التالية لرحى عدارية.

كما تمت دراسة أهم أماكن توزع النقائل وأهم
المظاهر السريرية وأهم استنطابات المعالجة
الكيميائية والتأثيرات الجانبية لها.

- توزع الحالات بالنسبة للطرف المصاب.
- الآلية المرضية.
- نوع الأذية والاضطراب المرضي الموجود بالتظير.

أورام الدريقات «جارات الدرق» «فرط نشاط الدريقات» Tumor of the Parathyroide «Hyperparathyroidism»

يونس يونس

كلية الطب البشري - جامعة دمشق.

إشراف: أ.د. فريز صقر

أجري هذا البحث في الشعب الجراحية لمشافي جامعة دمشق وشمل حالات أورام الدريقات التي راجعت تلك الشعب خلال الفترة الممتدة ما بين عامي ١٩٨٨ و ٢٠٠٠ وكان عدد الحالات التي شملتها الدراسة ٤١ حالة. توزعت هذه الحالات إلى ٣٢ حالة عند الإناث ٧٨% و ٩ حالات عند الذكور ٢٢%. وكان متوسط أعمار المرضى ٤١ سنة. ومن الناحية السريرية انخفض متوسط فترة التشخيص من ٦ و ٤ سنة إلى ١٠ أشهر كما أن المضاعفات قد تراجعت بشكل كبير وأصبح يكشف المرض في مراحل مبكرة نسبياً. ومن الناحية المخبرية تم تشخيص الحالات جميعاً بشكل أكيد قبل الجراحة باستخدام عيار PTH وكلس الدم كما تم تحديد توزيع الأفة بدقة في معظم الحالات وخاصة في السنوات الأخيرة للدراسة. ومن الوجهة التشريحية المرضية توزعت الحالات على ٣٦ حالة غدوم ٩٠% وثلاث حالات فرط تصنع بدئي ٧,٥% وحالة سرطان دريقات وحيدة. أجريت الجراحة على ٤٠ حالة بالتخدير العام عدا حالة واحدة بالتخدير الموضعي، وتم استقصاء كامل الدريقات

وبالجهتين ومن ثم استئصال الدريقات المتضخمة عانياً فقط. هذا وقد حصل ٣٩ مريضاً على شفاء تام أي بنسبة نجاح ٩٥% وحدث النكس في حالتين إحداها سرطان دريقات والثانية فرط تصنع منتشر. مما سبق نجد أن النتائج جميعها مطابقة للنتائج العالمية باستثناء متوسط أعمار الإصابة فهو منخفض لدينا ويعزى ذلك لانخفاض متوسط الأعمار للسكان لدينا وللإهمال الذي يعاني منه المسنون عندنا.

سرطان عنق الرحم ومعالجته Cervical cancer and its treatment

هاروتيون نظاريان

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. صلاح شيخة

دراسة إحصائية راجعة لمريضات سرطان عنق الرحم المقبولات في مشفى دار التوليد الجامعي بدمشق خلال الفترة الممتدة ما بين ١/١/١٩٩٠ وحتى ٣١/٨/٢٠٠٠، كان عدد المريضات ٢٢٧ مريضة، العمر الوسطي للإصابة ٤٧,٦٢ سنة. شوهدت أكبر نسبة إصابة في دمشق وريفها ٣٤,٨%. توزعت الحالات حسب المرحلة السريرية كالتالي: ٤٦,٦% لمرحلة I، ٣٩,٦% للمرحلة II، ٧,٩% للمرحلة III، ٥,٧% للمرحلة IV. احتلت الكارسينوما شائكة الخلايا مركز الصدارة بنسبة ٨٥,٩%. عولجت ٣٤,٤% من المريضات بالجراحة فقط و ٣٥,٧% منهن بالجراحة ثم بالأشعة بينما تلقت ٢٤,٧% منهن المعالجة الشعاعية فقط الأشعة قبل الجراحة بنسبة ٥,٢% كانت نسبة الوفيات الجراحية ٠,٨%. كانت العقد اللمفية المستأصلة إيجابية بنسبة ١٨,٥% عند مريضات المرحلة I وبنسبة

وأجريت جداول مقارنة بين الطرق المختلفة، ثم أجريت مقارنة مع دراسات عالمية مشابهة ثم وضعت نتائج هذا البحث والتوصيات من أجل الحصول على أفضل النتائج عند تحضير الأطفال بشكل فموي واختيار الدواء الأفضل.

المعالجة الجراحية للانكماشات الندبية بالعنق

Surgical Treatment of Scar Contractures in the Neck

رامي عيسى
كلية الطب البشري - جامعة دمشق
إشراف: م. د. وفيق عيد

يشير تحليل معطيات الأدب الطبي إلى أن الأذيات الحرارية للعنق تشغل أحد الأماكن البارزة بين الأذيات الحرارية لمناطق الجسم المختلفة وتصادف لدى حوالي ٢٧ % من مجمل المحروقين.

ورغم التقدم في علاج المحروقين فإن عدد المرضى المصابين بنشوهات وانكماشات العنق الندبية لم يتناقص بشكل ملحوظ ومايزال ١٥-٢٠ % من المرضى المصابين بعقائيل الحروق في منطقة الرقبة يحتاجون إلى العمليات الترميمية التصنيعية لترميم الوظيفة وترميم الغلاف الجلدي الطبيعي. وعطفاً على ما ذكر أعلاه وضعنا أمامنا مهمة دراسة طرق ترميم الانكماشات والتشوهات الندبية للعنق وإيجاد أفضل الطرق وأبسطها لإجراء الترميم.

في أساس العمل توجد نتائج الاستقصاء والمعالجة الجراحية لـ ٥٨ مريضاً مصابين بالتشوهات والانكماشات الندبية التالية للحروق في منطقة العنق الذين عولجوا في

٣٨,٩ % عند مريضات المرحلة II، ولوحظت إصابة الهامش الجراحي بنسبة ١١,١ % عند مريضات المرحلة I و ٢٣,٧ % في المرحلة II. كان معدل البقيا الإجمالي لـ ٥ سنوات هو ٤٥,٠٠، وقد حدث النكس بنسبة ١,٧ %. مما سبق نجد أن النتائج متقاربة مع النتائج العالمية باستثناء انخفاض نسبة النكس في دراستنا وذلك بسبب فقدان عدد لا بأس به من المريضات وإهمال السبع الأخر لمراجعة المشفى عند حدوث النكس.

التحضير الفموي عند الأطفال قبل العمل الجراحي

Preoperative oral preparation in children

مرام البرنجي
كلية الطب البشري - جامعة دمشق
إشراف: أ. د. منى عباس

الهدف من الدراسة هو بيان الفوائد والغايات من التحضير الدوائي للأطفال قبل العمل الجراحي.

تمت الدراسة على ١٥٠ مريض في مشفى الأطفال بجامعة دمشق وتم اختيار المرضى حسب تقسيم الجمعية الأمريكية عن الفئة الأولى والثانية وكان نوع العمل الجراحي المزمع إجراؤه (فتق سرّة - فتق أربي - خصية هاجرة - قيلة مائية) وكانت الأعمار تتراوح بين (٢-٧) سنة حيث تم تحضير المرضى إما بالتزامن أو الميـدازولام أو الكتالاراميدازولام وتم تسجيل النتائج على جداول خاصة أعدت لهذا البحث، ثم أجري جمع وتسجيل البيانات التي حصلنا عليها

أكثر.

درس قصور العنق على ١٣١ مريضة خلال الفترة ما بين ١٩٩٥/٩/١ إلى ٢٠٠٠/٧/٣١ فكانت أكبر نسبة للضياح الحلمي في الشهرين الرابع والخامس، أكثر سن حملي أجري فيه تطويق في الأسبوع ١٤، نسبة نجاح التطويق ٦٠,٧%.

دراسة حول كسور الساق المفتوحة وتبديرها في مشفى المواساة Study About the Open Fractures of the Leg

أيمن محمد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق.

إشراف: أ.د. محمد الحلبي

تشمل الرسالة دراسة لكسور الساق المفتوحة لستين مريضاً تمت متابعتهم في مشفى المواساة. أظهرت الدراسة أن إصابة الذكور تفوق إصابة الإناث وأن أغلب الإصابات ناجمة عن حوادث السير. وكانت الإصابات من النمط الثالث لكسور الساق المفتوحة هي الغالبة ٥١,٥%. وقد توافقت هذه الكسور مع أذيات أخرى مثل رضوض الجمجمة والصدر والبطن بنسبة إجمالية ٣١,٨%. كما أظهرت الدراسة أن استعمال السيفالوسبورين وفانيا يخفض الخمج بشكل ملحوظ. وكانت نسبة المرضى الذين تلقوا معالجة محافظة ٦٠% أما نسبة المرضى الذين تلقوا معالجة جراحية ٤٠% وبلغت نسبة الخمج في العلاج المحافظ ١٣,٨% بينما بلغت في العلاج الجراحي ٢٩,٣% وكانت الجراثيم المسببة للخمج في كثير من الحالات هي العقنوديات الذهبية وكانت نسبة المضاعفات في العلاج الجراحي أكثر منها في العلاج المحافظ. وعند التقييم كانت نسبة النتائج في العلاج المحافظ أفضل

شعبة الجراحة التجميلية والترميمية في مشفى المواساة في الفترة الواقعة ما بين ١٩٩٣ - ١٩٩٨.

تشمل الدراسة نتائج المعالجة الجراحية لدى ٥٨ مريضاً مصابين بالانكماشات والتشوّهات الندبية التالية للحروق في منطقة العنق، أجريت لدى هؤلاء المرضى ٧٢ عملية باستخدام طرق التصنيع الجلدي المختلفة (الطعوم الجلدية جزئية وكاملة السماكة) التصنيع بشكل z، التصنيع باستخدام طريقة تأثير الجلد الحاد، التصنيع بشرائح جلدية من النسيج المجاورة.

الإسقاطات المتكررة

Habitual Abortion

رائدة الخطيب أبو فخر

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. بشار الكردي

درست ٨٨ مريضة خلال الفترة من ١٩٩٨/٩/١ وحتى ٢٠٠٠/٧/٣١ مقابل مجموعة شاهدة ١٢١٤ سيدة قسمت إلى ثلاث فئات ١٠٠٠ خروس تمام الحمل، ١٠١ لدراسة الأسباب الخمجية و١١٣ لدراسة التشوهات المكتشفة خلال القيصرية، ظهر لدينا أن نسبة الإسقاط ١١,٣٥%، عدد المرضى يتناقص بزيادة عدد الإسقاطات، وبعد سن الثلاثين تراجع المريضات بسبب إسقاطات متكررة ثانوية أكثر من البدئية. كما ظهر لدينا أن الخمج المشخص بطاخة عنقية لا يتدخل في إحداث الإسقاط المتكرر ٨٦,٤٩% في المجموعة الرئيسية و ٨٨,١٢% في المجموعة الشاهدة.

شخص التوكسوبلاسوز لدينا بواسطة أضداد IgG بنسبة ٢٧% دون إسقاط، ٥٠% ذات إسقاط وحيد، ٦٢% لديها ٣ إسقاطات أو

منها في العلاج الجراحي.

سرطان جسم الرحم

Uterine corpus Carcinoma

غسان سويد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد نذير ياسمينية

هدف الدراسة إحصائي لمعرفة توزع وانتشار سرطان جسم الرحم بين مراجعات دار التوليد الجامعي في الفترة بين كانون الثاني ١٩٩٢ و ١٥ أيلول ٢٠٠٠ تم قبول ١٥٠ مريضة سرطان رحم في مشفى دار التوليد الجامعي وعولج منهن في مركز الطب النووي ٢١ حالة.

كان العمر الوسطي للإصابة ٥٩ سنة وتراوح بين ١٦-٨٥ سنة وهو يعادل وسطي الدراسات العالمية ٦١ سنة. معدل الولادات كان ٤,٨٥ ولادة وتراوح بين (١٥-٠) وكانت نسبة الحدوث عند عديمات الإنجاب ١٢,٦ وهذا يخالف الدراسات العالمية عن كثرة حدوثه لديهن.

بالنسبة لعوامل الخطورة فقد كانت نسبة الإصابة بالداء السكري الصريح ١٣,٣ % وهي أعلى من النسبة العالمية للداء السكري ١-٢ % بينما كانت ارتفاع الضغط الشرياني ١٦ % وهي مماثلة للنسبة العالمية لهذا الداء تقريباً.

بالنسبة لسرطانة بطانة الرحم كان لدينا ١٢٧ حالة أي بنسبة ٨٤,٦ % توزعت على المراحل التالية: ٦٠ مرحلة I ١٦,٨ II ١٣,٦ III ٩,٦ مرحلة IV. أما الأنماط التشريحية المرضية تشكلت: الأدينوكارسينوما ٨٩,٧٦ %. شائكة الخلايا ٣,٩٣ %. راحة الخلايا ٢,٣٦ %. مخاطية ٠,٧٨ %.

أما طرق المعالجة فقد كانت المعالجة الجراحية وحدها تمثل أكثر طرق العلاج المتبعة في مركزنا ٧٨,٤ %. أما الجراحة والأشعة فكان لـ ١٦ حالة فقط ١٢,٨ %. أما الأشعة لوحدها فكانت لـ ٩ حالات فقط ٧,٢ %. أما العلاج الكيماوي فكان لمريضة واحدة فقط.

بالنسبة لساركوما الرحم فكان هنالك ٢٣ حالة من أصل ١٥٠ (١٥,٣ %) وهي متفقة حوالي ضعف النسبة العالمية التي تقدر ٦,٢ % كانت على المراحل التالية:

I ٦ II ٦ III ٥ IV ٦

بالنسبة للأنماط التشريحية المرضية فقد كان غرن عضلي أملس LMS ١٩. غرن اللحمية البطانية ESI ٣ أورام موللر المختلطة MMT ١. وبالنسبة للعلاج: بالجراحة ١٥٠ الأشعة ٠. العلاج الكيماوي ٢، الجراحة والأشعة ٤ الجراحة + الأشعة + كيماوي ٢.

وبالنسبة للمتابعة: خلال فترة ٣ سنوات من عام (١٩٩٢-١٩٩٧) لسرطانة البطانة. كان عدد المتابعات ٨٦ مريضة حصلت الوفاة السرطانية بسبب ١٧,٤٤ ووفاة عارضة مريضة وحيدة والمفقودات ١٤ (١٦,٧٢ %). وكان معدل البقاء على قيد الحياة ٥٦,١١ %. أما حالات المتابعة لمدة ٥ سنوات للأعوام ٩٢-٩٤-٩٥ كانت عدد المتابعات ٦١ مريضة منهن ٣٤ أحياء وفاة سرطانية ١٠ مفقودات وحالة وفاة عارضة بعد العمل الجراحي. بالنسبة لساركوما الرحمية كان عدد المريضات المتابعات لمدة ٥ سنوات ١٣ مريضات للأعوام ٩٢-٩٤-٩٥ توفي منها بالسرطان ٦ والأحياء ٥.

تأثير الميتوكلوبراميد في خفض
جرعة النومات

(البروبوفول - الثيوبنتون)

Metocopramide reduces the induction dose of propofol, thiopentone

غناء نصر

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أمير درويش

تمت الدراسة النظرية من عدد من المراجع في علم التخدير والانعاش، وفي علم الأدوية، وقد تناولت الحرائك الفارماكولوجية للأدوية بشكل عام، والخواص الفيزيائية والكيميائية والحرائك الدوائية والاستطبابات ومضادات الاستطباب والتأثيرات الدوائية على الجسم والجراحة وطريقة الإغطاء للمنومات (البروفول - الثيوبنتون) وكذلك لمضادات الإقياء (الميتوكلوبراميد).

أما الدراسة العملية فقد تمت على مجموعات من المرضى بإعطاء الميتوكلوراميد قبل مباشرة التخدير العام بـ ٥ دقائق ثم إعطاء المنومات الوريدية (البروبوفول - الثيوبنتون) وأظهرت الدراسة انخفاض جرعة المباشرة اللازمة من هذه المنومات من أجل التخدير العام.

التسكين الذليل بالترامادول التالي للعمل الجراحي عند الأطفال

Caudal tramadol for postoperative analgesia in paediatrics

ميساء عبد اللطيف

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. منى عباس

تمت الدراسة النظرية من عدد من المراجع في علم التخدير والانعاش، وفي علم الألم وطرق تدبيره خاصة عند الأطفال، وتناولت

تشريح العمود الفقري وخاصة عظم العجز. كما تمت دراسة الألم بأنماطه المختلفة ومستقبلاته والفيزيولوجية المتعلقة به وكيفية التحكم ببوابة الألم مع طرق تدبيره وخاصة التسكين الذليل الذي تمت دراسته من حيث كيفية إجرائه واستطباباته ومضادات استطبابه والمضاعفات والتي أهمها المتعلقة بالأدوية المستعملة.

وتمت الدراسة العملية بإجراء التسكين الذليل بعد العمل الجراحي عند الأطفال بحقن أحد الأدوية الثلاثة: بوبيفاكائين، ترامادول، بوبيفاكائين مع ترامادول، بما يتناسب مع وزن الطفل. وتمت متابعة المرضى لمدة ١٢ ساعة لمراقبة العلامات الحيوية ومعايير الألم والمضاعفات التالية لإجراء هذا التسكين وكيف تم تدبيرها.

تكون الأضداد اللانظامية عند مرضى القصور الكلوي المزمن وكيفية الوقاية منها

Formation of irregular antibodies in chronic renal failure patients and prevention from it

مازن نجيب أبو عسلي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد محبوب الجبرودي

تمت هذه الدراسة على مرضى قصور كلوي مزمن يخضعون لنقل دم في شعبة غسيل الكلية في مشفى المواساة وذلك خلال الفترة الواقعة بين شهر آذار وشهر تشرين الثاني من عام ٢٠٠٠.

وكان الهدف من هذه الدراسة البحث عن الأضداد اللانظامية تجاه مستضدات الكريات الحمر عند هؤلاء المرضى والتي تتكون نتيجة نقل الدم المتكرر لعلاج فقر الدم، ومن ثم بناء

دونت فترة بدء وشدة تأثير المرخي من خلال جهاز «تحريض العصب» - nerve stimulator» ومن خلال المراقبة السريرية للمريض اعتماداً على شدة ارتكاسه للمنظار الحنجري والأنبوب الرغامي ومدى ارتخاء الفكين والحبلين الصوتيين، كما تمت مراقبة التأثيرات الجانبية والتبدلات الطارئة المشاهدة. وقد أشارت النتائج إلى إمكانية التنبيب بالروكوروونيوم بجرعة (١ملغ/كغ) بعد ٦٠ ثانية بنسبة سريرية تماثل تلك المشاهدة بعد استخدام السوكساميتينيوم وبذلك يمكن القول إن الروكوروونيوم يقوم مقام السوكساميتينيوم وبالتالي يجنبنا مخاطره وتأثيراته الجانبية.

التقييم الشعاعي لالتهاب البنكرياس الحاد - المزمّن

Radiological Evaluation of Pancreatitis

الطبيب حجو

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد بسام الصواف

النظريات الإمبراضية والحالات المترافقة مع التهاب البنكرياس الحاد مع أهم علامات التشخيص والمعالجة والإنذار مع أهم المضاعفات السريرية في التهاب البنكرياس الحاد النظريات الإمبراضية والحالات المترافقة مع التهاب البنكرياس المزمّن مع أهم العلامات التشخيص والمعالجة والإنذار مع أهم المضاعفات السريرية في التهاب البنكرياس المزمّن العلامات الشعاعية /الحاد/ الصورة البسيطة والظليلة، صورة الصدر، الطبقي المحوري، التصوير الراجع، الرنين المغناطيسي، تصوير الشريان المساريقي الانتقائي، الإيكو

العلامات الشعاعية /المزمّن/ الصورة

استراتيجية خاصة لنقل الدم لهؤلاء المرضى على المدى الطويل.

التوصيات:

- البحث عن الأضداد اللانظامية عند مرضى القصور الكلوي المزمن قبل إجراء أي نقل دم.
- تحديد الأنماط الظاهرية لكريات حمر المريض المعروفة باستمناعها، وتأمين وحدات دم منمطة وموافقة للمريض عند الحاجة لنقل دم.

مقارنة بين السوكساميتينيوم والروكوروونيوم في حالات المباشرة السريعة

Acomparision Between Suxamethenium and Rocorunium in Cases of Rapid Induction

محمد قاسم البغدادي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أمير درويش

تهدف الدراسة إلى إجراء مقارنة بين السوكساميتينيوم والروكوروونيوم (إيزميرون) Ezmeron) بغية معرفة استبدال الروكوروونيوم بالسوكساميتينيوم كون هذا الأخير يحمل تأثيرات جانبية وله مضادات استطباب عديدة، وتم في هذه الدراسة إلقاء الضوء على فيزيولوجية وتشريح الوصل العصبي العضلي والعوامل المؤثرة فيه وعلى الحصار العصبي العضلي وأنواع وآلية ومعاكسة المرخيات العضلية وكذلك طرق المراقبة والتأثيرات الجانبية، وقد تمت الدراسة على ١٥٠ مريضاً من الجنسين وبأعمار مختلفة وعمليات متنوعة قسموا على ثلاث مجموعات، وكانت أدوية المباشرة وظروفها متماثلة في كل المجموعات، كما

ضرورة المتابعة الدورية. ضرورة إجراء
الدراسة الشعاعية الكاملة لكل أورام النكفة.

تشخيص آفات الطرق الصفراوية بالأمواج فوق الصوتية

Diagnosis of Biliary Tract Diseases by Ultrasonography

مازن مروان منجد

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. بسام صواف

اعتبارات تشريحية:

تتوضع المرارة في سوية الشق الكبير بين
الفص الكبدي الأيمن والأيسر.

التغيرات الولادية:

١- التحجب المراري.

٢- الإححام المراري Interposition of the
Gallbladder.

٣- الرتق الصفراوي.

٤- الكيسات الصفراوية.

الأدواء المكتسبة:

١- الطين المراري.

٢- التحصى الصفراوي.

٣- الالتهاب المراري الحاد وأسبابه...
الحصوي وغير الحصوي.

٤- التهاب المرارة المزمن.

٥- الأورام المرارية.

أ- الأورام السليمة.

ب - الأورام الخبيثة.

٦- حالات مرارية مختلفة:

- المرارة البورسلانية.
- مرارة الكورفويزر.
- الاستسقاء المراري.
- الانفتال المراري.

البسيطة، تصوير الطرق الصفراوية بالطريق
الراجع التصوير الطبقي المحوري، الرنين
المغناطيسي، تصوير الطرق الصفراوية
بالرنين، الإيكو يعتبر التصوير الطبقي
المحوري مع بروتوكولاته النوعية الوسيلة
الاستقصائية الأهم الإيكو فحص شخصي
وموجه، تشجيع إجراء الرنين وتصوير
الطرق الصفراوية والبنكرياسية بالرنين.

التشخيص الشعاعي

لأورام الغدة النكفية

Diagnostic Imaging of Parotid Tumors

شادي صبرة

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد بسام الصواف

هدف الدراسة: مراقبة نسب انتشار هذه
الأورام حسب الجنس، العمر، النمط النسجي،
التوزع الجغرافي. وإجراء مقارنة بين الوسائل
التشخيصية الشعاعية في إمكانيتها وفائدتها
خاصة تبيان أهمية الرنين المغناطيسي مقارنة
مع الطبقي المحوري.

الطرائق المستعملة في البحث: تمت الدراسة
على مرضى أورام الغدة النكفية في الشعبة
الأذنية في مشفى المواساة وفي الطب النووي.
أجري للمرضى الدراسات التصويرية
اللازمة، ثم تمت المقارنة مع النتائج العالمية.

النتائج:

- نسبة انتشار أورام النكفية مرتفعة في
محافظة دمشق.
- أهمية الطبقي المحوري والرنين
المغناطيسي في تحديد إنتشار الورم
وارتشافه.

التوصيات:

الكلي، الفيرنيوجين، لطاخة عنق الرحم واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.

أضداد الغليادين والداء الزلاقي (البطني)

Anti – Gliadin Antibodies and
Celiac Disease

ماجد الخوري

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. لينا خوري

أجريت الدراسة في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق وشملت هذه الدراسة ٣٠ مريضاً شخص لديهم الداء الزلاقي بناء على معايير E Sgan المعدلة بالمقارنة مع مجموعة الشاهد التي ضمت ٣٨ مريضاً غير مصابين بالزلاقي، حيث أجريت لكل من المجموعتين دراسة كاملة من حيث القصة السريرية والفحص السريري ودراسة مخبرية كاملة. تم التركيز فيها على أضداد الغليادين بنوعيتها (IgA-IgG) وأضداد الأندوميسيوم (IgA، حيث تبين أن أضداد الأندوميسيوم هي الأكثر حساسية ونوعية من بقية الأضداد وأكثر فعالية تشخيصية، كما بدا أن (AGA-IgG) كانت أكثر نوعية مع قيمة توقيعية إيجابية أعلى من AGA-IgA بينما كانت الأخيرة أكثر حساسية مع قيمة توقيعية سلبية أعلى.

كما أظهرت نتائجنا أن التقييم المتوافق لكل من (AGA-IgA) و (AGA-IgG) يشكل اختباراً صحيحاً: في اختبار المرضى المتوقع لديهم وجود الداء الزلاقي وبدوره وجد أن أضداد الأندوميسيوم (EMA-IgA) تشكل اختباراً مبنياً لاستنباب الخزعة المعوية.

التقصي الوراثي لنظام لوثيران

■ الخزرجات الجدارية.

٧- آفات الطرق الصفراوية:

أ- انسداد القناة الصفراوية.

ب - تحصي الطرق الصفراوية.

ج - سرطان الطرق الصفراوية.

د - التهاب الطرق الصفراوية.

هـ - حالات صفراوية متفرقة.

ز - الديدان.

موانع الحمل الهرمونية

Hormonal Contraception

ربي بطرس

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. جميل طالب

تناولت هذه الدراسة أربعة أنواع من موانع الحمل الهرمونية المتوفرة في دار التوليد الجامعي وهي Noristerate, Microlut, Triquilar, Microgynon.

تعرض الدراسة النظرية منع الحمل بكل أشكاله، وتركز على موانع الحمل الهرمونية حيث تدرس تركيبها الكيماوي، تأثيراتها الاستقلابية على الكربوهيدرات، وشحوم الدم، تأثيرها على أمراض القلب والصحة، ارتفاع الضغط الشرياني، دراسة علاقتها بالسرطانات النسائية والأخماج، مضادات استنبابها المطلقة والنسبية والمشاكل السريرية المرافقة لاستخدامها، تداخلاتها الدوائية وأخيراً عرض لفوائدها. وأما الدراسة العملية فتعرض لتأثير موانع الحمل المذكورة لدى أربع عينات مرضية خلال ١٢ دورة على الضغط الشرياني، الوزن، وتنظيم الدورة الطمثية، والتأثيرات الجانبية المرافقة، نسبة الفشل بمنع الحمل، تأثيرها على سكر الدم، خضاب الدم، الشحوم الثلاثية، والكوليسترول

the Hereditary Detection of Lutheran System

حنان كنوزي

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عيسى شيخة

تمت هذه الدراسة في مشفى الأطفال الجامعي في قسم الإسعاف في الفترة الواقعة بين شهر أيار ١٩٩٩ حتى شهر كانون الأول ٢٠٠٠.

وكان الهدف دراسة العلاقة بين نظام لوثيران وعوز خميرة G6pD مع الدراسة العائلية.

وتتمت دراسة نظام لوثيران من حيث الأضداد والمستضدات والوراثة.

ودوره في إحداث فقر دم انحلالي ثم دراسة الاختبارات اللازمة للمرضى المصابين بهذا العوز مع تعيين نظام لوثيران لهم ولذويهم.

تم جمع النتائج وتصنيفها في جداول خاصة مع دراسة إحصائية ملائمة.

المعايير الكيميائية السريرية في تشخيص فقر الدم الانحلالي

«أهمية معايرة الهابتوغلوبين

في تأكيد التشخيص»

The Chemicoclinical Criteria in Diagnosis of Hemolytic Anemia «the Importance of Haptoglobin Titration in Emphasizing Diagnosis»

رانيا توما

كلية الطب البشري - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد محبوب جبرودي

تمت هذه الدراسة في مشفى المواساة والأطفال في الفترة الواقعة بين شهر تشرين الثاني من عام ١٩٩٩ حتى شهر آب عام

٢٠٠٠.

وكان الهدف إظهار نوعية وحساسية اختبار الهابتوغلوبين في تشخيص فاقات الدم الانحلالية.

وتتمت دراسة فاقات الدم الانحلالية من الناحية الفيزيولوجية والمرضية ثم دراسة الاختبارات اللازمة للمرضى المصابين بهذه الأمراض.

تم جمع النتائج وتصنيفها في مجموعات حسب أهميتها.

التشخيص التفريقي

لفرط برولاكتين الدم

Differential Diagnosis of Hyperprolactinemia

خالد محمود سليمان

كلية الطب البشري - جامعة دمشق.

إشراف: أ.د. وائل عبد المولى باشا

يعد فرط البرولاكتين من الأمور الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الإناث اللواتي يشتكين من اضطراب دورة أو ثر حليب أو العقم أو أي أعراض تناسلية أو جنسية أخرى وعند الذكور الذين يشتكون من العنابة ونقص الشبق الجنسي أو العقم.

وتعتبر الأورام البرولاكتينية من أهم الأسباب لفرط برولاكتين المصل وهي أكثر شيوعاً عند الإناث من الذكور لذا يجب أن تشخص باكراً وخاصة عند الذكور كي لا يضطر لإجراء عمل جراحي في المستقبل ويعتمد التشخيص حالياً بشكل أساسي على صورة الرنين المغناطيسي كما أن العلاج بمماتلات الدوبامين قد أحدث ثورة في علاج هذه الأورام.

ويجب أن نعلم أن عدد مرضى فرط البرولاكتين كبير جداً في بلدنا لذلك يجب أن

Oxidative stress and the role of superoxide dismutase as antioxidant

رائدة الرفاعي

كلية الطب الصيدلة - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محي الدين جمعة

وبمشاركة: أ.د. فايزة القبيلي

يُعدّ إنزيم السوبر أكسيد ديسمناز من أهم الإنزيمات المضادة للأكسدة. وقد قمنا بمعايرة النظير الإنزيمي النحاسي (Cu Zn SoD) ضمن الكريات الحمر وذلك عند مرضى الإنسداد الشرياني في الطرفين السفليين، مرضى تضيق الشرايين الإكليلية، مرضى الداء السكري غير المعتمد على الأنسولين، وعند مجموعة الأسوياء.

نتائجنا اقترحت أهمية معايرة Cu Zn SoD عند المجموعات المرضية السالفة الذكر وذلك لتحديد مستويات مضادات الأكسدة لديهم، حيث يمكن إصلاح النقص غذائياً وعلاجياً.

أخيراً، لابدّ لنا من الإشارة إلى النهج الحديث في إعطاء الأدوية الحاوية على فيتامينات (A, E & C) وبعض العناصر الزهيدة عند الأفراد المصابين بأمراض معينة أو عند المتقدمين في العمر، وبقى هذا الأمر بحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة.

دراسة بعض المعالم الحيوية عند مرضى الإقفار القلبي والسكتة الدماغية

Study of some biochemical parameters in eschematic heart and stroke patients

إيمان باكير

كلية الصيدلة - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. وفيقة زرزور

يؤخذ هذا المرض بعين الاعتبار من تشخيص باكراً مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الأسباب المؤدية لفرط بروتين الدم مع البدء بالعلاج المبكر لما فيه مصلحة المريض.

متلازمة الخراج الكبدي الأميبي

Amoebic Hepatic Abscess Syndrome

إبراهيم الحاج علي

كلية الصيدلة - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. إميل شاهين

وبمشاركة: أ.د. خليل القوتلي

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتقييم معولية التشخيص المصلي للخراج الكبدي الأميبي، وقد تم إجراء دراسة مقارنة لعدة طرائق مخبرية مناعية مصالية لمعايرة أضداد المتحولة الحالة للنسج (CF-LA-IIF-IHA) بغية تحديد الطريقة الأفضل في التشخيص من حيث الحساسية والنوعية ومتابعة المرضى بعد العلاج، وقد قمنا أيضاً بمقارنة نتائج التشخيص المصلي والشعاعي والسريري بهدف تحديد التشخيص التفريقي الأفضل لهذه الآفة. وقد وجدنا أن طريقة IIF و IHA كانتا الأفضل من حيث الحساسية والنوعية فيما تقررت طريقة IIF بأفضليتها في متابعة المرضى بعد العلاج. تأتي أهمية هذا البحث من كون هذه الآفة مشكلة تشخيصية متحدية للسريري مما يعكس أهمية التشخيص المصلي مرتفع النوعية في التشخيص التفريقي لهذه الآفة عن الخراج الكبدي المقيح والآفات الكبدية الأخرى الشاغلة للحيز وهذا ما أكدته نتائج بحثنا.

الشدة التأكسدية ودور إنزيم السوبر أكسيد ديسمناز كمضاد أكسدة

وبمشاركة: أ.د. ف. هيرمان

تهدف الدراسة إلى معايرة بعض المعالم الحيوية عند مرضى الإقفار القلبي والسكتة الدماغية من أجل تقييم خطورتها.

فقد تم معايرة الهوموسيستئين، حمض الفولي، MTHFR، B12، المعالم الشحمية لدى المجموعة المرضية السابقة وتم ربطها مع مجموعة الأسوياء.

وتم ملاحظة وجود فارق إحصائي بين قيم الهوموسيستئين لدى مجموعتي المرضى والمراقبة، مما يدل على أن الهوموسيستئين عامل خطورة قلبي. وكما تم تقييم طفرة MTHFR العطوبة بالحرارة (C677T) وكان بالنتيجة عدم وجود فارق إحصائي بين الطفرة المذكورة وبين شدة الإصابة القلبية، ولكن الأشخاص متماثلتي الزيغوت والذين لديهم مستويات فولات $<$ من الوسيط median يبدون قيم هوموسيستئين أعلى بشكل ملحوظ من الأشخاص متماثلتي الزيغوت والذين لديهم مستويات فولات \leq من الوسيط.

دراسة إجهادات الترميمات

التاجية الجذرية

Post – Core Stress

جهاد أبو نصار

كلية طب الأسنان - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. فندي الشعرائي

وبمشاركة: د. جمال ابراهيم سعيد

يهدف البحث إلى دراسة توزيع إجهادات الترميمات التاجية الجذرية عندما يختلف طول وثخانة الوتد حاسوبياً بطريقة العناصر المنتهية، وبطريقة الاختبارات الميكانيكية. صممت ٩٠ مسألة مختلفة لترميمات تاجية وتاجية جذرية على الحاسوب وحملت قوى

محورية أو مائلة بزاوية ١٣٥° مع المحور الطولي للسن، وحللت بطريقة العناصر المنتهية، ورسمت الهالات اللونية المعبرة عن توزيع الإجهادات وقيمها، وبينت النتائج أن السن يتحمل القوة المحورية أكثر من المائلة وتتركز الإجهادات العظمى في السن السليم في منطقة تطبيق القوة وعنق السن والعاج الجذري المحيطي المقابل للقوة وذروة السن، بينما تتركز في السن المرمم تاجياً جذرياً في منطقة تطبيق القوة ومنطقة الوتد، وتزداد مع زيادة طول الوتد وثخانته، أو استعمال مواد ذات معامل مرونة أكبر، أو وجود نخور عنقية، بينما بالمقابل تنخفض الإجهادات العظمى في العاج الجذري المحيطي والعنق والذروة.

رسم ١٨٠ ناباً علوياً وسفلياً بقلوب وتيجان معدنية من النيكل كروم، بأطوال وثخانات وأشكال تحضير مختلفة مقسمة إلى ١٨ قسماً مع ١٠ أنياب سليمة شاهدة، وطبقت على السطح الحنكي قوة متزايدة بجهاز الاختبارات الميكانيكية حتى حدوث الفشل، وسجلت قوة التحمل لكل عينة، وأجري التحليل الإحصائي للنتائج باستخدام اختبار t، فتبين أن مجموعة التاج المغطي للعنق هي الأفضل ثم مجموعة التاج غير المغطي ثم مجموعة المحافظة على جدار عاجي دهليزي، وأن فئة الوتد الطويل الذي يشكل ثلثي طول الجذر أفضل من فئة الوتد القصير الذي يشكل ثلث طول الجذر، وأن الأوتاد معتدلة الثخانة أفضل من الأوتاد الرفيعة، وأن تضافر العوامل الجيدة يحسن من مقاومة الترميم والسن للفشل، وتضافر العوامل السيئة يقلل منها، وأنه لا أهمية لشكل التحضير عندما يكون الوتد معتدل الثخانة وثلثي طول الجذر، وكل الترميمات التاجية الجذرية لا ترقى إلى ربع أو ثلث مقاومة السن الطبيعي للكسر.

النتائج وجود اختلاف في بعض صفات القحف الوجهي لدى الأطفال السوريين ذوي الإطباق الطبيعي عمّا هو الحال لدى مثيلهم في المجتمعات الأخرى مع وجود بعض الاختلافات الشخصية المفردة. كما كان الاختلاف النوعي ما بين الذكور والإناث قليلاً بالإضافة أن نسبة الإطباق الطبيعي في هذه المرحلة العمرية كان منخفضاً. مما سبق نستنتج أنه يوجد بعض الصفات الخاصة بهندسة القحف الوجهي لدى الأطفال السوريين ذوي الإطباق الطبيعي اختلفت في بعض جوانبها مع أطفال بعض المجتمعات الأخرى مما يدعو إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع التشخيص التقويمي. كما يوجد اختلافات شخصية فردية يجب عدم تجاهلها بالإضافة لبعض الاختلافات بين الذكور والإناث، كما يجب زيادة العناية بالصحة الفموية للتخفيف من نسبة سوء الإطباق المرتفعة.

دور ماءات الكلسيوم في شفاء الآفات الذروية الكبيرة

The role of Calcium Hydroxide in Treating Big Periapical Lesions

عماد كركوتلي

كلية طب الأسنان - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. صفوح البني

وبمشاركة: م.د. قصي عزيز

يتضمن هذا البحث دراسة تجريبية وسريرية حول دور ضمادات ماءات الكلسيوم المستخدمة في معالجة الآفات الذروية الكبيرة ومقارنتها مع الطريقة التقليدية:

الدراسة النظرية:

تمت مراجعة أحدث الأبحاث والنظريات التي اعتمدت ضمادات ماءات الكلسيوم في معالجة

بوصى باستخدام القلوب المعدنية بطول ثلثي طول الجذر ومعدتلة الثخانة مع التاج المغطي والمعادن الذهبية وذات معامل المرونة المنخفض نسبياً، وتجنب الأوتاد القصيرة والرفيعة والثخينة والمحافظة على رقاقات عاجية ضمن التاج.

هندسة القحف الوجهي عند الأشخاص ذوي الإطباق الطبيعي في سورية دراسة شعاعية سيفالومترية

Craniofacial morphology of Subjects with neutral occlusion in Syria

ميساء خليل السلطي

كلية طب الأسنان - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد يوسف

لوضع التشخيص السليم الذي هو الخطوة الأساسية في المعالجة التقويمية لا بد من الاعتماد على القيم الطبيعية لتفريق الحالة المرضية، مما دعا عدد كبير من الباحثين لدراسة هندسة القحف الوجهي عند الإطباق الطبيعي واعتمادها كمشعر وبالتالي هدف البحث الحالي هو معرفة فيما إذا كان القحف الوجهي لدى الأشخاص ذوي الإطباق الطبيعي في مجتمعا يتميز بصفات خاصة بهم، فيما إذا كانت هذه العينات تختلف عن المجتمعات الأخرى وفيما إذا كانت مرتبطة بالجنس أم لا. إذ تم ذلك من خلال دراسة صور شعاعية سيفالومترية لـ ٥٠ شخصاً (٢٦ ذكر، ٢٤ أنثى) بعمر متوسط قدره ٩,٤٠ لديهم إطباق طبيعي تم الحصول عليهم من خلال دراسة ميدانية سريرية لـ ١٠٠٠ طفل من تلاميذ المدارس في دمشق. لقد أثبتت

Comparative Study of Some Dental Restorative Materials and Available as Alternatives to Dental Amalgam

رولا البني

كلية طب الأسنان - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. فيصل ديوب

وبمشاركة: أ.د. غسان العويني

يعتبر الأملغم السني من أكثر المواد الترميمية شيوعاً في معالجة الأسنان الخلفية؛ ولكن اكتشاف بعض التأثيرات السلبية المحتملة للزئبق السام الداخل في تركيبه على الصحة البشرية أضف إلى لونه غير التجميلي إطلافاً مع ظهور وتطور المواد التجميلية وتقدمها الذي أصبح يؤهلها لترميم الأسنان الخلفية، أدى إلى جدل كبير حول ضرورة استبعاد الأملغم السني وحلول المواد الحديثة التجميلية محله.

وقد كان هذا هو الهدف الرئيس لبحثنا الذي عمل على اختبار عدة نواحي في ما يسمى ببدائل الأملغم السني ومقارنتها مع الأملغم لمعرفة جودة عملها كأداء سريري في الحفرة الفموية. قمنا بانتقاء ثلاثة مواد شائعة الاستخدام كمواو بديلة للأملغم ألا وهي الاريستون، النترك سيرام، البروديبي وقمنا بتطبيق ثلاثة أنواع من الاختبارات على هذه المواد مع الأملغم وهي اختبارات مخبرية لقياس مقاومة الانضغاط ومقاومة الشد، اختبارات حيوية لمعرفة مدى الانسجام الحيوي بينها وبين النسيج الحية، اختبارات سريرية لتحري بعض الخصائص السريرية لهذه المواد ضمن الحفرة الفموية فجاءت النتائج المخبرية لتؤكد تفوق الأملغم من حيث الخواص المدروسة، بينما تراوحت قيم المواد

الأسنان العفنة عموماً والأفات الذروية خصوصاً وآلية تأثيرها ودورها في الشفاء.

الدراسة العملية:

قسمت هذه الدراسة إلى جزئين رئيسيين:

١- دراسة تجريبية على الأرانب: تم فيها زرع ضمادات مآات الكلسيوم بأنواعها الثلاثة و اتخذت الأوجينات (أكسيد الزنك + Calaxyl – Sultan – P. D ضمن عظم الفك الأوجينول) كشاهد للمقارنة.

٢- دراسة سريرية على المرضى: حيث تمت معالجة ٨٥ حالة قسمت لأربع مجموعات متساوية تقريباً، وفق أنواع الضمادات الثلاثة المستخدمة وطريقة العلاج التقليدية مع المراقبة لمدة ٦-١٢ شهراً.

النتائج:

١- نتائج التجارب المخبرية:

أبدت كل المواد المزروعة ضمن العظم ارتكاساً أولياً ظهر على شكل ارتشاح التهابي مزمن مع توسع في الأوعية الدموية المجاورة، وفي المراحل المتقدمة حدث ترميم عظمي بالمقارنة مع مادة الأوجينات التي أعاققت هذا الترميم.

٢- نتائج المعالجات السريرية:

لوحظ تفوق ضمادات مآات الكلسيوم على الطريقة التقليدية من حيث الأعراض السريرية ودرجة تراجع الأفات الذروية شعاعياً.

دراسة مقارنة لبعض المواد المرممة

السنية والمطروحة كبدايل

للأملغم السني

دراسة فيزيائية ميكانيكية، سريرية وحيوية

المرممة بهذه المواد. تم استخدام مادتي الاسمنت الزجاجي الشاردي (Ketac - Fil - ESPE و Vivadent - Vivaglass) ومادتي الكبومير (F-2000 و Compoglass - Vivadent) ومادتي التبييض Nite-White بتركيزي ١٠% و ١٦% و opalessence بتركيزي ١٠% و ٢٠%.

حضرت مجموعتين من العينات: الأولى تشمل ١٢٠ قرصاً مقسمة إلى أربعة أقسام يشمل كل قسم منها ٣٠ قرصاً من إحدى المواد المرممة. والثانية تشمل ١٢٠ ضاحكاً بشرياً مقلوعاً سليماً بعد تحضير حفر صنف ٧ على السطوح الدهليزية ومقسمة أيضاً إلى أربعة أقسام يشمل كل منها ٣٠ ضاحكاً مرمماً بإحدى المواد المرممة. وبعد تعريض العينات لمواد التبييض، درست الأقراص بالمجهر الإلكتروني الماسح حيث لوحظ انحلالاً في مادة القلب المحيطة بالذرات الزجاجية المائنة، وكان الانحلال شديداً في حالة التراكيز ١٦% و ٢٠% أما الضواحك فقد درست، بعد غمسها بأحمر الفوكسين ٠,٥% لمدة ٢٤ ساعة وإجراء مقاطع طولية دهليزية لسانية، بمكبرة Stereomicroscope حيث أظهرت النتائج وجود فرق هام إحصائياً عندما عرضت الضواحك لمواد التبييض ١٦% و ٢٠%.

الثبات في التيجان والجسور والمواد الحديثة

the Retention in Crowns & Bridges and New Materials

إياد ميشال سويد
كلية طب الأسنان - جامعة دمشق
إشراف: أ.د. فندي الشعرائي
وبمشاركة: أ.د. بدير عازار

التجميلية الأخرى بشكل مقارب لبعضها ولكنها دون الأملغم السني. أما الاختبارات الحيوية فقد أكدت نتائجها الانسجام الحيوي الرائع بين الأملغم والنسج الحية وأخيراً كانت النتائج السريرية للحشوات الأملمية مقاربة في أغلب الخصائص المدروسة لمثيلاتها التجميلية ماعدا الخاصية التجميلية التي كان فاشلاً فيها تماماً وبالتالي يمكننا القول أن استبعاد الأملغم السني أمر غير مقبول على الإطلاق كما أن القول بالبدائل التجميلية ممكن جداً في بعض الأحيان لأن هناك مجموعة من المعايير التي تحدد اختبار المادة المرممة وهي ذات علاقة بالمريض كحالة خاصة لها متطلباتها والطبيب المعالج.

أثر التبييض على بعض حشوات الاسمنت الزجاجي الشاردي والكبوميرات

Effect of bLeaching on some properties of glass ionomer cement and compomer restorations

سعاد عبود

كلية طب الأسنان - جامعة دمشق

إشراف: أ.د. فيصل ديوب

تهدف هذه الدراسة إلى تقصي أثر مواد التبييض على سطوح حشوات الاسمنت الزجاجي الشاردي والكبوميرات، وعلى التسرب الحفافي لحفر الصنف الخامس

النتائج غير حاسمة، فأوصت هذه الدراسة بمزيد من المراقبة والفحص الشامل لهذه الحالات.

يعتبر الثبات من أحد العوامل الهامة التي تؤثر على نجاح التعويضات الثابتة، ويتأثر هذا الثبات بعدد من العوامل منها: (درجة تقارب الجدران المحورية، طول الجدران المحورية، شكل الحدود العنقية، نوع الإسمنت).

اختبرت هذه الدراسة الثبات وتغيراته وفقاً لتغيرات العوامل السابقة، بقياس قوى الشد اللازمة لفصل نيجان مصبوبة ملصقة على دعائم محضرة موزعة في مجموعات مختلفة عن بعضها بالعوامل السابقة، واستنتجنا:

١- يقل الثبات كلما زادت درجة تقارب الجدران المحورية، ويقصر طولها.

٢- إن الاختلافات التي ظهرت في قيم الثبات بين شبه الكتف وخط الإنهاء البسيط اختلافات ظاهرية غير نوعية، وهما أكثر ثباتاً من الكتف.

٣- كان هناك تفاوتاً بين أنواع الإسمنت المختلفة المستخدمة في هذا البحث من حيث قوى الثبات، وأمکننا تقسيم الإسمنتات المستخدمة من حيث الأفضلية في الثبات إلى ثلاث مجموعات: (إسمنت الراتنج، إسمنت فوسفات الزنك، إسمنت البولي كربوكسيلاات وإسمنت الزجاج الشاردي، حيث أن الاختلافات التي ظهرت في قيم الثبات بين هذين النوعين من الإسمنت كانت ظاهرية).

بينما لاحظت الدراسة السريرية بأنه لا فروق ظهرت من ناحية الثبات بين المجموعات السريرية المراقبة والمختلفة فيما بينها من ناحية: (درجة تقارب الجدران المحورية، طول الجدران المحورية، شكل الحدود العنقية، نوع الإسمنت المستخدم في التثبيت) وذلك في مراقبة لمدة سنتين.

ونتيجة لقصر فترة المراقبة اعتبرت هذه

Alleles

HLA-B27

Study Of Liver Function In Normal
And Viral Hepatitis Patients

... : Assignment The Alleles Of HLA –
B27 In Syria Patients With
Ankylosing Spondylitis And Other
Articular Diseases

... :

HLA-B27

Ankylosing Spondylitis

GGT, ALP, AST, ALT

ESR

C

A

CRP C

.RF

HbsAg

()

.anti HCV

Invagination Intestinale

... :

.

.

-

%

.

... :

.

.

.

.

%

.

.%

.

Multiple Myeloma

**Postaural – Surgery Infections And
Its Antibigram**

**The Early Detection Of Multiple
Myelomas By Studying The Bloody
And Electrophoretic Changes**

)

(

Renal Injury In Collagen Diseases
(Henoch Schonlien – Systemic
Lupus Erythromatous)

Radiologic Investigations In
Pediatric Hydrocephalus

% ,

% ,

%

()

**Hyperthyroidism (Etiology –
Symptoms – Diagnosis - Treatment)**

Ulcerative Syndrom

()

(

%

•

%

·%

%

%

APTT

)

(APTT

APTT

.

.

.APTT

Urethral Sphincter

)

.

... :

... :

.

.(

"

"

**Laboratory Monitoring In Patients
Treated With Heparin “And
Factors Affecting It’s Success”**

.

.

.

.

... :

.

.

.

... ..

Glue Tissue in Corneal Incisions

9/0)

(Nylon, or 10/0 Nylon or,...

(Glue Tissue)

**Using Tramadol – Bupivacaine,
Fentanyl – Bupivacaine For Labor
And Vaginal Delivery**

**Accidental And Criminal
Intoxication By Phosphorus
Compounds**

%

:
)
 () ()
 ()
 .()

The Gallstones And Its Management

Bacteria That Cause Urinary Infections In Pregnants And Their Antibiotic Sensitivity

% ,

(% -)

1. (1) 100% ,
 2. (2) 100% ,
 3. (3) 100% ,
 4. (4) 100% ,
 5. (5) 100% ,
 6. (6) 100% ,
 7. (7) 100% ,
 8. (8) 100% ,
 9. (9) 100% ,
 10. (10) 100% ,
 11. (11) 100% ,
 12. (12) 100% ,
 13. (13) 100% ,
 14. (14) 100% ,
 15. (15) 100% ,
 16. (16) 100% ,
 17. (17) 100% ,
 18. (18) 100% ,
 19. (19) 100% ,
 20. (20) 100% ,
 21. (21) 100% ,
 22. (22) 100% ,
 23. (23) 100% ,
 24. (24) 100% ,
 25. (25) 100% ,
 26. (26) 100% ,
 27. (27) 100% ,
 28. (28) 100% ,
 29. (29) 100% ,
 30. (30) 100% ,
 31. (31) 100% ,
 32. (32) 100% ,
 33. (33) 100% ,
 34. (34) 100% ,
 35. (35) 100% ,
 36. (36) 100% ,
 37. (37) 100% ,
 38. (38) 100% ,
 39. (39) 100% ,
 40. (40) 100% ,
 41. (41) 100% ,
 42. (42) 100% ,
 43. (43) 100% ,
 44. (44) 100% ,
 45. (45) 100% ,
 46. (46) 100% ,
 47. (47) 100% ,
 48. (48) 100% ,
 49. (49) 100% ,
 50. (50) 100% ,
 51. (51) 100% ,
 52. (52) 100% ,
 53. (53) 100% ,
 54. (54) 100% ,
 55. (55) 100% ,
 56. (56) 100% ,
 57. (57) 100% ,
 58. (58) 100% ,
 59. (59) 100% ,
 60. (60) 100% ,
 61. (61) 100% ,
 62. (62) 100% ,
 63. (63) 100% ,
 64. (64) 100% ,
 65. (65) 100% ,
 66. (66) 100% ,
 67. (67) 100% ,
 68. (68) 100% ,
 69. (69) 100% ,
 70. (70) 100% ,
 71. (71) 100% ,
 72. (72) 100% ,
 73. (73) 100% ,
 74. (74) 100% ,
 75. (75) 100% ,
 76. (76) 100% ,
 77. (77) 100% ,
 78. (78) 100% ,
 79. (79) 100% ,
 80. (80) 100% ,
 81. (81) 100% ,
 82. (82) 100% ,
 83. (83) 100% ,
 84. (84) 100% ,
 85. (85) 100% ,
 86. (86) 100% ,
 87. (87) 100% ,
 88. (88) 100% ,
 89. (89) 100% ,
 90. (90) 100% ,
 91. (91) 100% ,
 92. (92) 100% ,
 93. (93) 100% ,
 94. (94) 100% ,
 95. (95) 100% ,
 96. (96) 100% ,
 97. (97) 100% ,
 98. (98) 100% ,
 99. (99) 100% ,
 100. (100) 100% ,
 101. (101) 100% ,
 102. (102) 100% ,
 103. (103) 100% ,
 104. (104) 100% ,
 105. (105) 100% ,
 106. (106) 100% ,
 107. (107) 100% ,
 108. (108) 100% ,
 109. (109) 100% ,
 110. (110) 100% ,
 111. (111) 100% ,
 112. (112) 100% ,
 113. (113) 100% ,
 114. (114) 100% ,
 115. (115) 100% ,
 116. (116) 100% ,
 117. (117) 100% ,
 118. (118) 100% ,
 119. (119) 100% ,
 120. (120) 100% ,
 121. (121) 100% ,
 122. (122) 100% ,
 123. (123) 100% ,
 124. (124) 100% ,
 125. (125) 100% ,
 126. (126) 100% ,
 127. (127) 100% ,
 128. (128) 100% ,
 129. (129) 100% ,
 130. (130) 100% ,
 131. (131) 100% ,
 132. (132) 100% ,
 133. (133) 100% ,
 134. (134) 100% ,
 135. (135) 100% ,
 136. (136) 100% ,
 137. (137) 100% ,
 138. (138) 100% ,
 139. (139) 100% ,
 140. (140) 100% ,
 141. (141) 100% ,
 142. (142) 100% ,
 143. (143) 100% ,
 144. (144) 100% ,
 145. (145) 100% ,
 146. (146) 100% ,
 147. (147) 100% ,
 148. (148) 100% ,
 149. (149) 100% ,
 150. (150) 100% ,
 151. (151) 100% ,
 152. (152) 100% ,
 153. (153) 100% ,
 154. (154) 100% ,
 155. (155) 100% ,
 156. (156) 100% ,
 157. (157) 100% ,
 158. (158) 100% ,
 159. (159) 100% ,
 160. (160) 100% ,
 161. (161) 100% ,
 162. (162) 100% ,
 163. (163) 100% ,
 164. (164) 100% ,
 165. (165) 100% ,
 166. (166) 100% ,
 167. (167) 100% ,
 168. (168) 100% ,
 169. (169) 100% ,
 170. (170) 100% ,
 171. (171) 100% ,
 172. (172) 100% ,
 173. (173) 100% ,
 174. (174) 100% ,
 175. (175) 100% ,
 176. (176) 100% ,
 177. (177) 100% ,
 178. (178) 100% ,
 179. (179) 100% ,
 180. (180) 100% ,
 181. (181) 100% ,
 182. (182) 100% ,
 183. (183) 100% ,
 184. (184) 100% ,
 185. (185) 100% ,
 186. (186) 100% ,
 187. (187) 100% ,
 188. (188) 100% ,
 189. (189) 100% ,
 190. (190) 100% ,
 191. (191) 100% ,
 192. (192) 100% ,
 193. (193) 100% ,
 194. (194) 100% ,
 195. (195) 100% ,
 196. (196) 100% ,
 197. (197) 100% ,
 198. (198) 100% ,
 199. (199) 100% ,
 200. (200) 100% ,
 201. (201) 100% ,
 202. (202) 100% ,
 203. (203) 100% ,
 204. (204) 100% ,
 205. (205) 100% ,
 20

Chronic Diarrhea In Children Younger Than 2 Years Of Age

Reserch About Captopril Efficacy In Reducing Proteinuria In Patient With Glumerulonephritis

■

■

■

Rhabdomyosarcoma In Children

Vasoconstrictors And Local Anesthetics For Epidural Anesthesia

Epinephrine
% Lidocaine

(% ,)

**The Femoral Shaft Fractures In
Children Comparative Studying
Between Conservative And Surgical
Treatment**

... :

**Pleural Biopsy In Diagnosis Of
Exudate Effusions**

... :

II II

—

• •

•

•

•

•

Arcute Keratotomy To Correct Astigmatism After Cataract Surgery

• • • • •

•

Fractures Around The Ankle

Anesthesia For Mediastinal Surgery

)

■

(

%

%

%

.%

■

)

(

Cardio Pulmonary Arrest

The Using Of Ketamin In Curettage

new born

retrospective

.()

Duodenal Obstruction

()

... :

Differentiated Thyroid Cancer

.

.

% ,

% ,

.

.

:

.

(% -)

Hair Transplantation

%

.

.

.

%

)

+

+

(

.

TSH

.

.

.PNA

PNA

%

TSH

TSH

.FNA

.% -

:

**Acute Venous Thrombosis In
Behcet’s Disease**

**Radiologic Diagnosis Of The
Esophageal Tumors**

The Medical Decreasing Effect For Intraocular Pressure In Primary Open – Angle Glaucoma

$$\vdots$$

HLA

Clonidine For Spinal And Epidural In Gynecology

Cases That We Use N₂O And Cases We Don't Use It

N₂O

N₂O

N₂O

()

.Epidural + Spinal

B₁₂

**Glomerular Involvement In
Systemic Lupus Erythematosus**

**Medical Imaging Of Focal Liver
Lesions**

% - %

%
%
%
DNA

%

%

Management Of Breast Cancer

Cardiac Lesions In Metabolic Disturbances

.....
.....
.....

:

()

-

) (

.(

)

(

**The Management Of The Lower
Ureter Calculi**

.

.

... :

.

**Tuberculosis Of Head And Neck
Tuberculosis Of Cervical Lymph
Node**

;

.

.

... :

()

.

.

)

NBT

% -

**Clinilcal Manifistations In Children
With Immunodeficiency**

()

**The Anatomical Variations Of The
Middle Cerebral Artery**

.T

**The Regional Norms Of Permanent
Teeth Eruption And Their Affected
Factors**

DMFT

(WHO)

Fjohnston And Bol Ton Analysis

(

:

-

-

-

:

$.Y = 9.87 + 0.5 (x) :$ ■

$.Y = 9.32 + 0.55 (x) :$ ■

-

-

-

:

$.Y = 5.38 + 0.5 (x) :$ ■

$.Y = 4.93 + 0.52 (x) :$ ■

)

(

Detection Of Mercury Resulting From Amalgam Restoration In

Effects Of Osteoporosis On Oral Bone Resorption After Teeth Extraction Using (DEXA)

Effects Of Some Dentin Vonding

% ,

: -

**Effect Of Fixed Orthodontic
Appliances In Dental Caries**

Overdentures

**Clinical Comparison Of
Masticatory Performance Of
Patients With Overdentures And
Conventional Complete Dentures**

D1MFs

: (-)

: -

Clinical Study About Anterior Adhesive Resin Bonded Bridge

()
A Comparison Of Microleakage Of %

. % ,

Thermafil

Adhesive Posterior Bridges And The Effect Of Adhesive Materials

.

.

:

.

.

:

:

()

-

-

-

/

.

.

**Laboratory Study Of The Accuracy
Of Dental Impression Materials**

**Clinical Comparison Between
Conventional And Fluoride –
Releasing Pit And Fissure Sealants**

.

.

.

... :

.

... :

.

.

**Clinical Evaluation Of Posterior
Composite Restorations**

**A Comparison Between
Formocresol Pulpotomy With
Electrosurgical Or Ferric Sulfate
Pulpotomy**

Degufil H, Tetric Ceram,
Spectrum, Prodigy
.Tytin

Steriomicroscope

**Topical Metronidazole Application
In Treatment Of Rapidly
Progressive Periodontitis**

.....

(-)

**A Comparative Study Between
Conventional And Cryosurgery As
A Two Methods Of Treating Oral
Leukoplakia**

./ /

:

Elyzol : -

: - (-)

%

: - % ,

-)

(-

.%

-

Effect Of Luting Agents On The Marginal Adaptation Of Cast Restorations

.

. . . :

Clinical Study About Peri Apical Lesions Healing By Using Several Calcium Hydroxide Based Root Canal Sealer

.

:

.

.

-

. . . :

.

-

.()

-

.

.()

-

.

-

:

Apexit – CRCS – Sealapex – ZOE

.

-

.

()

.

:

-

.%

-

.%

Hydatid Cyst Disease

.%

-

Influence Of Saponin And Flavonoied On The Dissolution Of Pharmaceutical Solids Forms

pH

.pH=8

%

%

%

% ,
%

% , % ,

% , % ,
. % ,

- - -

. . :

.

:

“Analysis Reality of Cement Industry Syria-Developments’ Scoops”

.

.

-

.

.

Agricultural and Socio-economic Development Policies in Syria.

- - -

.

.

. :

. . :

/ /

:

.

The Job of Auditing Under Law No.20 for 1991.

:

:

/ /

/ /

:

.

**Environmental Management in the Industrial Enterprise Study &
Measuring of Environmental Impacts An Applied Study in Adra
Establishment for cement and construction materials.**

Theory of Wages In Islamic Jurisprudence

.. :

:

The Period of the time in the Legal Contracts

:

: :

- - -

: :

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

:

.

:

.

:

.

:

.

.

. . . :

"

:

"

The Economic Development at Globalization Condition's "The Abilities and The Challenge's With Special Sight to Syria"

:

"

"

.

—

.

.

.

- - -

. . . :
:

The Feasibility of a Syrian- Lebanese Industrial Integral

.

.

.

.(Feasibility)

.

.

:

.

.

•

•

•

•

•

- - -

. . . :

- :

The management of recruiter market- Lebanon experience

(-)

.

.

.

. . . :

:

Free Stipulation in Transactions between Jurisprudence & Law

"

"

:

-

-

- - -

:

:

:

:

.

.

.

. . . :

:

**The Precious Jewel in the Advice of Stultus, Judges & Emirs Al
Durra AlGharraa Fi Nassehat as – Salateen wal Qudat Wal Omaraa**

()

" . .

" .

.

. . . :

:

Human rights in behaving with his Organs in Islamic Jurisprudence and Positive Law

.

.

.

.

.

. . . :
:
:

Les Depenses des Proches

.

.

.

.

.

الشيخ، دعد، قسم الصحة النفسية والتربية التجريبية، كلية التربية، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. علي سعد، مشاركة: أ.د. موسى جبريل
الموضوع: الإنجاز وعلاقته بالتكيف الشخصي والمهني لدى عضو هيئة
التدريس في جامعتي دمشق وتشرين

Achievement and its Relation to personal and Occupational Adjustment- the case of a Member of the teaching Board at Damascus and Tishrin University

هدفت الدراسة إلى تعرف الإنجاز وعلاقته بالتكيف الشخصي المهني لدى عضو هيئة
التدريس في جامعتي دمشق وتشرين من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الإنجاز بين أعضاء هيئة التدريس في
اختبار لإنجاز تعزى إلى كل من متغيرات عدد سنوات الخدمة لعضو هيئة
التدريس، وجنسه، والجامعة التي يعمل فيها، وطبيعة تخصصه، والعوائد التي
يتقاضاها.

2- هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في التكيف الشخصي والمهني بين أعضاء هيئة
التدريس في اختبار التكيف الشخصي والمهني تعزى إلى كل من متغيرات عدد
سنوات الخدمة لعضو هيئة التدريس، وجنسه، والجامعة التي يعمل فيها، وطبيعة
تخصصه، والعوائد التي يتقاضاها.

3- هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في بين الإنجاز والتكيف الشخصي والمهني
لعضو هيئة التدريس.

تكونت عينة الدراسة من (507) أعضاء هيئة تدريس اختيروا بالطريقة العشوائية على
أساس العينة الطبقية من المجتمع التالي المؤلف من (2034) عضو هيئة تدريس.

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ببناء اختبارين هما:

أ- اختبار الإنجاز.

ب- اختبار التكيف الشخصي والمهني.

بعد التأكد من صدق الاختبارين وثباتهما طبقا على أفراد عينة الدراسة وكانت النتائج
على النحو التالي:

1- لا فروق ذات دلالة إحصائية في الإنجاز والتكيف لصالح عينات البحث ممن لديهم
خدمة خمس سنوات فأكثر.

2- لا فروق ذات دلالة إحصائية في الإنجاز والتكيف تعزى إلى الجنس.

- 3- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الإنجاز والتكيف لصالح جامعة تشرين.
- 4- لا فروق ذات دلالة إحصائية في الإنجاز تعزى إلى الاختصاص.
- 5- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في التكيف لصالح العلوم الطبية.
- 6- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الإنجاز لصالح العينة ممن يتراوح دخلهم بين 10000 ل.س. وأقل من 15000 ل.س.
- 7- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في التكيف لصالح العينة ممن يبلغ دخلهم 20000 ل.س. فأكثر.
- 8- لا علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإنجاز والتكيف الشخصي والمهني.

خطار، وائل، قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة دمشق

إشراف: د. عدنان الأحمد

الموضوع: دور التربية الجمالية في تنمية الذوق الجمالي

The Cole of aesthetic education in Developing aesthetic tasting Afield study on assemle of Education and Fine Arts Faculty students

تتجسد مشكلة البحث في تهميش دور التربية في المجتمع وعدم الاهتمام بها وإيلائها حقها ويرتبط بذلك مجموعة عوامل مثل غنى البيئة الاجتماعية أو فقرها جمالياً وطبيعة العلاقات الفكرية التي يعيش الأفراد في إطارها. وكذلك الفروقات بين الأفراد وفق الجنس لارتباط هذه المسألة بطبيعة التقاليد والعلاقات السائدة في مجتمعنا.

وتأتي أهمية البحث من ضرورات الحاجة الملحة لمنهج تربوي جمالي وبناء الشخصية الإنسانية جمالياً، ويهدف البحث إلى الكشف عن طبيعة المخزون الفكري والجمالي لدى أفراد العينة وبيان أهمية استخدامه في تطوير المعارف الجمالية والكشف عن علاقة التربية الجمالية بالحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية واختلاف التخصص بين الكليتين، وقد وضعت خمس فرضيات للوصول إلى أهداف البحث تضمنت خمسة متغيرات تابعة وهي الجنس - دخل الأسرة - حجم الأسرة - المستوى التعليمي للأبوين (0) متغير الكلية - التخصص - واستخدمت أداة في البحث وهي استبانة لسبر آراء أفراد العينة من طلبة كليتي التربية والفنون الجميلة علماً أن المنهج الذي استخدم في البحث هو المنهج الوصفي التحليلي وفي النهاية توصل البحث إلى عدد من النتائج التي في ضوئها وضعت مقترحات البحث.

العلان، عبد الله عطا، قسم المناهج وأصول التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق

إشراف، د. أحمد كنعان، ومشاركة د. أحمد الزبيبي

الموضوع: مشكلة تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية العامة

The Problems of teaching Islamic Education on the general Secondary grade

يتألف البحث الحالي من قسمين نظري وميداني، فقد احتوى القسم النظري على تسعة فصول، تحدث الفصل الأول منها عن مشكلة البحث والدراسات السابقة، بينما تحدث الفصل الثاني عن التربية الإسلامية، وتناول الفصل الثالث منهج مادة التربية الإسلامية، وتطرق الفصل الرابع لموضوع الأهداف التربوية، وتصدى الفصل الخامس للحديث عن كتب مادة التربية الإسلامية، وتحديث الفصل السادس عن طرائق تدريس مادة التربية الإسلامية، وعالج البحث في فصله السابع موضوع الوسائل التعليمية، وتناول الفصل الثامن تقويم التعليم في مادة التربية الإسلامية، وانفرد الفصل التاسع للحديث عن التوجيه الاختصاصي.

أما القسم الميداني فقد احتوى على ثلاثة فصول، تناول الفصل العاشر منهج البحث وعينته وأدواته، إذ اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بينما عالج الفصل الحادي عشر نتائج البحث وتفسيره، وتضمن الفصل الثاني عشر خلاصة البحث ومقترحاته.

ويهدف البحث الحالي إلى معرفة مشكلات تدريس مادة التربية الإسلامية والأسباب الكامنة وراءها من خلال الجوانب التالية: (الأهداف التربوية، المناهج التربوية، الكتب المدرسية، الطرائق التعليمية، نظام الامتحانات، التوجيه الاختصاصي).

وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والمقترحات التي تسهم في تحسين تدريس هذه المادة.

الحافظ، رولا، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة دمشق

إشراف: د. خالد ناصيف

الموضوع: توزيع السلطة بين الوالدين وأثره في بعض جوانب النمو الاجتماعي للطفل

دراسة ميدانية في رياض أطفال مدينة دمشق

Authority's Distribution between Parents in some sides of the social growth of children

يتضمن البحث ستة فصول الفصل الأول بعنوان التعريف بالبحث وهو يتضمن ست فقرات هدفت إلى تعرف البحث والفصل الثاني الدراسات السابقة ذكرت فيه الدراسات العربية والأجنبية. والفصل الثالث: بعنوان طفل الروضة يتضمن ثلاث فقرات: أهمية دراسة طفل الروضة، وأهمية رياض الأطفال في حياة الطفل، وبعض القواعد الهامة في تربية الطفل. وكان الفصل الرابع بعنوان: السلطة الوالدية وتضمن السلطة بوصفها مفهوماً عاماً والسلطة الوالدية وأنواعها والسلطة والتسلط والمقارنة بينهما وتصدى الفصل الخامس للحديث عن النمو الاجتماعي وتضمن أهمية الأسرة في حياة الطفل والتنشئة الاجتماعية والنمو الاجتماعي وشرح جوانبه وأخيراً إجراءات المنهج الميداني والمقترحات والملخص والمراجع والملاحق.

رتيب، ناديا، قسم الصحة النفسية، والتربية التجريبية، كلية التربية، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. علي سعد

الموضوع: العلاقة بين الأفكار اللاعقلانية والقلق الاجتماعي لدى عينة من طلبة السنة الثالثة في جامعة دمشق

يتألف البحث من سبعة فصول:

تناول الفصل الأول التعريف بالبحث وتحديد المشكلة وأهمية البحث، وفرضياته، ومنهجه، وعينته، وأدواته، وحدوده.

وتناول الفصل الثاني التفكير العلمي، وسماته، ومعوقاته، وتنميته، وأخطائه.

وتحدث الفصل الثالث عن القلق الاجتماعي.

وتصدى الفصل الرابع للكلام على الدراسات السابقة.

وخصص الفصل الخامس للحديث عن الدراسة الميدانية: المجتمع الأصلي - عينة البحث - القوانين الإحصائية المستخدمة - اختبار القلق الاجتماعي - الإطار النظري - مراحل بنائه وصدقه - وثباته واختبار الأفكار للاعقلانية - الإطار النظري - مراحل بنائه وصدقه وثباته.

وانفرد الفصل السادس للحديث عن المعالجة الإحصائية ونتائج البحث التي كانت كما يلي:

لم تظهر النتائج فرقا دالا إحصائيا للجنس والتخصص العلمي في كل من القلق الاجتماعي والأفكار اللاعقلانية بين القلق الاجتماعي والأفكار اللاعقلانية. إلا أنها أظهرت علاقة دالة إحصائيا بين القلق الاجتماعي والأفكار اللاعقلانية تبرز الدور الهام الذي تؤديه الأفكار اللاعقلانية وأثرها في القلق الاجتماعي.

مما يقدم دعما لنظرية العلاج العقلاني والانفعالي.

وأخيرا خصص الفصل السابع للحديث عن تفسير النتائج ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة وتقديم المقترحات.

الزحيلي، غسان محمود، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. علي منصور، ومشاركة: دة. ياسمين حداد

الموضوع: الدافعية وعلاقتها بدافعية التعلم – دراسة ميدانية على طلبة جامعة دمشق

**La Mativation Congtive et Sarelation Par La Motivation de
L'Apprentissage Etude Pratique sue L'étudiants de L'Université de
Damas**

توزعت الأطروحة في بابين أساسيين: ضم الباب الأول:

- الدراسة النظرية وتألقت من خمسة فصول.

ضم الباب الثاني:

- الدراسة الميدانية وتألقت من ثلاثة فصول.

تناول الفصل الأول من الدراسة النظرية مشكلة البحث: أهميتها ومتغيراتها وفرضياتها وحدود البحث والتعريف بالمصطلحات الرئيسية.

وتناول الفصل الثاني الدافعية عامة: نشأتها وأهميتها وتعريفها وتصنيفاتها ووظائفها ونظرياتها.

وتحدث الفصل الثالث عن دافعية التعلم وأهميتها في المجال التعليمي ووظائفها وأساليب استخدامها وتطبيقاتها السيكلولوجية والتربوية ومفهومها وعلاقتها بالدافعية الذاتية.

وشرح الفصل الرابع من الدراسة النظرية الدافعية المعرفية ومكانتها ومفهومها وعلاقتها بالدافعية الذاتية ونظرياتها.

وعرض الفصل الخامس والأخير من الدراسة النظرية الدراسات والبحوث العربية والأجنبية.

أما الباب الثاني المرتبط بالدراسة الميدانية فقد تكون من ثلاثة فصول وضح الفصل الأول من الدراسة الميدانية تصميم أدوات البحث. وتناول الفصل الثاني إجراءات البحث وتطبيق الأدوات وتفريغ النتائج ومعالجتها في البرنامج الإحصائي (SPSS) وخصص الفصل الثالث للحديث عن نتائج البحث وتحليلها وبيان أوجه التشابه والاختلاف، ومقارنتهما بنتائج الدراسات السابقة، وتفسيرها، وبيان التوصيات والمقترحات.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

•

•

Stipulation Freedom of Marriage Contract.

- - -

.

. . . :

"

" :

Safety and Peace, in Islam Comparison Study.

:"

"

.

.

.

.

.

.

.

. :

-

:

.

**The development of Monetary Mass In Syria Since 1970-1993 And
Its Economic Results.**

:

.

- - -

.

. . :

.

:

Revelation Reasons Their effects in explaining the Qoranic Texts.

.

.

.

" "

.

.

.

.

.

. . . :

:

.

**Effects of Labor Turnover on the Organizational Results in the
Affiliated Companies of the Public Textile Organization.**

:

. %

/ / , SPSS

:

:

:

داء البوليبات الأنفية

Nasaal Polyposis

أسامة حسيب البعيني .

كلية الطب البشري، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أكرم الحجار

تتضمن هذه المناقشة أحد الموضوعات الهامة في الممارسة وقد أشتملت على قسمين نظري تطرق إلى المسائل التشريحية والفيزيولوجية للأنف والجيوب الأنفية بالإضافة إلى الأمراض وطرق المعالجة وقسم إحصائي شمل دراسة حالات المرضى خلال عشرة أعوام 1991 إلى عام 2000 وكان عدد المرضى 250 مريضاً ونسبة إصابة الذكور أعلى قليلاً من الإناث وذروة الإصابة هي في العقدین الثاني والثالث وكان كافة المرضى يشكون من انسداد تنفسي 100 % وحوالي 74 % يشكون من سيلان أنف وتوزع باقي الأعراض بنسب مختلفة حيث انعدام الشم 30 % الرعاف 8 % وبالفحص السريري تبين أن 18 % من المرضى يشكون من انحراف وتيرة 36 % من ضخامة قريبات وقد أجري لكافة المرضى طبقي محوري وقد أظهرت نتائجها أن 63 % من الحالات كانت أحادية الجانب و 64 % وأكثر الإصابات المعزولة كانت بالجيب الفكي 34 % وقد أجري لهؤلاء المرضى الجرى لهم عمل جراحي أختلف طبيعته حسب الحالة حيث كانت نسبة المرضى الجرى لهم عمليات جراحية بالطريقة التقليدية 34 % وتوزعت حسب نوع الجراحة و 64 % أجري لهم جراحة تنظيرية من هنا نستنتج أن داء البوليبات الأنفية مرض شائع جداً ونسبة النكس فيه عالية ولكن دخول التقنيات الجديدة من جراحة الجيوب التنظيرية والمعالجة والمتابعة بعد العمل الجراحي قد خفض من نسبة النكس وقلل من نسبة حالات البوليبات الأنفية وذلك بسبب إمكانية وجود ورم خبيث أو ورم حليمي منقلب.

إستخدام الأمواج فوق الصوت عبر المري في عمليات جراحة القلب

Transesophageal Echocardiography In Heart Surgery

سامر البارودي، كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ.د. هند الدغلي

الهدف من الدراسة: بيان أهمية إستخدام الصدى القلبي أثناء جراحة القلب .

طريقة الدراسة: دراسة مستقبلية شملت ثمانين مريضاً في مركز جراحة القلب في مشفى المواساة، ممن أجريت لهم إصلاح أفة قلبية ولادية أو إصلاح أو إستبدال صمام بأخر بشري أو صناعي.

تم تطبيق الصدى القلبي على المرضى المختارين، ثم تم تقييم النتائج للوصول إلى التوصيات المناسبة، كما تمت مقارنة نتائج الدراسة مع دراسات عالمية.

في النهاية تم وضع دراسة نظرية وعرض طريقة إجراء الدراسة و النتائج والتوصيات لبيان أهمية إستخدام الصدى القلبي في جراحة القلب.

المضاعفات الآتية للتهوية الآلية

Complications Of Mechanical Ventilation

سامر قدور نعسان.

كلية الطب البشري، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد المسالمة

إن التهوية الآلية إجراء طبي يقصد به وضع المريض المصاب بقصور تنفسي حاد على الجهاز يساعد في دعم الجهاز التنفسي الطبيعي ويقوم بمهمة التنفس.

وبالرغم من إن التهوية الآلية قد تكون منفذة لحياة المريض إلا أنه قد يحدث في بعض الأحيان مضاعفات قد تؤدي بحياة المريض أو تسبب له أفة مؤقتة أو مزمنة.

وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة الحالات التي قبلت في قسم العناية الصدرية في مستشفى المواساة خلال عام 2000 والنصف الأول من عام 2001، والمضاعفات الآتية التي حدثت في العناية خلال هذه الفترة.

وكان عدد المرضى المقيولين 112 مريضاً وضعوا على التهوية الآلية، وقد درست المضاعفات الآتية:

المضاعفات القلبية الوعائية، الكلى، الهضمية، الدموية، العصبية، الجذبية، مضاعفات التنبيب، الضمور العضلي، اضطراب التغذية، صعوبة فطم المريض عن المنفسة، الصدرية وشملت: الريح الصدرية، اليبس الذاتي، الخمج، الإنخماص الانمصاصي، الإنسمام بالأكسجين.

أذيات العين الرضية من الناحية الطبية الشرعية

Traumatic Eye Injuries From Aforensic Point Of View

عباس عطا الله. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. حسين نوفل

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أذيات العين الرضية وتخصيصها من الناحية الطبية الشرعية، والبحث في أسباب هذه الأذيات وصفاتها، والمضاعفات والعقائيل الناتجة عنها، وتواتر حدوثها في مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث، وتحديد أشكالها الطبية الشرعية وتقدير العجز المتخلف عنها، ثم اقتراح سبل الوقاية منها والحد من الإعاقة والعجز المتخلف عنها.

أجريت الدراسة في مركز الطبابة الشرعية بدمشق، على 113 مصاب بهذه الأذيات، وذلك على مدى عام كامل 1999م، إضافة لبعض الإحصائيات التي أجريت في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والشعبة العينية بمشفى المواساة وذلك بهدف شمولية البحث.

وقد أظهرت هذه الدراسة أن أذيات العين الرضية يشكل 520.25 من حالات الكشف الطبي الشرعي على الرضوض بشكل عام، وهذه الأذيات كانت أكثر حدوثاً لدى الشباب بعمر 19-38 سنة (45%)، وكانت نسبة الذكور تعادل 4 أضعاف نسبة الإناث. وقد بلغت نسبة الأذيات اللانفاذة 84.82% والنافذة 15.10%، وأذية الأُجفان كانت هي الغالبة في الرضوض اللانفاذة 85.7%، وكذلك في الرضوض النافذة 75%، وقد تبين أن الأدوات الكليية والحادة كانت أكثر الأدوات المسببة لجروح العين النافذة (55.59% كليية، 32.52% حادة). وقد كانت نسبة الأذيات الشديدة والخطرة (المسببة للعجز) في دراستنا 55.57%، وكانت أكثر المضاعفات والعقائيل الناجمة عنها هي الساد الرضي (33.78%)، وتبين أن حوالي ربع المصابين بهذه الأذيات كانت لديهم القدرة البصرية النهائية جيدة نسبياً (10/4، 10/10)، كما ظهر أن 41.93% من الأذيات الشديدة أدت إلى عجز مقداره (26-35%) من وظائف الجسم. وبينت هذه الدراسة أن الأذيات المعتمدة (المشاجرات) كانت الشكل الطبي الأشيع (71.78%)، تليها حوادث السير (22.85%).

إن كل ذلك يوجه إلى ضرورة رفع مستوى وعي الفرد في مجتمعنا، وكذلك رفع مستوى الوعي المروري، والاهتمام بالأطفال وكذلك التنبيه إلى خطورة الأدوات المستخدمة في الحياة اليومية، وخاصة الأجسام الكليية والحادة وكذلك الأجسام الواخزة. وعلى الطبيب الشرعي أن يتعامل بحذر مع العين المرضوضة، وأن لا يتسرع في أحكامه مهما كان المرض بسيطاً ظاهرياً.

اندحاق البطن

Incisional Hernias

معتز المعراوي. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. عصام عجيلي

يعتبر اندحاق البطن من المضاعفات الشائعة في جراحة البطن حيث تتراوح نسبة حدوثه بين 2-11%. لذلك تم إحصاء العوامل المؤهبة للاندحاق وعلاقتها بالإمراضية والنكس من أجل الوقاية ومن هذه العوامل ما يتعلق بالمرضى كالنس والبداية والسكري وتمدد البطن والأنف ومنها ما يتعلق بالجراحة كالخمج ونوع الشق وتقنية إغلاق البطن والخيوط المستعملة. إن وضع استقطاب التكنيك المناسب وتحديد الطرق الفنية لضمان أقل إمراضية وأقل نكس وأقل كلفة مادية نقطة هامة في هذا البحث.

إن معظم الاندحاكات تستدعي استخدام رقعة لأن ذلك يخفض نسبة النكس التي كانت 30-50% بدون استخدام الرقعة وانخفضت إلى 10% باستخدامها. يجب معالجة الاندحاق بأقرب وقت خشية حدوث المضاعفات أو تحويل الحالة إلى حالة إسعافية.

التظاهرات القلبية عند مرضى فرط نشاط الدرق

Cardiac Manifestation In Hyperthyroid Pantients

ميساء الزيتاني أبو برغل.

كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. مفيد جوخدار

تعد التظاهرات القلبية من أهم تظاهرات فرط نشاط الدرق، وغالباً ما يرجع المرضى بأحد الشكاوى القلبية التي تكون في مقدمة أعراض المريض، ويمكن أن تغطي كامل الصورة السريرية حيث تؤدي إلى تضليل التشخيص في بعض الأحيان.

يهدف البحث إلى استقصاء هذه التظاهرات من خلال دراسة إحصائية شملت 181 مريض شخص لهم فرط نشاط درق. وقد شملت العينة المرضي الذين راجعوا شعبة الغدد في مشفى الأسد الجامعي ما بين عامي 1996-2000 والمرضى الذين راجعوا شعبة الغدد في مشفى المواساة ما بين عامي 1998-2000. حيث تم البحث في الأعراض والعلامات التي وجدت عند قبول المرضى وأثناء دراستهم في المشفى.

ونتيجة دراسة نسب الأعراض التي ذكرها المرضى، كان الخفقان هو العرض المسيطر عند 96% من المرضى. تليه الزلة الصدرية، فالآلم الصدري، ثم الأعراض الأسترخائية.

المضاعفات الحادة لرأب الشرايين الإكليلية عبر الجلد مع استخدام الشبكات المرنة

Acute Complications Of Stenting Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty- {Ptca}

فادي أحمد شحود. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. مروان شامية

هدف الدراسة

دراسة المضاعفات الحادة لتوسيع الشرايين الإكليلية مع استخدام الشبكات المرنة.

لمحة عن الطرائق المستخدمة

الطرق: خلال الفترة السابقة تم إجراء توسيع الشرايين الإكليلية مع استخدام شبكات معدنية بالطريقة الروتينية: تم الدخول عبر الشريان الفخذي الأيمن في كل المرضى حيث استخدم في البداية موسع مع صمام قياس 8f من ثم قثطرة مرشدة قياس 8f سلك دليل 0.014 وأجري توسيع أولي باستخدام بالون مناسب وبعده توسيع نهائي باستخدام بالون مع شبكة معدنية مناسبة.

تم استعمال النتروغليسرين مع المادة الظليلة وذلك بمقدار 150 مكغ لكل 50 مل مادة ظليلة وقد استخدم الهيبارين أثناء التوسع بجرعة 200 وحدة/كغ. تم البدء بإعطاء المرضى Ticlopidin قبل التوسع بיום واحد أو صباح يوم التوسع وبعد انتهاء التوسع تم وضع المرضى على اللزوم التالي:

Ticid 250 ملغ حبة صباحاً وحبّة مساءً لمدة شهر
Salicylate 100 ملغ حبة واحدة يومياً بعد الطعام.
Diltiazem 60 ملغ حبة 8 ساعات في حال عدم وجود مضاد استطباب.

Nitroglycerin تسرب وريدي وأحياناً Patch لمدة 24 ساعة بعد التوسع.

Heparin تسريب أو بجرعة 5000 وحدة/4 ساعات وريدي.

ثم يترك الموسع لفترة 12-18 ساعة مع نزعه بعد ذلك وبعد إيقاف الهيبارين قبل سحب الموسع بأربع ساعات.

النتائج

من الدراسة نجد أن احتشاء العضلة القلبية قد حدث لدى مريضين واحد بسبب الخثار الحاد على شبكة الشريان القطني الأول والثاني بسبب خثار على شبكة الإكليلي الأيمن وقد حدث الخثار بالرغم من تحضير المرضى

كما وجد بدراسة العلامات أن تسرع القلب شكل العلامة الأكثر أهمية، وقد شملت التسرع الجبي، الرجفان الأذيني، قصور القلب الأحتقاني، وارتفاع الضغط الشرياني.

بعد ذلك درس التوزع العمري للمرضى حيث وجد أن العلامات غير الوصفية تركزت عند المرضى كبار السن، وشملت الرجفان الأذيني، قصور القلب، والنظم الجبي الطبيعي.

من هنا نستنتج أن التظاهرات القلبية هي العرض الأبرز عند مرضى فرط نشاط الدرق. ويجب دوماً التفكير بفرط نشاط الدرق كعامل مسبب للأعراض والعلامات القلبية، خاصة عند المرضى كبار السن حيث يمكن أن يكشف

بعرض قلبي وبالتالي تغيير خطة المعالجة حسب التشخيص.

دراسة سريرية ومخبرية وعلاجية لحالات فقر الدم بعوز الحديد

Clinical, Laboratory And Therapeutical Of Iron Deficiency Anemia Conditions

أكرم محمد حسن. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد عدنان سومان

الهدف من هذا البحث دراسة حالات فقر الدم بعوز الحديد عند البالغين وتوزعها حسب العمر والجنس مع وضع التشخيص السببي لها. وقد تمت دراسة 180 مريضاً مشخص لهم فقر دم بعوز الحديد، وقد اعتمد في التشخيص بشكل رئيسي على دراسة الحديد والسعة الرابطة والطلاخة المحيطية، وتبين بنتائج الدراسة أن فقر الحديد بسبب النزف الهضمي أو التتاسلي أو زيادة الحاجة له بسبب الحمل وتعدد الولادات كانت أهم أسباب فقر الدم بعوز الحديد، كما وجدنا أن معظم مرضى الدراسة كانت لديهم نسبة الإشباع المنوية وعتار حديد المصل منخفض جداً وهذا يدل على إزمان الأفة والتأخر بالتشخيص. كما وجدنا أن هناك نسبة لإلاس بها من المرضى 11% لا يزال السبب الحقيقي لعوز الحديد لديهم غير معروف وهذا يستدعي منا استقصاءات وفحوص إضافية لتحري السبب.

حسن الجهماني. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. نجات صنيح

فرط نشاط الدرق هو متلازمة سريرية تتميز بزيادة الهرمونات الدرقية ونتائجها السريرية، ويعتبر فرط نشاط الدرق أفة شائعة في بلدنا. امتدت فترة الدراسة من تشرين الثاني 1999 ولغاية أيار 2001 وتناولت 104 مرضى، استهدفت البحث دراسة توارد الأفة حسب الجنس والعمر والمناطق الجغرافية والدراسة الإحصائية لأسباب فرط نشاط الدرق مع دراسة الأعراض والعلامات السريرية وإيضاح دور التدخين في إمرضية داء غريف ومن ثم خطة المعالجة المتبعة في فرط نشاط الدرق وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

- 1- يعتبر داء غريف السبب الأكثر شيوعاً لفرط نشاط الدرق إذ يشكل 72% من أسباب فرط نشاط الدرق ويشيع حدوثه عند الإناث أكثر من الذكور ويغلب حدوثه في الأعمار من 20-50 سنة.
- 2- يترافق التدخين مع داء غريف كما أنه ويشكل خاص يزيد من خطر حدوث إعتلال عيني شديد حيث بلغت نسبة المدخنين لدى مرضى داء غريف 43% بينما بلغت نسبة المدخنين لدى مرضى داء غريف مع إعتلال عيني 55% ويبدو أن التدخين هو واحد من عوامل متعددة

تحدث داء غريف في الأشخاص المؤهلين وراثياً.

وأخيراً أوصت الدراسة بما يلي:

- 1- إن إختيار المعالجة يعتمد على نوع الاضطراب المسبب وشدة فرط الدرق، وإن المعالجة الدوائية هي الخيار الأول في معالجة فرط نشاط الدرق لغريف في بلدنا.
- 2- ضرورة الإقلاع عن التدخين لدى مرضى فرط نشاط الدرق لمنع حدوث وتطور الإعتلال العيني لديهم.

نسبة تواتر المضاعفات المزمنة للداء السكري

Chronic Complication Of Diabetes Mellitus

معتر محمد زين. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. يونس قبيلان

تتبع أهمية الداء السكري من أنه المرض المزمن الأكثر انتشاراً في العالم ويسبب الداء السكري مضاعفات كثيرة

قبل التوسيع بـTiclopidin والأسبرين. حدث لدى مريض واحد تسليخ طويل في الشريان الأمامي النازل.

الاستنتاجات

من الدراسة السابقة نستنتج أن عملية رأب الشريان الشبكات المرنة إجراء آمن ونسبة مضاعفات قليلة و يعتبر بديل جيد ومناسب عن الجراحة في أغلب الأحيان، ويجب تطبيقه عند كل استطباب كما وتلعب الخبرة دوراً كبيراً في خفض المضاعفات.

التشخيص التفريقي لضخامة الطحال

Differential Diagnosis Of Splenomegaly

كاترين طلعت. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد عدنان سومان

هدفت الدراسة إلى دراسة أسباب الضخامة الطحالية ونسب شيوعها في الشعب الداخلية بمشفى المواساة.

اجريت الدارسة بمشفى المواساة على 221 مريضاً لديهم ضخامة طحال من قسم الأمراض الباطنة، تمت بالشكل الرابع متضمنة أسباب الضخامة الطحالية والأعراض والعلامات السريرية والمشعرات المخبرية ذات الصلة بالضخامة الطحالية.

أظهرت الدراسة أن ثلث مرضى الضخامة الطحالية كانوا من مرضى شعبة أمراض الدم وأن خمسهم مرضى من الشعبة الهضمية، شكل قصور القلب والتهاب الشغاف أهم الأسباب القلبية، كانت الكدمات والنزوف المرافقة لضخامة لطحال تكاد تقتصر على الأسباب الدموية والهضمية، والحبس والوذمات المرافقة للضخامة الطحالية اقتصررت عليها الأسباب القلبية والهضمية، لم يكن للضخامة الطحالية ميل لجنس أكثر من الآخر، كانت الضخامة الطحالية مجهولة السبب في 7% من الحالات وكانت عرطلة في 12% حيث كان السبب الدموي مسيطراً فيها.

فرط نشاط الدرق في سوريا

Hyperthyroidism In Syria

في هذا البحث إلقاء الضوء على أهم الأسباب التي تساهم في تأخر التشخيص وبالتالي الإضرار المظم لهذه الأورام.

الورم الليفي الرحمي

Uterine Fibroid

عروبة عبد الحق. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. كنعان سقا

بعد العودة إلى مراجع الأمراض النسائية والاطلاع على موضوع الورم الليفي وأهميته في المراضة النسائية والاستشفاء، أجريت دراسة إحصائية راجعة حول موضوع الورم الليفي على المريضات المصابات بهذا الداء، والمقبولات في دار التوليد الجامعي خلال الفترة الممتدة من 1996/9/1 إلى 2000/8/31م وخلصت الدراسة إلى أن الورم الليفي سبب هام للمراضة والاستشفاء والكلفة في دار التوليد الجامعي وأوصت الدراسة بضرورة التوثيق الدقيق للمعلومات السريرية والتشريحية المرضية بما يخدم البحث العلمي، كما شجعت الدراسة على الإيجاب كعامل في إنفاص تطور تحري سبب النزف الشاذ لدى المريضات اللواتي يكتشف لديهن ورم ليفي كما أوصت بتفعيل تدبير المراقبة بتنظيم إضبارات خارجية لمتابعة هؤلاء المريضات، وأوصت بدراسة مستقبلية حول علاقة الورم الليفي تحت المخاطية بالاستسقاطات المتكررة في ثلث الحمل المتوسط.

التصوير الطبي لحوادث الوعائية الدماغية

Medical Imaging Of Cerebrovascular Accident

إدريس كم نقش. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد بسام الصواف

الحوادث الوعائية الدماغية شائعة الانتشار وتسبب فترة طويلة نسبياً بالإضافة إلى العجز الذي تسببه بنسب مختلفة، لذلك كان لا بد من الاهتمام بالتشخيص المبكر لهذه المجموعة التي يتضارب أسلوب العلاج فيها بين استعمال المميعات والأدوية حالة الخثرات في حال الاحتشاء، وعدم استعمالها في حالات النزف. بينما لا يمكن التمييز سريريا بين هاتين الفئتين. أجريت الدراسة في مشفى الأسد الجامعي كذلك في مشفى المواساة، بانتقاء عينة من الأرشفة وأضابير المرضى وكذلك متابعة المرضى المتواجدين أثناء فترة إجراء الدراسة خلال عام تقريباً.

استعمال التصوير الطبقي المحوري بالدرجة الأولى وبشكل أساسي للتشخيص في الساعات الأولى من دخول المشفى. وتوبعت الدراسة بتصوير آخر على نفس

تؤدي إلى العجز، حيث تشكل مضاعفات السكري ما يزيد عن 25% من حالات القصور الكلوي الإنتهائي وما يزيد عن 50% من حالات بتر الأطراف.

كما يعتبر الداء السكري السبب الرئيسي للعمى في معظم بلدان العالم تقريباً بما يقدر بـ 5000 حالة جديدة كل عام.

بالإضافة لذلك يشغل المرضى السكريين 10% من أيام المكث بالمستشفيات لتدبير الحالات الحادة، وبسبب هذه الاحتلاطات لا بد من التأكيد على أهمية ضبط السكر في الدم بشكل جيد، ولهذا الهدف أجريت هذه الدراسة. وقد تم التركيز في هذه الدراسة على العلاقة بين ضبط السكر في الدم من خلال الالتزام بالحمية ونوعية العلاج وتواتر المراقبة وبين سرعة ظهور المضاعفات المزمنة للداء السكري وذلك عند مرضى السكري اللذين دخلوا مشفى المواساة والأسد الجامعي.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تؤكد على أهمية هذه العلاقة.

الكتل البطنية الخبيثة بعد سن الوليد

Malignant Abdominal Masses After The Neonatal Period

سمير عطا الله. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. إياد طرفة

تهدف الرسالة إلى إلقاء نظرة إحصائية حول توزع الكتل البطنية الخبيثة عند الأطفال وبعد سن الوليد في مشفى الأطفال الجامعي وذلك بالعودة إلى أرشفة السجلات الطبية واستخراج أضابير المرضى لمدة خمس سنوات راجعة بدءاً من 1993/8/1 ولغاية 1998/8/1. أما الدراسة المستقبلية ولمدة سنة واحدة فقد تمت على المرضى المقبولين في قسم الأورام بتشخيص كتلة بطنية خبيثة وقد كانت النتائج تشير إلى أن أشيع ورم يتظاهر بكتلة بطنية عند الأطفال هو N.H.L. ويأتي بالمرتبة الثانية النفروبلاتوما.

درست توزع هذه الأورام حسب نوع الخباثة، الفئات العمرية، الجنس، الأعراض والعلامات السريرية البدنية.

الوسائل التشخيصية الغازية منها وغير الغازية كما وضع التصنيف المرحلي لكل الورم (في الدراسة الراجعة) بناء على المعطيات السريرية وموجودات الفحص الشعاعي.

أما في الدراسة المستقبلية فقد وضع التصنيف استناداً للنظام العالمي المشار إليه في القسم النظري وقد حاولنا

Drowning And Near Drowning

ديانا مراد. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد العبود

تضمن البحث ما يلي

القسم النظري: فيه تعاريف و وبائيات الغرق وقرب الغرق. وشرح للفيزيولوجيا الإراضية والمظاهر السريرية والمعالجة بالإضافة إلى الإنذار والوقاية.

القسم العملي

هدف الدراسة: معرفة شيوع الغرق وقرب الغرق حسب العمر والجنس ومكان الغرق والإنذار بشكل عام وعلاقته مع المؤشرات الإنذارية.

تضمن البحث دراسة راجعة لأضابير الأطفال المسجلين في أرشيف مستشفى الأطفال الجامعي في دمشق منذ عام 1992 وحتى منتصف عام 2001.

من طرق الدراسة: تصنيف المرضى حسب النتيجة النهائية إلى ثلاث مجموعات (شفاء تام – شفاء مع عقابيل عصبية شديدة- وفاة).

من النتائج والاستنتاجات: ذروة الحوادث كانت عند الأطفال بعمر ≥ 4 سنوات. نسبة الوفيات 20%.

تدبير المجيء المقدي

Management Of Breech Presentation

أحمد البريدي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عماد الدين تنوخي

تناولت الدراسة موضوعاً هاماً في التوليد وهو تدبير المجيء المقدي وكان الهدف من البحث محاولة إيجاد الاتجاه العلمي الصحيح لتدبير حالات الولادة المقعدة وتبني خطة مثلى في هذا التدبير.

قسمت الدراسة إلى نظرية وعملية، وفي الدراسة النظرية تم تسليط الضوء على الأمور الهامة التي تخص البحث كأنماط المجيء المقعد وتشخيصه وتدبير الولادة المهبلية وملقط بايير واستطبابات العملية القيصرية.

كما تناولت المراضة والوفيات الوالدية وكذلك الأذيات الوليدية والوفيات ما حول الولادة وغيرها من المعلومات الهامة في البحث.

أما الدراسة العملية فتناولت فيها 1364 ولادة لمجيء مقعد خلال فترة عامين وتضمنت الدراسة أنماط المجيء المقدي وتأثير تكرار الولادة وسوابق ولادة أجنة مقعدة وتشوهات الرحم الخلقية بالإضافة إلى طريقة الولادة.

الجهاز أو بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، وفي بعض الحالات أجري تصوير وعائي ظليل.

كانت نسبة حدوث النزوف الدماغية 21%، أي بتواتر أقل من الاحتشاء التي وصلت 70%. أما الاحتشاءات النزفية فكانت حوالي 9%. وأظهرت الدراسة أن إصابة الشريان المخي المتوسط هي الأعلى دائماً 71%.

بالنسبة لطرائق التشخيص ففي المرحلة الحادة الطبقي المحوري هو الوسيلة الأفضل بشكل أكبر لإظهار النزف الدماغي بينما يتأخر ظهور الاحتشاء خلال 24 ساعة الأولى. بينما المرنان يظهر حساسية أفضل في حالات الاحتشاء ويعطي نتائج إيجابية بعد 6-9 ساعات تقريباً. ولكن حالة المريض غالباً لا تسمح بسبب الهياج المرافق. في حالات التشبة العابرة تكون نتائج التصوير طبيعية.

لذلك كخطة تشخيصية لمريض الحوادث الوعائية الدماغية، ينصح بإجراء تصوير طبقي محوري حال التوجه السريري، وعند وجود نزف يتابع المريض بشكل روتيني. أما في حال ظهور نتائج طبيعية جري تصوير طبقي آخر خلال 24 ساعة، أو تصوير بالرنين المغناطيسي بعد 6-9 ساعات حسب المكانية.

في حال الاشتباه باحتشاء نزفي أو وريدي، يفضل عدم التردد في إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي مع الدراسة الوعائية خاصة في الطور الوريدي.

الضخامات العقدية

Lymph Nodes Enlargement

رزان سلام. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد عدنان سومان

إن الهدف من البحث هو دراسة التشخيص التفريقي للضخامات العقدية في دراسة مستقبلية مع متابعة السجلات الطبية للمرضى المراجعين لمستشفى المواساة ومشفى الأطفال خلال عام 2000. أجريت الدراسة على مئتين وثلاثة وثمانين مريضاً من مرضى الضخامات العقدية.

تمت دراسة التشخيص التفريقي للضخامات العقدية الموضوعية والمعممة ودرست علاقته بالعمر وصفات الضخامة العقدية، ومن خلال استعراض النتائج تبين أن معظم الضخامات العقدية في الأطفال كانت ارتكاسية بينما ارتفعت نسبة الخبثات في البالغين ولا سيما بعد عمر الأربعين.

الغرق وقرب الغرق عند الأطفال

التي تؤدي إلى زيادة مخاوف المريضة وإلى تكلفة مادية باهظة لا داعي لها.

اعتمدت الدراسة على عدة مصادر تمثلت في أصابير المريضات المقيولات سابقاً في مشفى الأسد الجامعي – المواساة بين عامين 1995 – 1998 متابعه شخصية للمريضات المقيولات في عامي 1999-2000 وبطاقات المريضات اللواتي يراجعن العيادة الجراحية في المشفى. بالدراسة تمت ملاحظة الأخطاء المتبعة في تدبير بعض آفات الثدي السليمة لا سيما التعقد الدوري والأورام الغدية الليفية البسيطة عند النساء تحت عمر 25 سنة حيث أن معظم المريضات تم إجراء خزعة جراحية لهن وهذا لا داعي على الإطلاق إلا في حال وجود قصة عائلية أو شك كبير بالخباثة.

تم توجيه النصائح للنساء لإجراء فحص دوري للثدي وإجراء ماموغرام خاصة عند النساء اللواتي يوجد في عائلاتهن قصة لسرطان الثدي .

داء كابوزي بعد زرع الكلية

Kaposi's Disease After Renal Transplantation

أحمد عباس . كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عماد عثمان

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نسبة داء كابوزي بعد زرع الكلية وتحديد الشكل السريري الأشيع له في بلدنا وتحديد استجابته للعلاج وإنذاره.

تم إجراء دراسة راجعة للمرضى الذين أجروا زرع كلية خلال 5 سنوات وذلك من عام 1995 حتى عام 2000 في مشفى المواساة بدمشق، وكان عددهم 204 مريض، ظهر لدى 10 منهم داء كابوزي أي بنسبة 4.9%، وبعد تأكيد تشخيص هذا الداء بالخزعة الجلدية، كان يجري للمرضى استقصاءات شاملة تضم: صورة صدر، إيكو بطن، تصوير طبقي محوري للمصدر والبطن، تنظير هضمي علوي سفلي، تنظير قصبات وذلك لتحديد مرحلة الإصابة.

تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن نسبة داء كابوزي لدينا مرتفعة 4.9% بالمقارنة مع البلدان الغربية (0.4- 1.5%) كما أن فترة ظهوره بعد الزرع قصيرة بشكل واضح 10 أشهر وسطيًا، وكان لدى جميع المرضى إصابة جلدية 100% بينما تطور عند 40% منهم إصابة حشوية.

إن إنذار هذا الداء جيد نسبياً عندما يكون محدود بالجلد أو بالأغشية المخاطية حيث يلاحظ تحسن عند أكثر من 60% م المرضى، ولكنه سيء بالإصابة الحشوية حيث توفي مريضان أي 50% من مرضى الشكل الحشوي.

ذكرت بالتفصيل استبطابات القيصرية تطرقت إلى جنس المولود وأوزان الأجنة، كما تناولت التشوهات الخلقية وحالات المشيمة المرضية. وأخيراً أحصيت الأذنيات الوليدية والوفيات ما حول الولادة والمرضاة الولدية وأجريت مقارنة بين طريقتي الولادة. وخلصت إلى وضع التوصيات بناءً على النتائج والاستنتاجات.

ويلاحظ أن المهم في تدبير المجيء المقعدي هو الخبرة والنظرة السريرية الناقية مع مراعاة تقييم وضع الأم والجنين بشكل جيد أثناء المخاض والاستعداد التام للولادة الطبيعية أو القيصرية. فالمهم عدم المجازفة بالتوليد الطبيعي حين تدل على وجود عوامل خطورة كذلك عدم التسرع بإجراء قيصرية عندما تكون الولادة الطبيعية آمنة وممكنة.

التهاب البنكرياس الحاد

Acute Pancreatitis

فاتن ماضي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. مازن مصري زاده

إن الهدف من البحث هو إيجاد النظام الإنذاري الأمثل في مشفى المواساة للتعرف الباكر على هؤلاء المرضى ذوي الخطورة العالية الداعمة للهجومية في العناية المشددة وذلك من خلال دراسة راجعة Retrospective لسجلات المرضى المراجعين لمستشفى المواساة بين عامي 1994-2000م. من بين البرامج التي وضعت لتقييم الإنذار قمنا بمقارنة نظام القصور الجهازى المتعدد Mosf مع نظام رانسون Ranson ونظام الإنذار

المبسط S.P.C هو الأكثر حساسية في تقييم شدة التهاب البنكرياس الحادة تلاه نظام رانسون ثم Mofs.

كما قمنا بدراسة متغيرات (العمر – الجنس – العادات) وعلاقة كل منها بتطور المرض نحو الاختلاط والوفاة من أجل منحها قيمة إنذارية تفيد كمعامل باكرة في التنبؤ السريري بتطور المرض، إضافة للبرامج السابقة.

تدبير آفات الثدي السليمة

Management Of The Benign Conditions Of The Breast

أيمن هلال. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. فريز صفق

تهدف هذه الدراسة إلى توجيه الانتباه إلى بعض الممارسات غير الصحيحة في تدبير آفات الثدي السليمة

الحديث عن الطرق المثلى لمعالجة كل حالة مع تدعيم البحث بدراسة إحصائية لعينة من 178 مريض راجعوا مشفى المواساة بقصة صفن حاد خلال الأعوام 98-99-2000.

استعمل في البحث طريقة الجدولة والتبويب مستقيدين من إمكانيات الحاسوب في ذلك. واعتمد في وضع الجداول على أكثر من نموذج أفقي وعمودي. إضافة لبعض الصور الإيضاحية المرفقة.

بالنسبة للنتائج كان أهمها: يعتبر التهاب الخصية والبربخ السبب الأكثر شيوعاً للصفن الحاد. كما يعتبر انتقال الخصية السبب الأخطر والأكثر غموضاً في وضع التشخيص والذي يتطلب الحذر والدقة.

الاستنتاجات

- التركيز على أهمية استعمال الحاسوب في الأرشفة.
- اعتبار كل حالة صفن حاد انتقال خصية حتى يثبت العكس.
- ضرورة استعمال إيكو الدوبلر في أنظمة الإسعاف.
- الرجوع في كل حالة صفن حاد لأخصائي الجراحة البولية.

عوامل خطر ذات الرئة الوخيمة عند الأطفال ما قبل سن المدرسة (دراسة في مستشفى الأطفال)

Risk Factors Of Severe Pneumonia In Preschool Children: A Study In The Teaching Pediatric Hospital

ليليان ديراني. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. هيام بشور

هدف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تساهم في تفاقم الخمج التنفسي العلوي وتحوله إلى خمج سفلي حاد ووخيم (ذات رئة وخيمة) وذلك عند الأطفال دون الخامسة من العمر.

الطرائق: تم اعتماد دراسة الشاهد والحالة حيث طبقت في مشفى الأطفال في مدينة دمشق، وذلك باستخدام استبيان خاص بالدراسة.

النتائج: بلغ عدد أفراد الدراسة 605 طفل توزعوا بين 309 حالة 296 شهاده. وقد تبين بالتحليل عديد المتغيرات أن العوامل المنبئة بحدوث حالة من ذات الرئة الوخيمة هي: عدم تلقي اللقاح الثلاثي (الجرعة الثالثة) في العمر المناسب له، نقص الوزن بالنسبة للعمر لأقل من 2-

دراسة مقارنة بين المباشرة التخديرية المفردة بالميدازولام والمباشرة المشاركة بالميدازولام مع البروبوفول

Comparing Sutdy Between The Anaesthetic Uni-Induction With Midazolam And Co-Induction With Midazolam And Propofol

سليم بدري. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. أمير درويش

المباشرة بالميدازولام مفيدة، لكن صعوبة التنبيب بالجرعة عند المسنين ومرضى عدم الثبات الهيموديناميكي يجعله غير مرغوب كدواء وحيد للمباشرة وجابت المشاركة: ميدازولام- بروفول - فنتانيل لتلغي هذه المحاذير وتحقق أفضل الظروف للمباشرة التخديرية: السرعة - العمق التخديري- التوازن الممتاز بين التأثيرات الجانبية والمرغوبة مع كلفة أقل وسرعة صحو.

لقد راعت الدراسة العوامل الثلاثة التالية كتقنية في البحث:

الترتيب في الإعطاء: ميدازولام ثم فنتانيل ثم بروفول بفواصل دقيقة بين كل دواء وآخر وبجرعات مضبوطة جيداً

من جهة أخرى تمت المباشرة على حالات أخرى بالميدازولام فقط بجرعات مباشرة تراوحت بين 0.1-0.4 ملغ/كغ.

أفضل النتائج كانت بالمشاركة مقارنة بالإعطاء المفرد، فالجرعة انخفضت إلى النصف - استقرار هيموديناميكي ممتاز مع عمق تخديري كافٍ لتطبيق الماسك الحنجري دون ارتكاسي في حين احتاج التنبيب الرغامي لإعطاء مرخي عضلي.

لقد كانت المباشرة عند الأصحاء دون سوابق مرضية أفضل وأعمار الشباب خاصة الإناث إضافة للمسنين حققت نتائج ممتازة مع استقرار جيد عدم الثبات الهيموديناميكي فنسبة حدوث ارتكاس لتطبيق الماسك كانت أقل بالنسبة: 1% بينما للتنبيب دون إرخاء عالية ≤30% أما مع الإرخاء فلم تتجاوز 2.5%.

الصفن الحاد

Acute Scrotum

عمار حسن الرياحي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. سمير الغزاوي

الهدف من الرسالة تبيان أشيع الأسباب المحدثة للصفن الحاد وإظهار أدق الوسائل المستعملة في التشخيص مع

نزار أبا زيد. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عصام أنجب

تشكل الأمينو غليكوزيدات مجموعة دوائية تنتشر مع بعضها بمجموعة من الخواص الكيميائية والدوائية والسمية وهي الداعمة الحالية لمعالجة الأخماج الخطيرة بالعصيات سلبية الغرام.

والهدف من الدراسة هو معرفة نمط حساسية هذه لثلاثة أنواع من الأمينو غليكوزيدات وهي الأميكاسين، الجنتاميسين، التوبراميسين. مع إجراء ربط النتائج المخبرية والصورة السريرية للمرضى المعالجين بهذا الصنف من الأدوية.

بلغ عدد زروع الدم الإيجابية بالعصيات سلبية الغرام خلال عام كامل امتد ما بين 1999/10/1 إلى 2000/10/1 (298) زرع إيجابي أكثر ما عزلت في شعبة الحواضن والوليد، وشكلت الكلبسيلا Klebsella Pneumonia النسبة الأكبر حوالي 42% وتمت دراسة الجراثيم الأكثر شيوعاً وهي: الكلبسيلا، الأنتيروباكتز، الإشريشيا الكولونية، الزوائف الزنجارية، الأسينيتوباكتر.

وكانت نسب مقاومتها على الأميكاسين حسب الترتيب كما يلي: 65%، 30.4%، 8.8%، 59.6%، 44%، ونسب مقاومتها على الجنتاميسين كما يلي: 85%، 50%، 47.5%، 25.8%، 72%، ونسب مقاومتها على التوبراميسين كما يلي: 88%، 50%، 55.8%، 22.58%، 8%.

وبلاحظ أن جميع النسب هي أعلى بشكل واضح مقارنة بالدراسات العالمية المماثلة. كما أنها في ازدياد عموماً نسبة لدراسة سابقة مجرأة في مشفى الأطفال من 5 سنوات.

وبشكل عام هناك توافق ما بين الحساسية المخبرية للصادات والطور السريري للمرضى المعالجين بهذه الصادات. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار عوامل دفاع الثوي وعامل الخطورة المرافقة (الخداج، تثبيط النقي المرافق لأمراض الدم والعلاج الكيميائي).

خلص البحث إلى توصيات عديدة أهمها الاستمرار باستعمال الأميكاسين بدلاً الجنتاميسين في المعالجة البدنية لمخج الدم. وضرورة إجراء دراسات أخرى حول نسب المقاومة لسليبيات الغرام تجاه الصادات الأخرى مثل سيفالوسبورينات الجيل الثالث.

استخدام الأوكسجين في الداخلية والتخدير

Using Of Oxygen In Internal
Medicine And Anesthesia

أنحرف معياري، وجود آفة قلب ولادية مرافقة، وجود قبول سابق للطفل في المشفى بقصة ذات رئة، تأخر الأهل في مراجعة المشفى بعد ظهور الأعراض بمدة تتجاوز اليومين، قدرة الأم على التعرف على أعراض وعلامات المرض الوخيم بشكل صحيح، ازدياد عدد السجائر المدخنة في المنزل عن 10 سيجارة/اليوم.

الاستنتاجات: توجيه برامج التنقيف الصحي نحو حث الأهالي على الالتزام ببرنامج التلقيح الوطني وإرشادهم على سبل التغذية الصحيحة للطفل تفادياً لسوء التغذية بالإضافة إلى زيادة وعي الأهالي لأعراض وعلامات المرض وضرورة مراجعة المشفى في الوقت المناسب.

انقطاع الطمث

Amenorrher

وردي رشابكية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ.د. نجات صنيح

إن الهدف من البحث إجراء دراسة إحصائية للمريضات المراجعات في مشفى الأسد الجامعي، واللاتي يعانين من انقطاع الطمث كشكوى رئيسية (وذلك بعد نفى الحمل لديهن) وذلك من خلال دراسة راجعة Retro Spective لسجلات المريضات المراجعات لمشفى الأسد الجامعي بين عامي 1996-2001 ونظراً لكون انقطاع الطمث شكوى كثيرة الشيوخ كمسوغ لمراجعة العيادات الطبية ومن ثم المشافي، كان من الضروري حصر المسببات وتصنيف طرق التوجه الأمثل لتشخيصها كي لا يتم إغفال حالة يجب الإسراع بتشخيصها وعلاجها نظراً لحساسية موضوع الطمث عند كل امرأة.

أجريت الدراسة على 120 مريضة قبلن في الشعبة الغدية في مشفى الأسد الجامعي بسبب انقطاع الطمث لديهن.

تمت دراسة أسباب انقطاع الطمث: بدنية أم ثانوية وذلك بعد دراسة مرافقاتها من أعراض أخرى، وإجراء الفحوص المخبرية والشعاعية حسب التوجه السريري البدني حيث تبين كثرة حالات انقطاع الطمث الناجمة عن المبيض عديد الكيسات، كما لوحظ وجود نسبة لا يمكن إغفالهن من حالات قصور المبيض البدني.

المقاومة على الأمينو غليكوزيدات

Resistance To Aminoglycosides

محمد الشيخ. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عبد القادر دعدو

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة استخدامات الأوكسجين في الداخلية والتخدير فتضمنت دراسة للغطاء عن الهوية الألية ودراسة سريرية لأكسجة المرضى بعد العمل الجراحي بالإضافة لدراسة نقص الأكسجة الانتشاري. بالنسبة للطرائق المستعملة فقد درس الغطاء عن التهوية الألية باستخدام المشعر السريري الذي هو عدد الحركات التنفسية مقسوماً على الحجم الجاري بالترز، كما درست مراقبة الأكسجة الشريانية بعد العمل الجراحي ونقص الأكسجة الانتشاري باستخدام مقياس الأكسجة النبضي ذي الموجتين. تبين لنا في العينة الأولى أن الغطاء يكون ناجحاً عندما تكون قيمة المشعر أقل من 105 (حركة تنفسية بالدقيقة/لتر). ووجد في العينة الثانية أن الأكسجة الشريانية تبقى $\leq 89\%$ طيلة النصف ساعة لدى مرضى ليسوا مرضى جراحة صدر ولا بطن علوي ووجد في دراسة نقص الأكسجة الانتشاري أن الأكسجة الشريانية تهبط عند إبقاء المريض على الهواء الجوي بعد إيقاف الغازات التخديرية معاً (الأكسجين والنايتروس أوكساید). استنتجنا من البحث أنه يمكن الاعتماد في الغطاء عن التهوية الألية على المشعر السريري وأن لاضرورة لمراقبة أكسجة المرضى الذين ليسوا بمرضى جراحة صدر ولا بطن علوي بعد أكسجتهم مدة خمس دقائق من الصحو، كما تبين لنا ضرورة أكسجة المرضى بعد إغلاق غاز النايتروس أكسيد في نهاية العمل الجراحي.

تأثيرات الببتيد المعوي الفعال بالأوعية

والسترونيديات (الألدوسترون)

والأنجوتاسين وأحد الإنكفاليينات في حركة الماء والشوارد في القولون

The Effects Of Vip, Aldosterone
Angiotensin&Dama In
Water&Ion Transport

مناف المرح. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عبد الرزاق الشيخ عيسى

هناك العديد من الدراسات العالمية التي تناولت دراسة الوسائط العصبية المختلفة والسترونيديات وبعض الهرمونات الأخرى على أجزاء مختلفة من الأنبوب الهضمي وبسبب صعوبة الوصول إلى العروة الصاعدة من القولون في الأوساط الحية لدى الإنسان أو الحيوان لذا كانت الدراسات على هذه القطعة من الأنبوب الهضمي قليلة وبسبب أهمية في الامتصاص النهائي

للماء والشوارد قمنا بدراسة باستخدام الجرذان الذكور كحيوان تجربة وخدر باستخدام البنثوباربيتال ثم عزل الوريد الوداجي وركب عليه قنطار وحقن فيه المواد المدروسة كما تم فتح البطن ثم عزل القولون الصاعد وحقنه بمحلول معبر التركيب ثم بعد ساعة من حقن المادة المراد دراسة تأثيرها تم استعادة المحلول وقياس حجمه وعبار الشوارد فيه فبتبين أن لكل من الـ Dama والأنجوتاسين تأثيراً معزراً لامتصاص الماء والشوارد على عكس تأثير الـ Vip وهذا يوافق الدراسات المجراة على أجزاء أخرى من الأنبوب الهضمي.

تنظير الرحم

Hysteroscopy

سامر محمد العلان. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. جميل طالب

تم إجراء تنظير باطن الرحم في مشفى دار التوليد وأمراض النساء الجامعي- جامعة دمشق في الفترة الواقعة بين 1/1/1998 وحتى 31/12/1999 الهدف من الدراسة تشخيص بعض حالات العقم وإجراء بعض الأعمال الجراحية التنظيرية وبيان دور تنظير الرحم في علاج النزف الرحمي المعند.

بلغ عدد الحالات المجراة 110 حالة وكانت الاستجابات كالتالي: عدد حالات عقم 85 حالة بنسبة 77.27%، 55 حالة عقم بدني، 30 حالة عقم ثانوي، 8 حالات ضياع خيط لولب بنسبة 7.27%، 6 حالات إسقاطات متكررة

بنسبة 5.45%، مرجلات رحم 3 حالات أي بنسبة 2.72%، حالات متلازمة أشلمان بنسبة 1.81%، حالة واحدة ورم ليفي بنسبة 0.90%.

المجيء المقعدي

Breech Presentation

بولانت طحان. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عماد الدين تنوخ

شملت الدراسة حالات الولادة للأجنة المقعدية بين 1999/7/1 وحتى 2001/7/1 وبلغ عدد الولادات المقعدية 1273 ولادة بنسبة 4.13% وشكلت الخروسات بنسبة 34% والولادات 66% وأظهرت الدراسة أن 7.85% من مجموع الولادات المقعدية لديهم سوابق ولادة أجنة مقعدية، كما بلغت نسبة القيصرية 67.16% ونسبة الولادات المهبلية 32.83% وبلغت نسبة الأجنة الإناث 58.52% من مجموع الولادات المقعدية ونسبة الأجنة الذكور بلغت 41.39% كما لم تسجل حالات فرط انبساط الرأس بسبب عدم استخدام التصوير

خالد ابراهيم النجلات .
كلية الطب . جامعة دمشق
إشراف: أ. د. نوفل حجة.

الهدف: كان الهدف في هذا البحث العلمي دراسة أنواع فقر الدم عند مرضى التشمع الكبدي وطرق الوقاية والتدبير.

الطرائق: تمت الدراسة على 130 مريض راجعوا مشفى المواساة والأسد الجامعي مشخص لهم تشمع كبدي، حيث تم تحديد نوع فقر الدم عندهم. النتائج لوحظ شيوع الإصابة من نوع فقر الدم في الأمراض المزمنة عند مرضى التشمع الكبدي مع انخفاض نسبة فقر الدم كبير الكريات عند مرضى التشمع الكبدي.

كما لوحظ أن علاج فقر الدم عند هؤلاء المرضى قد حسن نوعية الحياة لكنه لم يحسن الإنذار على المدى البعيد.

الاستنتاجات: يمكن تخفيف العبء والخسارة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض وذلك من خلال:

- التشخيص الباكر للمرض.
- تحديد نوع الفاقدة الدموية.
- تحديد سبل الوقاية من فقر الدم عند هؤلاء المرضى.
- التدبير الجيد لفقر الدم.
- تنقيف المريض.

الإصابة الكلوية في سياق الداء النشواني

Renal Disease In Amyloidosis

أيمن حج أسعد. كلية الطب . جامعة دمشق
إشراف: أ. د. عنان الصباغ

الهدف: دراسة نوعية الإصابة الكلوية في سياق الداء النشواني.

الطرائق: تم إختبار 32 مريض من قسم التشريح المرضي في مشفى الأسد الجامعي مشخص لهم داء نشواني مثبت بالخزعة بعد تلويحها بأحمر الكونغو.

تم مراجعة أضيابير هؤلاء المرضى والتعرف على نوعيات الإصابة الكلوية في سياق الإصابة بالداء النشواني.

النتائج: لوحظ وجود القصور الكلوي بنسبة 55% حيث أن كان معظم المرضى يراجع بهذه الشكاية.

- لوحظ وجود الإصابة بالبييلة الدموية بنسبة 25%.
- الإصابة الأنبوبية شكلت ما نسبته 15%.

الشعاعي حصل انسداد السرر بنسبة 1.49% من مجموع الولادات المقعدية وكانت نسبة التشوهات الجنينية حوالي 6.44% بينما شكلت المشيمة المرتكزة ارتكازاً مبعباً بنسبة 1.17% وحدث انفكاك المشيمة بنسبة 1.33% وأهم ما يجب اتباعه هنا هو المراقبة وإجراء كافة الاستقصاءات المطلوبة وعدم التدخل المبكر إلا حين الضرورة وعدم التسرع بإجراء القيصرية إلا باستطابها واعتبار الخبرة والنظرة السريرية أو أن لا غنى عنهما في التدبير الناجح.

فرط نشاط جارات الدرق عند مرضى القصور الكلوي المزمن قبل وبعد الزرع

Renal Secondary
Uyperparathroidism
Before And After Renal
Transplantation

زكريا محمد حسن. كلية الطب . جامعة دمشق
إشراف: أ. د. محمد عماد عثمان

إن الهدف من الدراسة هو تحديد نسبة فرط نشاط جارات الدرق الثانوي للقصور الكلوي المزمن ومراقبة تراجع فرط نشاط جارات الدرق الثانوي بعد إجراء زرع كلوي لدى مرضى القصور الكلوي المزمن.

تضمنت الدراسة 35 مريضاً لديهم قصور كلوي مزمن راجعوا شعبة زرع الكلية في مشفى المواساة خلال عام 2000-2001، حيث قام الباحث بدراسة هؤلاء المرضى من حيث استعراض قصصهم المرضية وإجراء الفحوص السريرية المناسبة ودراسة الفحوص المخبرية التي أجريت لهم، ثم قام الباحث بإجراء مسح لفرط نشاط جارات الدرق لدى هؤلاء المرضى بإجراء معايير دموية للـ PTH والكالسسيوم والفوسفور والفوسفاتاز القلوية ومن خلال ذلك قام بتحديد تواتر حدوث فرط نشاط جارات الدرق الثانوي الكلوي ومن ثم تم إعادة المعايير الدموية السابقة بعد الزرع الكلوي لدى هؤلاء المرضى ومقارنتها مع القيم قبل الزرع الكلوي.

وتبين من خلال استعراض النتائج أن فرط نشاط جارات الدرق الثانوي الكلوي قد تراجع بنسبة كبيرة وبقيت نسبة قليلة من المرضى بقيت لديهم الغدد جارات الدرق مفرطة النشاط وهؤلاء المرضى بحاجة للمتابعة.

فقر الدم في سياق التشمع الكبدي

Anemia In Cirrhosis

- لوحظ وجود النفروز بنسبة 45% ومعظم الشكايات كانت تتمثل بحدوث تورم الأطراف السفلية.
- البيئة التقهه تواجبت بنسبة 1%.
- الإستنتاجات: لوحظ بالدراسة أن معظم الحالات المكتشفة كانت تراجع بشكاية كلوية وأكثرها شيوعاً هي الوذمات والقصور الكلوي.
- إن الإسهالات كانت من الشكايات الهامة التي راجع بها المرضى الشعبة الهضمية.
- لم يلاحظ وجود إصابة عصبية ربما بسبب عدم التفكير بالداء النشواني كسبب مهم للإصابة العصبية.

استئصال الرحم الولادي

Obstetrical Hysterectomy

صلاح شريف سليم كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. مروان زيات

هدف البحث: دراسة حالات استئصال الرحم الولادي في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي، للتعرف على الأسباب والظروف المؤدية له من جهة، والمضاعفات الحادثة أثناء وبعد الجراحة، وكيفية الوقاية منها من جهة أخرى.

الطرائق المستخدمة في البحث: أجريت دراسة تحليلية راجعة على 82 حالة استئصال رحم ولادي تضمنت دراسة لقصة الحمل الحالي والسوابق التوليدية والجراحية، وعوامل الخطورة الموجودة لدى المريضات، وسير المخاض والولادة وما رافق ذلك من مضاعفات أدت إلى الاستئصال، وأجريت مقارنة بين التقنيات المستخدمة وما تلاها من مراضة ووفيات.

النتائج

- 1- بينت الدراسة أن أنسبة حدوث استئصال الرحم الولادي هي 938/1 ولادة.
- 2- توزعت استطبابات استئصال الرحم على النحو التالي: مشيمة ملتحمه 40.24%، عطلاة رحمية 34.15%، تمزق رحم 19.51%، امتداد شق قيصرية 366%، نتيج رحم 2.44%.
- 3- استخدمت تقنية الاستئصال التام في 43 حالة أي بنسبة 52.4%، وتقنية الاستئصال تحت التام في 39 حالة أي بنسبة 47.6%.
- 4- أشيع المضاعفات أثناء العمل الجراحي: الصدمة النزفية 40.2%، واعتلال التخثر المنتشر داخل الأوعية 26.8%، والأذيات البولية 4.9%.
- 5- أشيع المضاعفات بعد الجراحة: فقر الدم 67.1%، والحمى 29.3%، والخزول المعوي 14.6%.

- 6- بلغ عدد الوفيات 9 حالات، بنسبة 10.97% من حالات استئصال الرحم الولادي، وبنسبة 100.000/11.7 ولادة.
- 7- الاستنتاجات: 1- ضرورة متابعة نشر الوعي الصحي بين النساء الحوامل من جهة، ومن يقوم بتوليدهن (دايات، قابلات، أطباء) من جهة أخرى من أجل كشف المريضات عالياً الخطورة لتوليدهن في المشفى، ومراقبتهم جيداً بعد الولادة.
- 3- ضرورة إنشاء مصرف للدم في المشفى، وتجهيز المخبر الإسعافي بالمواد اللازمة مما يوفر الوقت والفرصة الكافين للمعالجة والتدبير السريعين.

تخدير المرضى البدنيين

Anesthesia Of Obese Patients

نضال خلف. كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. هند الدغلي

الهدف من الدراسة هو بيان ما يتميز به تخدير المرضى البدنيين من خصوصية ناجمة عن تأثيرات البدانة.

أجريت الدراسة على 100 مريض في مشافي الجامعة (بأعمار مختلفة) ممن خضعوا للجراحة البطنية وذلك من خلال دراسة وتقييم المرضى قبل العمل الجراحي ودراسة طرائق التدبير التخديري العام والناحي وأخيراً أهمية المراقبة والعناية بعد العمل الجراحي.

وتم تسجيل النتائج على جداول خاصة أعدت لهذا البحث حيث تمت مقارنتها بدراسات عالمية مشابهة ثم وضعت نتائج هذا البحث والتوصيات من أجل الحصول على أفضل النتائج عند التخدير المرضى البدنيين.

التشخيص الشعاعي لأورام الجيوب الأنفية

باستخدام التصوير الطبقي المحوري المحسوب

Assesment Of Paranasal Sinuses Tumors By Computer Tomography

علاء الدين الحاج حمد.

كلية الطب، جامعة دمشق

إشراف: محمد بسام الصواف

هدف الدراسة: تقييم المظاهر الشعاعية لمختلف أورام الجيوب والتميز بين مظاهر السلامة والخباثة على الصورة الطبقيّة إضافة لتحديد مدى فائدة التصوير الطبقي في تحري الغزو الورمي للبنى المجاورة.

الطرائق

تتضمن طرائق الدراسة الصور المحورية

لمختلف حالات أورام الجيوب المصادفة لدى مرضى الشعبة الأذنية إضافة إلى محاولة الرجوع إلى الأرشيف للحصول على صور الحالات القديمة إن وجدت.

كما تم الاستعانة بوحدة الطبقي المحوري في شعبة الأشعة لأخذ نسخ عن الصور الطبقيّة الحاسوبية على موجودات إيجابية لمرضى لديهم شك بورم في أحد الجيوب.

النتائج

أظهرت الدراسة أن التصوير الطبقي وسيلة استقصائية جيدة لتقييم أورام الجيوب إذ بالإمكان من خلالها تحديد حواف الورم بشكل جيد إضافة لتحديد مدى الغزو للبنى المجاورة كما أن هناك بعض العلامات الموجهة لسلامة الأفة أو خبائثتها فالتكلسات مثلاً هي في الغالب علامة سلامة والارتكاس العظمي من علامات الخبائث.

الاستنتاجات

رغم فائدة التصوير الطبقي الكبيرة والتي لا غنى عنها في تقييم أورام الجيوب فإنه في كثير من الأحيان يصعب تحديد طبيعة الورم إلا بعد اللجوء للخزعة.

من الملاحظ أن الزيارة الألى لكثير من مرضى الجيوب كانت لطبيب الأسنان وكان الاستقصاء الأول المطلوب صورة بانورامية للفكين، لذا يجب التأكيد على ضرورة التدقيق في ظل الجيبين الفكبين الظاهرين في الصورة البانورامية واللجوء للتصوير الطبقي في حال الشك بوجود أفة جيبية.

دراسة دور تلوين المحفظة الأمامية بزرقة التريبان أثناء استئصال البلورة بالأمواج فوق الصوتية

Trypan Blue Capsule Staining In Phacoemulsification

سميد بدر كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. أحمد باسم البريدي

الهدف من الدراسة: بيان دور زرقّة التريبان في تسهيل استئصال البلورة بالأمواج فوق الصوتية، خاصة عند المبتدئين بتعليم هذه التقنية لاستخراج الساد، ودراسة تأثير مادة زرقّة التريبان على العين.

المواد والطرائق: دراسة تقديمية Prospective Study شملت 30 مريض، 60 عيناً. وتم تطبيق المادة على 30 عين مصابة بالساد ومقارنتها مع 30 عين أخرى

لم تطبق عليها المادة. تمت مراقبة المرضى بفواصل أسبوعية لمدة 8 أسابيع ثم بعد 12 أسبوع من العمل الجراحي. مع مراقبة: سماكة القرنية المركزية والضغط داخل المقلة والإرتكاس الالتهابي. تم اختيار العينة من مرضى لديهم صلابة نواة +1، +2، وتم استخدام سائل الإرواء نفسه سيروم فيزيولوجي، ونفس مادة Viscoelastic (1% صوديوم هيبالورينات)، وتم إجراء العمل الجراحي من خلال شق قرني 3.2 ملم وزرع عدسة خاصة أعدت لهذا البحث ثم وضعت النتائج والتوصيات.

تدبير أورام الثدي الصغيرة

The Management Of Small Breast Tumors

خليل سلطون. كلية الطب. جامعة دمشق.

إشراف: أ. د. أحمد أبو قاسم

أصبحت الجراحة المحافظة لسرطان الثدي إجراء روتينياً في البلدان المتطورة. لقد هدفت هذه الدراسة إلى رصد هذه الجراحة في بلدنا، حيث لا تزال تحبو، فقامت بالرجوع إلى سجلات المريضات بسرطان الثدي اللواتي راجعن مشافي وزارة التعليم العالي (مشفى الأسد الجامعي، مشفى المواساة، مركز الطب النووي) خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 - 2000. حيث درست مفصلاً هذه الحالات والمقاربات العلاجية لها من جراحة جذرية أو محافظة، ثم قمت بدراسة كل مقاربة علاجية من حيث تسبب القيحات والوفيات والنكس والمضاعفات بعد العمل الجراحي.

لقد أظهرت الدراسة نتائج طبية للجراحة المحافظة من حيث نسبة البقاء والفترة الخالية من أعراض النكس الموضوعي بعد الجراحة، وخلصت إلى ضرورة اعتماد هذه الجراحة بشكل أوسع لدينا.

العلاج المحافظ على المعصرة لسرطان المستقيم

Sphincter-Saveing Management Of Rectal Cancer

يوسف الأعرش. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. أحمد أبو قاسم

لقد تناولت موضوع سرطان المستقيم على اعتباره من السرطانات الشائعة ويشكل مع سرطان الكولون حوالي 15 % من سرطانات الجسم كافة وقد قسمت الدراسة لقسمين: دراسة نظرية تضمنت لمحة تشريحية وفيزيولوجية عن المستقيم ثم تطرقت لأورام المستقيم

لهذه الجراثيم على السيفالوسبورينات الجيل الثالث إذا قورنت بدراسة سابقة أجريت في مشفى الأطفال 1995، أو بدراسة أمريكية أجريت عام 1998.

فأبدت الكليسيلا مقاومة بلغت 76.22% تجاه السيفوتاكسيم مقارنة بـ 17% في الدراسة السابقة 12% في الدراسة الأمريكية.

كما أبدت مقاومة بنسبة 83.6% تجاه السيفترايكون بينما في الدراسة الأمريكية 9% وتجاه السفتازيديم 83.6% مقارنة بـ 13% في الدراسة الأمريكية.

أم الانتيروباكتر فكانت نسبة المقاومة تجاه السيفوتاكسيم 58.69% مقارنة بـ 37% في كل من الدراسة السابقة والدراسة الأمريكية، ونسبة المقاومة تجاه السيفترايكون 54.34% مقابل 39% في الدراسة الأمريكية وتجاه السفتازيديم 58.69% مقابل 42% في الدراسة الأمريكية.

والإيسرشياكولي أبدت مقاومة تجاه السيفوتاكسيم 38.23% مقابل 21% في الدراسة السابقة و 12% في الدراسة الأمريكية، وتجاه السيفترايكون 50% مقابل 1% في الدراسة الأمريكية، تجاه السفتازيديم 44.11% مقابل 3% في الدراسة الأمريكية وبلغت مقارنة العصيات الزرق تجاه السيفوتاكسيم 35.48% مقابل 73% في الدراسة الأمريكية، أ/ا السفتازيديم فكانت نسبة المقاومة 35.48% مقابل 12% في الدراسة الأمريكية.

وأبدت معظم الجراثيم المكتسبة ضمن المستشفى مقاومة أكبر من الجراثيم المكتسبة خارج المستشفى كما أظهرت السيفوتاكسيم فعالية أكبر للجراثيم سلبية الغرام عدا العصيات الزرق حيث أبدى السفتازيديم فاعلية أكبر ضدها.

خثار البطين الأيسر في سياق الإحتشاء الحاد

Left Ventricular Thrombus In Myocardial Infarction

جهاد اللحام. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. حسام الدين شبلي

الهدف من الدراسة: تحديد العوامل المؤهبة لختار البطين الأيسر في سياق الإحتشاء الحاد وسبل الوقاية من حدوثه تقسم الدراسة إلى قسمين: الدراسة النظرية والدراسة العملية.

مقدمة: يعتبر إحتشاء العضلة القلبية مشكلة صحية كبيرة الأهمية في العالم المتطور حيث يعاني مليون ونصف المليون مريض في الولايات المتحدة سنوياً من الإحتشاء ويثبت التشخيص 30-50% من المرضى. ولقد حدث في الآونة الأخيرة انخفاض في نسبة الإحتشاء بسبب

السلمية والخبیثة والعوامل المؤهبة لسرطان وتقللت استعمال وركزت على العلاج المحافظ على المعصرة واستخدام الستابلر في المفاعات التي قللت عمليات البتر البطني العجاني، وناقشت أيضاً المعالجة المتممة لسرطان المستقيم من أشعة معالجة كيماوية وتطرفت لموضوعات خاصة عن سرطان المستقيم كسرطان المستقيم الساد والمنقب.

أما الدراسة العملية فقد شملت 167 حالة سرطان مستقيم درست من حيث التوزع العمري والتوزع الجنسي ومقارنة بين الحالات القابلة للاستئصال والحالات غير القابلة للاستئصال، والعمليات المجرة ومقارنة العمليات الباترة المحافظة على المعصرات، وناقشت المضاعفات، ثم ختم البحث باستخلاص النتائج والتوصيات الملزمة.

رضوض البطن الكليّة

Abdominal Blunt Trauma

إياد محمد محسن. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. هایل حميد

الهدف من هذه الدراسة إجراء مسح إحصائي لحالات الرضوض البطنية الكليّة التي تراجع قسم الإسعاف بمشفي المواساة وعلاقة نوع الإصابة البطنية الحاصلة ونسبة مصداقية الطرق التشخيصية المستعملة في كشف وجود الأنزفة. وقد تم إحصاء 263 حالة رض بطني كليل وكانت أكثر الأعضاء تأدياً الطحال ثم الكبد كما كان غسيل البيريتوان أفضل الوسائل التشخيصية المتوفرة وكانت معظم الأذيات بين المرضى في سن الشباب أما أكثر الأسباب فكانت حوادث السير تليها حوادث العمل.

المقاومة على السيفالوسبورينات الجيل الثالث

Resistanace Of Third Generation Cephalosporines

محمد رامي الترك. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عصام أنجق

تقوم السيفالوسبورينات الجيل الثالث وهي صادات B لاكتام بنيتي تركيب جدار الخلية الجرثومية بالتداخل في إنزيمات الترابط الترانسبيتيداز التي تقوم بتركيب طبقة البينيدوغليكان القاسي في الجرثوم.

وبدراسة إحصائية لزروعات الدم بالجراثيم سلبية الغرام تمت في مستشفى الأطفال الجامعي ما بين 1999/10/1 وحتى 2000/10/1 أظهرت مقاومة عالية

1- إضطراب النظم- وأهمها

- خوراج الإنقباض البطيئة.
- التسرع والرجفان البطيئي.
- النظم البطيئي الذاتي المتسارع
- اضطرابات النظم فوق البطيئية

المعالجة الكيماوية لأمراض الطبقة المغذية

La Chimiotherapie Des Maladies Trophoblastiques

فراس محمد ياسين قصاب.

كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صلاح شبيخة

الدراسة المجرة هي دراسة راجعة لمدة عشر سنوات لمرضى شعبة أمراض الطبقة المغذية في مستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي.

بلغ عدد مريضات أمراض الطبقة المغذية 1079 مريضة خلال عشر سنوات . كانت نسبة التحول للخباثة 18.88 % من حالات الرحي المدبرة داخل المستشفى و 54.70 % من حالات الرحي المدبرة خارج المستشفى. كان عدد حالات خباثة المعالجة كيماويا 365 حالة، وبنسبة 33.83 % من مريضات شعبة أمراض الطبقة المغذية.

حدثت الهدأة عند 87.67 % من المريضات، وحدثت المقاومة عند 15.89 % منهن، أما المراجعة فحدثت عند 4.11 % من المريضات.

أشيع التأثيرات الجانبية للمعالجة الكيماوية كانت الغثيان والإقياء، والصلع، وحدث تثبيط النقي عند 15.34 % من مريضات المعالجة الكيماوية.

سمح لـ 171 مريضة متابعة في عيادة الرحي بالحمل، وحدثت عند 57.31 % من هؤلاء المريضات، بينما حدث إجهاض عفوي في الثلث الأول من الحمل عند 3.01 % من المريضات.

تدبير آلام أسفل الظهر

Low Back Pain Management

إيمان عبد الهادي القصاص.

كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد علي أرناؤوط

هدف الدراسة هو التعرف على أهم أسباب آلام أسفل الظهر، وطرق تدبيرها سواء بالمعالجة المحافظة أو الجراحية ثم مقارنة الفرق بين هاتين الطريقتين وإيضاح أفضلية العلاج المحافظ، خاصة بالحقن فوق الجافية

زيادة الوقاية من الاحتشاء الحاد إضافة لحسن التدبير وتطوره.

يحدث الاحتشاء كنتيجة للإنسداد الحاد في الجريان الإكليلي الناجم عن إنسداد خثري في الشريان الإكليلي المتضيق سابقاً بالتصلب العصيدي الذي يتطور تدريجياً. وقد ينجم الاحتشاء عن أسباب أخرى غير تصلبية عديدة.

التظاهرات السريرية

أكثر عرض يأتي به المريض هو الألم الصدري وهو أشد ألم عرفه المريض في حياته ويترافق مع القلق والتعرق والإقياء ويمكن أن يحدث الاحتشاء بدون ألم (الاحتشاء الصامت) في 15-20 % وهو أثر تواتراً مع تقدم العمر وعند مرضى السكري.

بالفحص السريري المريض متألم قلق، علامات فرط نشاط ودي (احتشاء أمامي) أو نظير ودي (احتشاء سفلي)، يلاحظ صوت رابع، صوت ثالث، خفوت أصوات القلب، إنقسام عجائبي للصوت الثاني، تسمع احتكاكات تامورية في العديد من المرضى، ترتفع درجة الحرارة 38م خلال الأسبوع الأول.

يترافق الاحتشاء الحاد مع تغيرات تخطيطية معينة ومتتابعة أولها موجة T المؤنفة يليها ترحل ST لأعلى في الاحتشاء الشامل للجدار ثم ظهور موجة Q في نفس اتجاهات انقلاب موجة T ممكن أن يكون هناك نقص في تطور موجة R في الاتجاهات الصدرية أو السفلية وأحياناً طول موجة R في الاتجاهات الأمامية دالاً على الاحتشاء الخفي. إن بقاء ترحل ST لأعلى لعدة أسابيع بعد الاحتشاء يدل على شذوذ في حركة جدار القلب أكثر مما يدل على أم دم بطينية.

ترتفع خلال الاحتشاء الحاد واسمات قلبية تساعد في تشخيص احتشاء العضلة القلبية الحاد منها CK، الميوغلوبين، LDH، Troponin وكل منها زمن بدء واستمرار وإنهاء.

يساعد في تشخيص احتشاء العضلة القلبية الحاد أيضاً الدراسة بالإيكوثاني البعد والدوبلر للعضلة القلبية وهو وسيلة تشخيصية مهمة في العديد من النواحي كتحديد موضع وحجم الاحتشاء، مضاعفاته، وحركة الجدار، كشف وجود خثار أو أم دم.

التدبير: ويقوم على ما يلي

- 1- تفرجج الألم الخنفاقي بالنتترات مع المسكنات المركزية.
 - 2- تقييم الحالة الهيموديناميكية وإصلاح الاضطراب الحادث.
 - 3- البدء بمعالجة عود الإرواء.
- مضاعفات احتشاء العضلة القلبية الحاد:
وهي عديدة جداً نذكر أهمها

يتضمن البحث لمحة تشريحية عن العين ولمحة فيزيولوجية عن العين وخاصة التركيز على الضغط داخل العين IOP لما له من أهمية كبيرة في العمليات الجراحية العينية.

ويتضمن البحث التركيز على العمليات العينية التي يتم إجراؤها تحت التخدير العام والعمليات العينية التي يتم إجراؤها تحت التخدير الموضعي وبيان مميزات ومحاسن كل نوع من أنواع التخدير ودراسة ثباتية الجملة القلبية الوعائية أثناء نوعي التخدير مع دراسة الألم بعد العمل الجراحي والوصول إلى الطريقة المثلى في تخدير العمليات العينية، وأهم الأدوية المستخدمة في التخدير العام أو التخدير الموضعي مع مراعاة الأمراض الجهازية الأخرى المرافقة لمرضى العينية ومع مراعاة أعمار مرضى الجراحة العينية حيث معظمهم يكون كبير السن أو صغير السن. كما تبين ذلك من خلال الدراسة التي أجريت في مشفى المواساة حيث تم تقسيم المرضى إلى فئتين: 50 مريض تحت التخدير العام، 50 مريض تحت التخدير الموضعي.

وهدفنا الدراسة إلى إلقاء الضوء على أفضلية نوعية التخدير بالنسبة للمريض والمخدر والجراح فكانت النتيجة أن التخدير الموضعي له ميزات وحسنات أكثر من التخدير العام.

التهاب المري الهضمي

Peptic Esophagitis

محمد نادر الضيع . كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. مازن حداد

هدف الدراسة

- إلقاء الضوء على أهمية المري الهضمي عند الأطفال كونه يمثل اختلاطاً شائعاً للقلنس المعدي المريئي.
- إجراء دراسة إحصائية تتناول الأطفال المصابين بالتهاب المري الهضمي ومدى شيعه ودراسة الأعراض المرافقة ونسب تواردها.
- كشف الثغرات العملية في مقارنة هؤلاء المرضى الأطفال والإمكانيات التشخيصية المتوفرة لدينا ومتابعة الإنذار ومدى الاستجابة على المعالجات المطبقة.
- تحديد أهم الطرق التشخيصية المتبعة في مشفى الأطفال مع التركيز على التنظير الهضمي العلوي وأخذ الخزعات المناسبة.

لمحة عن الطرائق المستخدمة في البحث

أجريت الدراسة في مشفى الأطفال – جامعة دمشق على مدى سنتي 1999-2000، حيث يتم اختبار المرضى

للمخدرات الموضعية مع السترونيدات، أو تطبيق طريقة الوخز بالإبر الصينية، أو تخضيب جذور الأعصاب. وقد توصلنا إلى النتائج التالية: إن للعلاج المحافظ الدور الأمل في معالجة ألم أسفل الظهر خاصة المزمن وإن التسكين الناحي يتفوق على العلاج الدوائي بالطريق التام من حيث قلة المضاعفات والتأثيرات الجانبية الأقل بالإضافة إلى إطالة مدة التسكين.

لذلك نوصي بالاهتمام بعبادة معالجة الألم في مشفى المواساة وتشكيل فريق لمعالجة الألم برئاسة الأستاذ الدكتور علي أرناؤوط رئيس قسم التخدير والإنعاش ومعالجة الألم في جامعة دمشق.

تدبير مرضى عمليات لوريش

Anesthesia For Leriche Surgery

سمر إسماعيل. كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد علي أرناؤوط

تمت هذه الدراسة في كل من مشفى الأسد الجامعي ومشفى المواساة، وكان الهدف منها هو دراسة تناذر لوريش وطريقة التخدير المثلى في العمليات المجرة للمرضى المصابين به، والأسس الواجب إتباعها في متابعة المرضى بعد العمل الجراحي في وحدة العناية المشددة، وذلك للإقلال من نسبة المضاعفات سواء التخديرية أو الجراحية لتحقيق نسبة عظمى لنجاح مثل هذه العمليات الكبرى.

لقد تمت الدراسة على خمسين مريضاً 50 بطريقتي التخدير العام والتخدير الناحي المشارك مع متابعة المرضى في وحدة العناية المشددة، وقد تم الحصول على النتائج في كل من الطريقتين وتصنيفها في جداول خاصة، وقد أثبت التخدير الناحي المشارك تفوقه على التخدير العام في هذا النطاق.

مقارنة التخدير العام والتخدير الموضعي

(حصار المقلة) في عمليات الجراحة العينية

Comparison Between General

Anaes The Sia And Local

Aneasthesia (Eyeball Block In Eye Surgery)

محمود الطحان . كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد علي أرناؤوط

حسب الأعراض ويتم متابعة المرضى بالوسائل التشخيصية التالية

- صورة المعدة والمري الظليلية.

- التنظير الهضمي العلوي.

أما أخذ الخزعات من المري، فيتم أخذها في حال كون التنظير طبيعياً وبعض حالات التهاب المري الهضمي درجته I.

وشملت الدراسة 120 طفلاً.

النتائج

- هناك رجحان للذكور نسبة الإناث 1:1.4
- تشخيص الأكثر توارداً عند القبول هو إقياءات للدراسة 64.8% مع ملاحظة الإقياء العرض الأول 62.5% تلاء فشل نمو 42.5%.
- فشلت الصورة الظليلية في إظهار التهاب المري الهضمي في 100%.

- أظهر التنظير حالات التهاب المري الهضمي في 85% بينما احتاجت 15% من الحالات لأجراء الخزعة.

- لوحظ وجود تأثير واضح /إحصائياً/ لنمط الإرضاع على وجود التهاب المري الهضمي وخاصة درجته 2-3

- كان هناك توافق واضح ما بين التنظير الهضمي العلوي والخزعة فيما يتعلق في التهاب المري الهضمي درجة \leq I

شكلت حالات التداخل الجراحي 10% وكان السبب الغالب هو فشل المعالجة المحافظة وكان 75%.

- إضافة مضاد حموضة لمضاد الإقياء يرفع من نسب الشفاء مع انخفاض في مدة المعالجة بمضاد الإقياء لوحده.

- نسبة الوفيات 57.5% ويعود أغلب الأسباب لسوء الحالة العامة وحالة مراقبة أخرى كخمج دم – استنشاق – ضمور دماغي.

التخدير والإعاش في الجراحة العينية

Anesthesia And Resuscitation for Ophthalmic Surgery

ريم محمود . كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. هند الدغلي

تمت هذه الدراسة في مشفى المواساة الجامعي في قسم الجراحة العينية وكان الهدف هو الحفاظ على ثبات الضغط داخل العين من خلال التحضير الدوائي، واستعمال الأدوية التي لا تأثير لها على الضغط داخل العين وتقادي المضاعفات التي قد تؤدي إلى نتائج

خطيرة، وذلك بالمراقبة الدقيقة، واتباع طرق تخدير ذات مباشرة لطيفة وصحو هادئ وذلك بتطبيق مختلف أنواع الأدوية التي لا تؤثر على الضغط داخل العين أو ذات تأثير طفيف جداً، كما تم إجراء التخدير الموضعي في بعض الحالات وأثبتت تفوقه على التخدير العام وذلك من خلال ثبات العلامات الحيوية للمريض.

وتمت دراسة بعض التدابير الخاصة بنوع العمل الجراحي مثل:

إجراء فحص العين تحت التخدير، قياس الضغط داخل العين، تخدير جراحة الحول، تخدير انسداد القناة الأنفية الدمعية، تخدير جراحة الأورام، تخدير حالات رضوض العين، تخدير حالات الزرق. تم جمع النتائج وتصنيفها في جداول خاصة مع دراسة إحصائية ملائمة.

الشعرانية

Hirsutism

فاتن صواف . كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صلاح شيخة

من خلال دراسة أجريت على مجموعة من المريضات المراجعات لمشفى دار التوليد الجامعي في دمشق بشكوى الشعرانية وتضمنت 50 مريضة، ودراسة عينة شاهد تضمنت 20 امرأة تبين أن:

متوسط قيم التستسترون لدى المريضات أعلى بحوالي ثلاث مرات منها في مجموعة الشاهد.

صدويًا أظهرت حالة واحدة في مجموعة الشاهد موجودات إيجابية بينما كان الصدى لدى 40 مريضة، لذا نؤكد على إجراء فحص التستسترون وإيكو حوض لكل المريضات الشعرانيات كإجراءين أوليين تبين أن العرض السريري الأكثر شيوعاً لدى هؤلاء المريضات هو اضطراب الطمث.

كما تبين أن هناك تناسباً طردياً بين شدة الشعرانية من جهة وبين متوسط الأكثر شيوعاً للشعرانية هو المبيض متعدد الكيسات مع ارتفاع في نسبة الأسباب الدرقية بالنسبة للدراسات العالمية الأخرى.

فرط تنسج الكظر الخلقي

Congenital Adrenal Heperplasia

عمار حسين أبو شاهين.

كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. فيصل شعبان

تنتج هذه المتلازمة عن غياب أحد الأنزيمات الخمسة المسؤولة عن تشكيل الكورتيزول من الكلولسترول في قشر الكظر.

لكل منها وسجلت نسبة إيجابية للبزلوكاينين 11.8%، مما يستدعي الحذر في تطبيق الأدوية الموضعية في مرضى الصدف.

نستنتج أن الصدف هو مرض جلدي شائع ومزمن قد تتورط في إمرأته مؤرجات بالتماس مما يستدعي القيام بدراسات تهدف

إلى تقييم إيجابية اختبار الرقعة في المرضى المصدوفين وعلاقتها بالصدف كما تهدف أيضاً إلى دراسة مؤرجات إضافية غير موجودة ضمن مجموعة المستأرجات المعيارية.

تضيق عضلة البواب الضخامي عند الرضع Infantil Hypertrophic Pyloric Stenosis (Ihps)

عبد السلام الدعاس.

كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. لينا خوري

يعتبر الإقياء من أهم الشكاوى في الأشهر الأولى للحياة والتي تستدعي مراجعة الطبيب.

أما الأسباب فهي كثيرة، ويعد IHPS أشيع سبب للإقياءات غير الصفراوية عند الرضع. ويعتمد تشخيص هذه الحالة اعتماداً على خبرة الطبيب وفطنته في أخذ قصة مرضية متقنة وإجراء فحص سريري دقيق وعادة ما يكفي ذلك لوضع التشخيص في معظم الحالات إلى وسائل تشخيصية أخرى.

وفي الحالات الباقية نلجأ إلى الوسائل الشعاعية ولا سيما الأمواج فوق الصوت من أجل وضع التشخيص الأكيد لما لهذه الطريقة من درجة عالية من الحساسية والنوعية.

ولا تزال الجراحة متمثلة بعملية رامستد هي الحل الأمثل والأكثر جودة من حيث الإنذار والنتائج والمضاعفات. ولكن لا بد من تحضير الرضيع جيداً قبل إدخاله غرفة العمليات وخاصة إصلاح التوازن الحامضي القلوي الشاردي عند وجوده وكذلك التجفاف.

لقد شملت دراستنا 64 حالة مقبولة في مشفى الأطفال – جامعة دمشق على مدى أربع سنوات 1998- 2001 وكان الإنذار النهائي ممتازاً في جميع الحالات التي تم تشخيصها وتديراً بأكراً.

المبيض متعدد الكيسات

Polycystic Ovary Syndrom

وتشكل هذه المتلازمة أحد أهم أسباب الأعضاء التناسلية المهمة لدى الإناث.

تتظاهر سريريا بأعراض ضيق الملح كالإقياء والإسهال والتجفاف والصدمة، إضافة للتشوه في الأعضاء التناسلية كالتحام الشفريين وتطول البظر لدى الإناث، وزيادة النمو الجسمي والتحام المشاش المبكر لدى الجنسين.

تتبع أهمية هذه المتلازمة من إمكانية علاجها وإمكانية التشخيص والمعالجة قبل الولادة إضافة إلى سوء الإنذار وأمكانية حدوث الوفاة في حال التأخر في التشخيص والمعالجة.

تم إجراء دراسة عملية في مشفى الأطفال على مئة حالة سريرية مشخصة فرط تنسج الكظر الخلقي هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع هذه المتلازمة في القطر وانتشارها وكيفية تشخيصها ومعالجتها والإنذار.

تفاعل الصدف تجاه المؤرجات

Psoriatic Reaction To Allergens

مايا جورج كنج . كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ. د. صالح داود

الصدف مرض جلدي مزمن يصيب 1-3% من السكان وهو ذو إمرأية مبهمة حتى الآن.

يشخص الصدف سريريا ونسجياً وأشيع مكان لتوضعه هو البوارز العظمية للوجوه الباسطة الأطراف وعلى الفروة، كما يبدي أشكال سريرية متعددة تتراوح من الصدف الشائع إلى الأحمريّة الصدفية.

توجد ذروتان لحدوث الصدف مبكرة بعمر 16-22 سنة ومتأخرة بعمر 55-60 سنة. بلغ حجم العينة المدروسة 100 مريض صدفاني تتراوح أعمارهم بين 3-69 سنة (المتوسط 31.5 سنة) وكان عدد الذكور 56 وعدد الإناث 44.

شملت العينة مجموعتين صدفيتين هما مجموعة الصدف الشائع وتألفت من 68 مريض ومرضية بمتوسط عمر 28.5 سنة ومجموعة الصدف الراجي الأخصمي وتألفت من 32 مريض ومرضية بمتوسط عمر 36.3 سنة. تم تطبيق الاختبارات الرقعية لدى المرضى لمعرفة تأثير المؤرجات بالتماس في مرض الصدف ومدى دورها المحتمل في إمرأته. كانت نسبة إيجابية اختبار الرقعة في العينة المدروسة 43% (43 مريض من أصل 100)

لم يلاحظ فرق إحصائي جوهري في نسبة الإيجابية بين مرضى الصدف الذكور والإناث وبين مرضى الصدف الشائع والصدف الراجي الأخصمي.

سجلت أعلى نسبة إيجابية لاختبار الرقعة في مادتي سلفات النيوميسين وسلفات النيكول حيث بلغت 13.5%

مها شيخ الأرض. كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ.د. بشار الكردي

تم إجراء بحث علمي بعنوان المبيض متعدد الكيسات في مشفى التوليد الجامعي بدمشق بين عامي 1999-2001.

هدف البحث: دراسة تأثير دواء الميتفورمين على مريضات PCOS سريريا ومخبريا وكذلك دراسة تأثير السيبروترون أستيات على مريضات PCOS ومقارنة نتائج تأثير الدوائين.

خطة البحث: تم تطبيق كل من الدوائين على عينتين من مريضات PCOS لمدة 6 أشهر، وتمت مقارنة التغيرات السريرية قبل وبعد العلاج (تواتر الطمث، مشعر الشعرانية، تواتر إزالة الأشعار، الوزن، مشعر الكتلة، العد، نسبة الخصر إلى الورك) وكذلك مقارنة التغيرات المخبرية (سكر الريق، اختبار تحمل السكر، Tg، التستوسترون، ونسبة LH إلى FSH) قبل وبعد العلاج.

نتائج البحث: حقق الميتفورمين تأثيراً هاماً إحصائياً في تحسين نتائج اختبار تحمل السكر وإنقاص عيار سكر الريق وإنقاص نسبة الخصر إلى الورك، دون تأثير هام على باقي المتغيرات. أما الديان فقد حقق تأثيراً هاماً إنقاص نسبة الخصر إلى الورك وإنقاص عيار التستوسترون ونسبة LH/FSH بينما سبب فرقا في زيادة TG والإساءة لاختبار تحمل السكر.

الاستنتاجات: إن الميتفورمين ينتخب عند مريضات PCOS البدنيات واللاتي يبدين مظاهر المقاومة للأنسولين. بينما ينتخب الديان عند اللاتي ليديهن تباعد طموث ومظاهر فرط أندروجن أو ارتفاع نسبة LH/FSH مع الحذر من تطبيقه في حال وجود خلل تحمل سكر أو ارتفاع عيار TG.

فائدة الدراسة الخلوية في آفات الجهاز

التنفسي

Benefit Of Cytology In Diseases Of The Respiratory Tract

أيمن المدني. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. أيمن صمون

تعتبر الدراسة الخلوية وسيلة وحيدة في تشخيص الآفات الرئوية بحيث تمتاز بأنها وسيلة بسيطة سهلة الإجراء وسريعة وقليلة الكلفة، وأمنة مما يسمح بإعادتها بسهولة مع إمكانية الحصول على عينات من أماكن ذات خطورة عالية مثل المنصف. الهدف من البحث تبيان مدى دقة ومصداقية الدراسة الخلوية في وضع تشخيص مؤكد

للآفات الرئوية المختلفة وبشكل خاص الورمية منها في مخابرننا ومقارنتها بنتائج الدراسات العلمية. تناول البحث العينات الخلوية الواردة إلى مشفى الأسد الجامعي خلال عامي 1999-2000، وبلغ مجموع العينات 985 عينة وزعت حسب الأنماط الخلوية التالية: سائل الجنب 490 عينة، الغسالة القصبية 285 عينة، الرشافة بالإبرة الدقيقة 151 عينة، الغسالة السنخية 30 عينة، سائل التامور 20 عينة، القشع 7 عينة، الفرشاة القصبية عينتان. تمت الدراسة الخلوية لتلك العينات الخلوية وقورنت نتائجها مع نتائج العينات النسيجية الموافقة كما تمت مقارنة نتائج العينات الخلوية المختلفة المجرأة لنفس المرضى. تم الحصول على مجموعة من النتائج تبين أن الدراسة الهلوية لدينا تستخدم بشكل جيد لتشخيص الآفات التنفسية، وإن دقتها التشخيصية تتعلق باختبار الطريقة حسب توضع الآفة حيث بلغت الحساسية: رشافة الإبرة الدقيقة 98%، وسائل الجنب 92%، غسالة قصبات 84%.

التهاب البلعوم بالمكورات العقدية

Streptococcal Pharyngitis

لؤي الأسدي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد محبوب جبرودي

يهدف البحث إلى دراسة حالات التهاب البلعوم بالمكورات العقدية وتحديد الملامح السريرية لهذا المرض ونسبة حدوثه بين الذكور والإناث والأطفال والبالغين وتحديد أكثر الفئات العمرية إصابة كما أجريت دراسة الأنماط العقديات المعزولة من هذه الحالات وأجري تصنيف لها من ناحية حلها للدم فبلغت نسبة العقديات الحالة للدم B حوالي 31%. كما تم إجراء عملية تثبيط للعقديات من ناحية التفاعلات الأثرية وتفاعلات تخمير السكر وبالتالي تحديد الأنماط العقدية المتهمة بإحداث التهاب البلعوم قد أستعمل لهذه الغاية طريقة Api20 Strep لشركة Biomereux العالمية كما تم دراسة تحسس هذه العقديات للصادات الحيوية حيث كانت هذه الجراثيم أكثر تحسسا للصادات التالية:

- Amoxycillin+Clavonic Acid
- السيفترياكسون Ceftriaxon
- الأموكسيسيلين Amoxycillin
- السيفلوكساسين Cefprofloxacin
- البنسلين Penicillin

محمد ياسر الداغستاني .
كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ.د. مطيع كرم

أجريت الدراسة بشكل مستقبلي لمدة عام في الفترة بين 2000/8/1 ولغاية 2001/8/1 على الأطفال حديثي الولادة المصابين بالتهاب الملتحمة في قسم الإسعاف وقسم الخديج والوليد في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، وبلغ عدد العينات المدروسة 119 عينة قسمت لمجموعتين : الأولى التهاب الملتحمة خارج المشفى 77 حالة، والثانية التهاب الملتحمة داخل المشفى 42 حالة.

النتائج

بلغت نسبة الزرور الجرثومية الإيجابية 90.7% مقابل 9.3% للزرور العقيمة وشكلت سلبية الغرام 75% والمكورات إيجابية الغرام 25%.

وأشيع هذه الجراثيم المعزولة في التهاب الملتحمة خارج المشفى هي (الزوائف المذهبة ثم العقنوديات المذهبة فكل من *Ecoli*, *Acinetobacter*) وأما داخل المشفى فالأشيع (الزوائف المذهبة ثم الكليسيلا الرئوية والعنقوديات البيضاء).

أهم العوامل المؤهبة لالتهاب الملتحمة داخل المشفى: تطبيق وسائل الإنعاش ثم الخداج والخمج الجهازى المرافق، أما في التهاب خارج المشفى فالأهم تطبيق وسائل الإنعاش بعيد الولادة، العوامل الخمجية حول الولادة وعدم تطبيق الوقاية العينية الموضعية.

أشيع التظاهرات العينية: الاحتقان الملتحمي والرمص. و (> 80 من الحالات) كانت خفيفة الدرجة ، ونسبة المضاعفات العينية و /أو الجهازية 5% من كل الحالات وحوالي 30% من الحالات متوسطة إلى شديدة الدرجة من التهاب الملتحمة.

استجابت حالات التهاب الملتحمة المعزول بشكل جيد للعلاج بالصادات الموضعية.

أما حالات الالتهاب غير المعزول (المترافق بإصابة جهازية أخرى) فحدث التحسن في (> 90%) من الحالات باستعمال الصادات الخلالية والموضعية.

نواسير العنق الخلقية الجانبية والمتوسطة Lateral And Midline Congenital Neck Fistulae

ياسر السراقبي. كلية الطب . جامعة دمشق
إشراف: أ.د. أكرم الحجار

أجريت دراسة راجعة لمدة عشر سنوات حتى العام 2000 على جميع مرضى الكيسات والنواسير الدرقية اللسانية الغلصمية الذين راجعوا الشعبة الأذنية في مشفى الموساة. حيث بلغ عدد حالات الكيسات والنواسير الدرقية اللسانية 72 حالة منها 42 حالة كيسات درقية لسانية و 30 حالة نواسير وكانت نسبة الذكور إلى الإناث تقريباً متساوية 51% ذكور و 49% إناث وبلغ العمر الوسطي 15.6 سنة وكانت الكيسات الدرقية اللسانية على الخط المتوسط بنسبة 92% وكان موضعها 14% فوق اللامي و 70% درقية لامية و 12% فوق القص.

كما راجعت الشعبة الأذنية في مشفى الموساة 77 حالة كيسات ونواسير غلصمية منها 25 كيسة غلصمية و 36 ناسور أمام الصيوان وكانت نسبة الذكور 59% والإناث 41% وبلغ العمر الوسطي 11.8 سنة وكان موضع الكيسات الغلصمية 91% أمام القترائية بالقسم العلوي للعنق 59% أسفل العنق.

1- تبين ضرورة إجراء العمل الجراحي للكيسات والنواسير الدرقية اللسانية حسب Sistrunk (يشمل استئصال قسم من اللامي ومخروط مركزي حتى الثقبه العوارء) لتخفيف نسبة النكس.

2- وتبين أن الناسور الغلصمي الأشيع هو ناسور الشق الغلصمي الثاني أمام القترائية على الثلث السفلي للعنق.

3- الحذر عند العمل على ناسور الشق الغلصمي الأول من احتمال إصابة العصب الوجهي مع ضرورة تنبيه المريض لهذا الاحتمال.

التهاب الملتحمة عند الوليد

Neonatal Conjunctivitis

والبحث في أهمية ودور كل نوع من أنواع هذا التصوير وتحديد الإنذرا وجدوى المعالجة ومضاعفاتها.

لمحة عن الطرائق المستعملة في البحث: جميع أنواع التصوير الطبي كالتصوير البسيط، الظليل، والطبقي المحوري، والرنين المغناطيسي، والأمواج فوق الصوت وجميعها متوافرة في مشافي وزارة التعليم العالي بجامعة دمشق (الأطفال ، المواساة، الأسد الجامعي).

النتائج المتوقعة: أهمية الصورة البسيطة في كشف التشوهات العظمية المرافقة. المرنان وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها عند دراسة تشوهات العمود الفقري. التصوير بالأمواج فوق الصوت هي وسيلة سهلة ورخيصة ومتوافرة ومشخصة.

تجربة مشفى الأسد الجامعي في تبديل مفصل الورك غير الأسمنتي

The Experience Of Al-Assad Hospital In Cement Less Total Hip Arthroplasty

باسل عبد العزيز. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ.د. هيثم غنام

ما تزال الدراسة المقارنة بين أنواع المفاصل (إسمنتي، غير إسمنتي هجين) تعطي نتائج متناقضة كما أن استمرار آلية الحث العظمي أو البناء أو التجدد العظمي بالنسبة لحبيبات Porous على المدى البعيد هو أمر مشكوك به وذلك بدليل وجود حالات من التخلخل- كما تبدي الدراسات الفرنسية- على المدى البعيد. كما أن الدراسات التي ظهرت على نوع الإسمنت وخلطه بالصادات وطريقة تحضيره وحقنه أفقااً جديدة لاستخدام مفاصل إسمنتية لها إمكانية الدوام لفترة أطول.

وتبقى الدراسات المستقبلية في تبديل الورك وتطوير هذه الجراحة الهامة في إعادة تأهيل المرضى الشباب مرهونة بتطوير نوعية الحبيبات التي تغطي المركب الحوضي والفخذي بحيث تضمن البناء العظمي وعدم حدوث الانحلال العظمي على المدى البعيد بما يقربنا من المفصل النموذجي.

ضيق الوصل الحويضي الحالبى

Ureteropelvic Junction Obstruction (Upjo)

مازن محمد حسن. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ.د. عدنان أحمد
هدف الدراسة

عرض آخر المستجدات العلمية حول سبب هذه الآفة، وأحدث الطرق في تدبيرها.

الطرائق المستعملة

دراسة إحصائية بأخذ عينة عشوائية من المرضى المصابين بهذه الآفة من مشفى المواساة ومتابعة أشكال التدبير المختلفة التي أجريت لهم والمقارنة بين أشكال التدبير المتبعة في مشفى المواساة ومقارنة نسب الشفاء والمضاعفات بالنسب العالمية.

النتائج

- معرفة نسب النجاح المترافقة مع كل طريقة من طرق العلاج.
- معرفة نسب المضاعفات في كل طريقة من طرق العلاج.
- معرفة أسباب المضاعفات وكيف يمكن تجنبها.

الاستنتاجات

ظهر لنا من خلال الدراسة أهمية الكشف المبكر عن الآفة لتجنب حالا إنتهاء عمل الكلية، كذلك أهمية وضع القشاطر الحالية بأنواعها لتجنب النكس، كذلك ضرورة متابعة المريض بعد العمل الجراحي لمعرفة وجود النكس باكراً ما أمكن لإصلاحه في وقت مبكر.

آفات العمود الفقري الخلقية

Congenital Anomalies Of The Spine

محمد فادي سلقيني.

كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. زياد الصواف

هدف البحث : عرض لدور التصوير الطبي في دراسة آفات وتشوهات العمود الفقري الخلقية

وتوضعت بشكل أشيع على الشفة السفلى مع أهمية

ذوي نمط الجلد II-III.

كما كان التهاب الشفة البسيط الأشيع بين التهابات الشفة غير الخمجية دون وجود فرق جوهري بين الذكور والإناث.

تلاه التهاب الشفة السفلي بنسبة 3.37% مع حدوث أشيع 7 عند الذكور ودور للتدخين والتعرض للشمس في حدوثه.

كما شكلت الأورام الوعائية التكاثرية 5.69%، الجلادات 6.23% وكان أشيعها الوذمة

الوعائية.

نستنتج أن آفات الشفة أمراض شائعة الحدوث قد تتورط في إمراضيتها عوامل بيئية وعادات شخصية وتقترح الدراسة تقديم النصائح والإرشادات للمرضى لتجنب العوامل المسببة.

مشاركة الميدازلام مع الكيتامين في تخدير تجريف الرحم

Combination Of Midazolam With Ketamine In Anesthesia For Utero-Curettage

ربيع الفحل. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. هند الدغلي

تمت هذه الدراسة في مشفى التوليد الجامعي على 200 مريضة وكان الهدف هو إحداث النسابة وإنقاص نسبة أهلاسات الصحو التنوعة عند استعمال الكيتامين بمفرده، بالإضافة لتقادي التأثيرات الجانبية الأخرى والمختلفة غير المرغوب فيها. علماً بأن للكيتامين في تخدير مثل هذه العمليات أهمية خاصة كونه ينفرد بميزات فريدة تجعله يتفوق على المخدرات الوريدية الأخرى التي يمكن استخدامها أيضاً.

كما أن الميدازلام من أكثر البنزوديازيبينات إحداثاً للنسابة والتركين ونصف عمره الإطراحي القصير وقدرته على إقلال نسبة حدوث التأثيرات الجانبية المختلفة للكيتامين جعلته مناسباً لمشاركته للدواء السابق في تخدير مثل هذه العمليات. لقد تمت المراقبة الدقيقة لمجمل التأثيرات الدوائية وحتى الصحو التام وذلك عند استعمال الكيتامين

تسكين مرضى الجراحة الصدرية باستخدام الأفيونات الوريدية أو الحصار فوق الجافية

Analgesia For Thoracotomy Patients By Using IV Opioids Or Epidural Block

أنس المصري. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. عبد القادر دعدو

هدف البحث إلى مقارنة طرق التسكين المختلفة للمرضى الخاضعين لعمليات فتح الصدر واختيار طريقة التسكين الأنسب.

تمت دراسة المرضى في مشفى الأسد الجامعي في العناية المشددة الجراحية وقد تمت مقارنة نتائج التسكين على أجهزة الجسم وأهمها الجهاز القلبي الوعائي والجهاز التنفسي.

وقد تبين أن التسكين فوق الجافية يحافظ على فيزيولوجية القلب والدوران، كما أنه يساعد المريض على العودة إلى الوظيفة التنفسية الطبيعية كما يقصر من فترة مكوث المريض في العناية المشددة الجراحية ويقلل من المضاعفات وأهمها خراجات المشافي، كما أنه يوفر في النفقات والعناية التمريضية ويسرع من تخرج المريض وعودته للحياة الطبيعية.

آفات الشفة

Lesions Of The Lip

لينا منير الكردي. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. صالح داود

آفات الشفة قليلة التواتر وتأخذ أهميتها نظراً للمكانة الجمالية للشفة وتضم طيفاً واسعاً من الأمراض قد تكون بدئية أو ثانوية مرافقة لجلادات أخرى، كما قد تكون الشفة موضعاً لأورام وانتشوات وخاصة السرطانة شائكة الخلايا. بلغ حجم العينة 316 مريضاً بأعمار تتراوح بين 2-58 سنة كان عدد الذكور 191 مريضاً وعدد الإناث 125 مريضة فكانت نسبة الانتشار أعلى عند الذكور.

سجلت الإصابة بخمج الحلا البسيط أعلى نسبة 12.20% تلتها السرطانة شائكة الخلايا 11.39% التي كانت أشيع عند الذكور وبمعدل وسطي 61.16%

الطرائق: شملت دراستنا 84 حالة انتحار 54 ذكر، 30 أنثى، 12 حالة منها كانت باستخدام الأدوية و175 حالة محاولة انتحار دوائي 50 ذكر و125 أنثى صنفنا وفقاً للجنس والعمر وفصول السنة وأيام الأسبوع، وصنفنا الأدوية المستخدمة حسب المجموعات الدوائية العلاجية.

النتائج: استعملت المسكنات في 33.33% من حالات الانتحار وفي ثلث الحالات استعمل الضحايا الأدوية الموصوفة لهم. استعملت المسكنات في 25.36% من حالات محاولات الانتحار الدوائي، شكل الباراسيتامول 94% منها، أما الأدوية النفسية استعملت بنسبة 23.90%. نسبة محاولي الانتحار الدوائي من الذكور إلى الإناث هي: 1:2.5، 48% منهم تراوحت أعمارهم بين 10-20 سنة، 32% من الحالات وقعت صيفاً. الخلاصة: الباراسيتامول من أكثر الأدوية المستعملة في محاولات الانتحار ومن الضروري إجراء دراسات أخرى أكثر عمقاً لتشمل المحافظات الأخرى للتأكد من شمولية وأهمية المشكلة.

السوفنتال في التخدير العام

Sufentanil In General Anesthesia

رنار عيدي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. هند الدغلي

الهدف من البحث هو دراسة نظرية وعملية للسوفنتانيل ومقارنته مع الفنتانيل، كمواد مورفينية، طبقت أثناء العمل الجراحي بالطريق الوريدي، حيث تمت الدراسة على 100 مريض في مشافي المواساة، الأسد الجامعي، التوليد. تم تصنيف المرضى حسب العمر (أكبر من 13 سنة)، وحسب نوع العمل الجراحي (جراحة عامة- عصبية- صدرية- بولية- عظمية- أذن- نسائية) وحسب الوزن (مثالي، أكثر بـ 20%، أكثر من 20% من المثالي) تمت مراقبة العلامات الحيوية للمرضى منذ المباشرة وحتى الصحو التام، ثم دونت الجداول الخاصة بالتغيرات والتأثيرات الجانبية، وقرنت مع دراسات عالمية مشابهة ثم وضعت نتائج هذا البحث التي ميزت السوفنتانيل بسرعة بدء وإنهاء تأثيره وإنخفاض تأثيراته

لوحده وعند إشراك الميدازولام معه. هذا وقد وضعت النتائج التي جمعت وصنفت بجدول خاصة مع دراسة إحصائية مناسبة. وقد وجدنا أن استعمال الميدازولام مع الكيتامين يقلل بشكل كبير التأثيرات الجانبية للكيتامين وخصوصاً إهلاسات الصحو والثبات القلبي الوعائي النسبي بالإضافة لتخفيض حدود الجرعة التسكينية.

تنظير عنق الرحم المبكر

Colposcopy

محمد شوقي عمر. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. جميل طالب

تأتي أهمية اللجوء إلى تنظير عنق الرحم المبكر من خلال ضرورة الكشف الباكر عن الأفات التنشؤية لعنق الرحم ووضع العلاج المناسب في الوقت الأمثل قبل الوصول إلى مرحلة السرطان الغازي. قمت من خلال هذه الدراسة بإجراء مقارنة بين الفحص الخلوي والفحص النسجي وتنظير عنق الرحم المبكر وإبراز درجة أهمية كل منها في الكشف المبكر عن الأفات التنشؤية بعنق الرحم. ولعل أبرز ما استخلصه هو ضرورة تبني برنامجاً روتينياً للمسح الخلوي بالإضافة إلى ضرورة إجراء تنظير عنق الرحم المبكر بشكل روتيني وتركيز الانتباه بشكل خاص على النساء ذات الخطورة المرتفعة. وخلال أهمية هذه الدراسة أرجو وضع تقييم لمدى إمكانية هذه الوسيلة وإعداد الكادر المؤهل ونشر الوعي الصحي حول ضرورة المسح الدوري لعنق الرحم.

دراسة طبية شرعية تحليلية لحالات

ومحاولات الانتحار الدوائي في مدينة دمشق

Forensic And Analytic Study Of Suicide Attempts By Using Medicines In Damascus

بسام المحمد. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد فوزي النجار

هدف البحث: يهدف البحث إلى تحديد المجموعات الدوائية الأكثر استعمالاً في حالي الانتحار ومحاولات الانتحار الدوائي وبالتالي تسهيل قدرة الطبيب الشرعي على الشك بالتسمم.

استعملنا 5 طرق للعلاج الجراحي لإعادة زرع الحالب : Cohen في 30 حالة (55.5%)، و lead Better Politano في 10 حالات (18.5%)، و educ في 9 حالات (18%)، و Methiesin في 3 حالات (5%)، و Lich Gregio في حالتين (2%).

عند تقييم النتائج للطرق المختلفة من حيث زمن العمل الجراحي، وسهولة، وإمكانية تطبيق التكنيك، والمضاعفات المصادفة، ونتائج العمل الجراحي بالمقارنة مع بعض الدراسات العالمية وجدنا أن طريقة Cohen في إعادة زرع الحالب هي الأفضل رغم ما يؤخذ عليها من صعوبة التنظير بعد العمل الجراحي.

تكنيك جراحة الإحليل التحتي بطريقة (Snod Grass)

Hypospadias Repair By Snod Grass(Tip) Technique

محمد وسيم حداد. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. إبراهيم برغوث

هدف الدراسة

شاع لتصنيع التحتي طرائق عديدة ثبت نجاحها إلى أن جاء Snod Grass عام 1993 بطريقة جديدة نشرتها مجلة الجراحة البولية (JU) عام 1994. ولأن هذه الطريقة جديدة ولم تعلم بعد مضاعفاتها، فقد جرى تقويم ودراسة هذه الطريقة في كل من مشفى الأسد الجامعي والمواساة ومقارنة مضاعفاتها بالطرائق السابقة.

الطرائق المستعملة في البحث

قمنا بمتابعة المرضى الذين أجري لهم التصنيع بهذه الطريقة وذلك بالرجوع إلى أضاير المرضى أو متابعتهم بشكل شخصي أو الرجوع إلى الانترنت.

النتائج

بالنسبة للدراسة العملية فقد تم فيها متابعة 105 حالات لإحليل تحتية تم تصنيفها حسب Snod Grass (51 حالة بالأسد الجامعي-54 حالة بالمواساة).

وكانت المضاعفات الباكراة

• نزف 2%.

الجانبية عن الفتاتيل، لذا يوصى باستخدامه بجرعته الدنيا في العمليات قصيرة الأمد وقاية من تأثيراته الجانبية.

الجذر المثاني الحالب

The Vesicoureteral Reflux

عبد الله الدر. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. وافي بركات

ملخص البحث: يعتبر الجذر المثاني الحالب من أهم الأمراض المسببة للخمج البولي وتقدر نسبة حدوث الجذر عند الأطفال الأصحاء بأقل من 1%، بينما يصادف الجذر عند 50% من الأطفال الذين يشكون من الخمج البولي، وعند 6% من الكهول المصابين بنفس الخمج.

قمنا من خلال هذه الدراسة بمتابعة وتقييم الحالات التي راجعت مشفى المواساة والأسد الجامعي خلال الفترة من عام 1998 حتى 2001 حيث بلغ عدد الحالات 50 حالة منها 14 حالة عند الذكور 28%، و 36 حالة عند الإناث 72%، كانت الإصابة بالجهتين في 22 حالة 44% بالجهة اليسرى 10 حالات 20%، و 18 حالة بالجهة اليمنى 36%.

وقد تم توزيع الحالات حسب العمر كالتالي: حيث صادف 30 حالة 60% بعمر 2-5 سنوات، و 10 حالات 20% بعمر 5-10 سنوات، و 6 حالات 2% بعمر 10-15، و 4 حالات 8% بعمر أكبر من 15 سنة.

أجربنا للمرضى جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية اللازمة بالاعتماد على الموجودات الشعاعية والتصنيف العالمي لدرجات الجذر 5 درجات فقد وجدنا بأن الدرجة 4 هي الأكثر تواتراً 38 حالة 47.70%، وقد تم توزيع

المرضى حسب طريقة العلاج إلى طريقتين: علاج محافظ في 18 حالة للدرجة 1-2 وعلاج جراحي في 40 حالة لبقية المرضى درجة (3-4-5).

- 3- تطبيق التكنيك العجاني Delorme على المرضى وخاصة ذوي الخطورة العالية.
- 4- تشجيع الأطباء على إجراء دراسات مشابهة دون التقيد والتأثر بالدراسات الغربية.

دراسة سريرية عن استخدام القناع الحنجري عند البالغين

Clinical Study Using The Laryngeal Mask For Adults

أنيس يديوي، كلية الطب، جامعة دمشق
إشراف: أ. د. عبد القادر دعد

تمت الدراسة في مشافينا الجامعية وشملت 182 مريضاً بالغاً من مختلف الأعمار ولمختلف العمليات الجراحية. وقد بدأنا بتجري النقاط المميزة للقناع الحنجري من حيث سهولة تطبيقه كوسيلة هامة في الإنعاش وتدبير صعوبات التنبيب وتطبيقه في حالات التنفس العفوي والموجّه وإمكانية تطبيقه بالوضعية الجانبية والبطنية وعند المصابين بأفات قلبية وفي العمليات الطويلة والقصيرة. وقد تم تطبيق القناع الحنجري عند جميع المرضى الـ 182، ولمختلف أنواع العمليات، ولم يحصل سوى حالي فشل في التطبيق نتيجة قلة الخبرة في بداية الدراسة. حيث يعتبر القناع الحنجري وسيلة سهلة وسريعة وغير راضة لتأمين الطريق الهوائي وفي حالات الطريق الصعب. ويتغير بديلاً عن التنبيب الرغامي تحت التخدير العام وفي حالات التنبيب الإسعافي داخل المشفى أو خارجها. وإن تطبيق القناع يعدل ويقلل من الاستجابات الهيموديناميكية مقارنة بالتنبيب الرغامي، ويستخدم في المرضى غير الصائمين إذا توافقت الحالة بصعوبة تنبيب، ويستخدم في التخدير دون مخزبات طويلة الأمد مع بقاء التنفس العفوي.

تنظير البطن في الأمراض النسائية

Laparoscopy In Gynecology

- ورم دموي 2%.
- خمج جرح 7%.
- أما المضاعفات البعيدة فكانت
- نواسير إحليلية جلدية 13%.
- تضيق صماخ 15%.
- فشل التصنيع بالكامل 2%.

الاستنتاجات

حصلنا على نتائج تقارب النتائج العالمية وإن تقنية Snod Grass سهلة التعلم والتطبيق ومضاعفاتها قليلة بشكل عام مقارنة مع الطرق الأخرى.

هبوط المستقيم

Rectal Prolapse

عمار الميداني، كلية الطب، جامعة دمشق
إشراف: أ. د. حمود حامد

الهدف من الدراسة: الوصول إلى التكنيك الجراحي ذي النتائج الأفضل بين الطرق الجراحية لإصلاح هبوط (انسداد) المستقيم.

لمحة عن الطرائق المستخدمة في البحث: تمت دراسة ترأجعية في اصابير وملفات المرضى المقبولين بتشخيص هبوط مستقيم في مشافي وزارة التعليم (مشفى المواساة، الأطفال، الأسد الجامعي) ما بين (1997-2001) والأوراق الخاصة بمتابعة ومراجعة هؤلاء المرضى بعد العمل الجراحي.

النتائج التي توصل إليها البحث: إن التكنيك العجاني المتبع (Delorme) كان الأكثر تطبيقاً ونتائجه مضاعفات أقل من التكنيك البطني مع نسبة نكس مقبول نسبياً. يمكن إجراء هذا العمل الجراحي في كل الأعمار وخاصة المرضى عاليي الخطورة الذين لا يتحملون العمل الجراحي الطويل.

التوصيات

- 1- تشجيع المرضى على مراجعة الأطباء في مرحلة مبكرة من المرض.
- 2- تطبيق العلاج المحافظ كخط أول عند الأطفال.

شكري توران. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عماد الدين تنوخي

تنظير البطن عمل جراحي قديم لا زال يسير في تطور مستمر وله استطببات علاجية: مثل ربط البوقين وتشخيصه مثل استقصاء العقم، لا بد من الدقة الكبيرة عند وضع الاستطببات واستبعاد مضادات الاستطببات وهناك مضاعفات لهذا العمل الجراحي بعضها خطير يهدد الحياة وهذه المضاعفات تخديرية، قلبية، ورنوية، والنفخ خارج البريتوان والأذيات الحرارية للأحشاء وانتقابها وتوسسرها والتهابات البريتوان وإصابة الأوعية... الخ.

في هذه الدراسة العملية تم دراسة تنظير البطن لـ 525 حالة في الفترة الممتدة من 1999/10/1 إلى 2000/10/1، 77% من هذه الحالات كانت لاستقصاء العقم. من هذه الدراسة وجدنا أن تنظير البطن عملية قليلة المراضة والمضاعفات ولكنها بحاجة إلى تدريب مستمر ومهارة وخبرة عالية.

التخدير الناحي الوريدي

Intravenous Regional Anesthesia

أحمد سلمان. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عبد القادر دعد

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة تأثير مشاركة الفنتانيل مع الليدوكائين في التخدير الناحي الوريدي للأطراف حيث تضمنت هذه الدراسة عدة خطورات مبتدئين أولاً بفتح وريد في الطرف غير المصاب من أجل تأمين الإسعافات اللازمة في حال حدوث اختلاط ما.

أما التخدير الناحي الوريدي للطرف المصاب فكان يتم أولاً بقتطرة وريد قاصي من ثم تفرغ هذا الطرف من الدم بواسطة العاصبة المطاطية في مكان داني من الطرف فوق مكان العمل الجراحي من أجل قطع التروية الدموية عن الطرف وبالتالي عدم حدوث احتقان فيه كما تهدف إلى منع وصول محلول المخدر الموضعي إلى الدوران العام ومن ثم حقن محلول المخدر الموضعي (الليدوكائين) مع الفنتانيل أو بدونه والانتظار لمدة 10 دقائق ثم نقل مكان العاصبة المطاطية إلى مكان أخفض قليلاً من مكانها الأولي لتقادي حدوث ألم العاصبة وبعد ذلك يسمح ببداية العمل الجراحي مع مراقبة

التأثيرات الجانبية للمادة المخدرة وعند الانتهاء من العملية الجراحية تترع العاصبة على أن يكون قد مضى أكثر من 30 دقيقة من بداية حقن المادة المخدرة مع الانتباه لإمكانية ظهور علامات الانسمام بالمادة المخدرة.

بعد دراستنا التي تمت على 80 مريضاً مع إضافة الفنتانيل لـ 42 مريضاً حصلنا على بداية تأثير أسرع للتسكين مع زيادة شدة هذا التسكين وكانت مدة تحمل العاصبة المطاطية أطول زمنياً حيث كان بدء الإحساس بالألم يظهر متأخراً نسبة إلى العمليات التي لم نصف إليها الفنتانيل.

استنتجنا من هذا البحث أن التخدير الناحي الوريدي الأطراف باستعمال محلول مخدر موضعي هو طريقة سهلة التطبيق مأمونة النتائج وقليلة المضاعفات ولا تحتاج لتجهيزات معقدة تصلح للعمليات الإسعافية والباردة على الطرف العلوي أو السفلي وذلك عند الكبار والصغار وإن إضافة مادة دوائية مثل الفنتانيل لمحلول المخدر الموضعي تجعل هذا التخدير أسرع ظهوراً وأطول زمناً وأكثر تحملاً.

التشخيص الشعاعي لأمهمات الدم الدماغية

Radiological Diagnosis Of Cerebral Aneurisms

شادي السليم. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد علي فقير

إن التطور الكبير الذي حصل في حقل التشخيص الشعاعي في العقدين الماضيين أدى إلى ظهور طرق جديدة ووسائل متطورة في التشخيص الشعاعي مثل التصوير الطبقي المحوري المحسوب CT والتصوير بالرنين المغناطيسي MRI وقد حلت هذه الوسائل محل الوسائل القديمة في كثير من التطبيقات ولكن بعض الوسائل القديمة كالتصوير الشرياني والذي تطور إلى التصوير الشرياني الرقمي DSA ما زالت محافظة على مكانتها في التشخيص لأنها ما تزال حجر الأساس في تشخيص أمهمات الدم الدماغية وتحديد نوع وكيفية معالجتها.

الآفات القتاميةنية سينة التنسج والخبيثة

Dysplastic & Malignant

Melanocytic Lesions

محمد أديب حورية. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. راندة الخاني

الهدف: شهدت الملائوما الخبيثة ازدياداً ملحوظاً في العديد من بلدان العالم في الآونة الأخيرة. تهدف هذه الدراسة إلى مراجعة الخصائص التشريحية المرضية- السريرية ونسبة حدوث الآفات الملائية الخبيثة و سبب التنسج المشاهدة في مشافي جامعة دمشق.

مواد وطرق الدراسة: تم تحليل قاعدة بيانات أقسام التشريح المرضي في المشافي الجامعية بخصوص جميع الآفات الملائية الخبيثة و سبب التنسج المشخصة خلال الأعوام 1996-2000. تم سحب المعلومات من طلبات التشريح المرضي، تقارير التشريح المرضي، ملفات المرضى، وأرشيف الشرائح الزجاجية في تلك الأقسام، مع استثناء نقاتل الملائوما مجهولة الورم البدني.

النتائج: سجلت 68 حالة ملائوما جلدية وخارج جلدية، بالإضافة لـ 5 حالات وحة سبب التنسج. كانت الملائومات الجلدية والعينية والمخاطية 66%، 23%، 10% على التوالي. شكلت الملائومات الجلدية 0.35% من الخبايا عام 2000. كانت نسبة المرضى عند المجيء بمراحل I, II, III, IV بمقدار 4%، 8%، 48%، 12% على التوالي. كان هناك رجحان لإصابة الذكور (♂/♀=1/1.5). أكثر الأماكن إصابة هي الرأس والعنق والجدع عند الذكور، والأطراف عند الإناث. بالنسبة للملائوما العينية كان 80% منها في القميص الوعائي و 20% في الملتحمة. النمط الخلوي المسيطر في ملائومات القميص الوعائي هو النمط مختلط الخلايا 76%، بينما النمط سطحي الانتشار هو النمط المسيطر في ملائومات الجلد و الملتحمة، شكلت ملائومات المستقيم الغالبية العظمى من الملائومات المخاطية 62%، تليها مخاطيات الرأس والعنق 25%، فالمخاطيات التناسلية 13%.

الاستنتاج: لا تزال الأورام الملائية الخبيثة من الأورام النادرة المشاهدة في بلدنا. وقد لوحظ ازدياد نسبي في الملائومات خارج الجلد مقارنة مع الملائومات الجلدية، وهكذا تشير دراستنا

إصابة المناطق خارج الجلد هي أكبر لدى الأفراد ذوي البشرة السمراء مقارنة مع البيض، وخصوصاً في مخاطية المستقيم والشرج. يجب بذل جهود أكبر للوقاية من هذه الآفات وكشفها في المراحل المبكرة وذلك من خلال التفتيش المنظم لكل من المرضى والأطباء.

النوربلانت

The Norplant

قحطان أحمد الحامد.

كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. كنعان السقا

الهدف من الدراسة: الجزء الأول من الدراسة ذو هدف إحصائي ويضم: انتشار النوربلانت ضمن الأوساط المختلفة من حيث (دراسة التعليم، العمر...)، نسب الآثار الجانبية المختلفة، نسب الفك الكلية والمختلفة (حسب العمل، التعليم، العمر...)، أسباب الإزالة الأساسية ونسب الاستمرار في التركيب حسب المجموعات المختلفة. الجزء الثاني من الدراسة عبارة عن دراسة عشوائية معمة لمعالجة الاضطرابات النزفية الطمثية الحادثة لدى المستخدمات للنوربلانت.

لمحة عن الطرائق المستعملة في البحث: الجزء الأول الدراسة إحصائية تم إجراءه على العينة كاملة، الجزء الثاني تم على المستخدمات اللواتي شكين من اضطرابات نزفية طمثية حيث تم تقسيمهن لمجموعتين: المجموعة الأولى عولجت وفق أحد الأدوية المستخدمة في انظام المقترح وهي (Premarin – Triquilar – Ibuprofen). المجموعة الثانية (Norcolut – Microgynon) دون أي معالجة أي تظمين فقط) وتم إجراء مقارنة بين العلاجات السابقة.

أهم النتائج التي توصل إليها البحث: ارتفاع مستوى التعليم عند المستخدمة يؤدي إلى ازدياد المطاوعة وانخفاض نسبة الفك وازدياد متوسط فترة التركيب. بالنسبة للآثار الجانبية:

النزف المشحامي وغير المنتظم ثم الصداع هي الأكثر مشاهدة و 40% من أسباب الإزالة تعود للاضطرابات النزفية الطمثية. استخدام نظام المعالجة المقترح أدى لزيادة نسبة الاستمرار في

طرق الدراسة

أجريت الدراسة في مشفى الأمراض الجلدية والزهرية وفي كلية العلوم وتألفت العينة من 271 مريض من مراجعي المشفى خلال عامي 2000-2001 وتم تقسيم الآفات سريريا كما أجري التحري المباشر عن الطفيليات عند 271 مريض ومريضة والزرع على وسط N.N.N عند 234 والخزعة النسيجية عند 181 مريض. أجري الفحص المباشر باستعمال رأس إبرة معقمة وبعد جاهزية العينة تفحص تحت المجهر الضوئي. ولزرع الطفيلي يدخل رأس المشرط في الآفة حتى يحصل نز يؤخذ باستعمال ماصة مخلدة ويوضع بانبوب الزرع ثم تحضن أنابيب الزرع بدرجة 24-26 وفي حال السلبية لمدة 4-6 أسابيع وبعدها يعتبر سلبى في حال استمرار السلبية.

النتائج

كان ظهور الآفات أكثر ما يكون في كانون الأول والثاني وشباط بنسب متساوية. العضو الأكثر إصابة هو الوجه 22.04% ويليهِ اليد. إن 42% من الحالات حدثت في عمر يقع بين عامي 16-24 سنة، حدثت 46.86% من الحالات المدروسة في ريف دمشق و 31.3% في دمشق. إن 93.33% من الآفات التي بعمر 15 يوم أو أقل بقطر 5 ملم أو أقل ومن الملاحظات الهامة في هذا الموضوع حدوث انخفاض حاد في نسب

تركيب ووسطى عدد أيام التركيب و Premarin أعطى أفضل النتائج و يليه كل من Brufen, Triquilar.

الاستنتاجات النهائية: إن النوربلانت مانع حمل آمن وموثوق لكنه يتمتع بآثار جانبية غير قليلة نسبياً، لذلك من المفضل أن ننصح به بشكل خاص لدى بعض الفئات التي تحتاجه والتي تملك تقبلاً جيداً لاستعماله. تشجيع نشر النوربلانت في الأوساط ذات التعليم العالمي بسبب مطاوعته وانخفاض نسبة الفك وازدياد متوسط فترة التركيب. التأكيد على أهمية وجود نظام معالجة متبع لدى مقاربة الاضطرابات الطمئية النزفية و Premarin قد أعطى أفضل النتائج و يليه Brufen و Triquilar الذي يوصى باستخدامه عند وجود مضاد استطباب لاستخدام الأسترجين. مع إجراء المزيد من التقصي والتطوير في دراسات لاحقة.

دراسة مخبرية ونسجية للايشمانية الجلدية

Laboratory And Histologic Study Of Cutaneous Leishmaniasis

ربيع صالح الشومري .

كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. فايز الدغلي

الليشمانية الجلدية هي مجموعة أمراض متعددة من جنس الليشمانيا وبميل كل نوع لأن يشغل منطقة حيوانية جغرافية خاصة وانتشار الليشمانية عالمي ويسهم في زيادة انتشارها حركة المهاجرين الجدد إلى مناطق استيطان الداء وازدياد السياحة ونقص استعمال المبيدات الحشرية. الناقل هو ذبابة الرمل ونمط حياة متعضية الليشمانيا متبدل في الفقاريات والحشرة يمكن تقسيم داء الليشمانيات إلى أربعة أقسام عريضة هي الليشمانيات الجلدي والجلدي المنتشر والجلدي المخاطي والحشوي.

هدف الدراسة

كشف الموجودات المخبرية والنسجية للآفات

المشخصة سريريا ومعرفة مدى توافق التشخيص الناجمة عن السابق.

الآفات بقطر 1-5 ملم وبعمر أكبر من 7 أشهر. لم تتغير نسب إيجابية الفحص المباشر مع تقدم عمر الآفة 83.33% كانت إيجابية الزرع لآفة بعمر 9 أشهر بنسبة تزيد على 90%. نسبة الذكور في هذه الدراسة بلغ 62% وكان الزرع إيجابي بنسبة 69.86% عند الذكور و 76% عند الإناث (المتوسط 72.22% كان تلوين الخزعة النسيجية بملون غمزا إيجابي بنسبة 47%).

المناقشة والاستنتاجات

نلاحظ أن المرض يكثر في فصل الشتاء. كما نلاحظ أن الأعضاء المعرضة هي الأكثر إصابة بالليشمانية الجلدية بعد اللدغ. أكثر الأعمار إصابة بالمرض هو 16-24 سنة. يصيب المرض الذكور أكثر من الإناث ويلاحظ أن المرض مستوطن في

المسببة لتلك الأخماج، ومعرفة تحسبها لصادات مختلفة.

بعد الحصول على العينة المرضية: زرعها على

الأوساط الزرعية المناسبة مع تحضير لطاخة وتلوينها بطريقة غرام. حددت هوية العقديات من خلال الصفات الزرعية، والصفات الشكلية للجرثوم تحت المجهر، وإيجابية اختبار الكاتالز - ومن ثم صنفها إلى عقديات إيجابية المختراز وسلبية المختراز بعد إجراء اختبار المختراز. وأخيراً أجريت اختبار تحسس العقديات المعزولة باستخدام صادات معينة.

وقد بينت هذه الدراسة التي أجريت في مشفى الموساة عن حدوث حوالي 200 حالة خمج مشفوي خلال أقل من سنة (تسعة أشهر)، وعن وجود نسبة مرتفعة لأخمج المكورات العنقودية بلغت 20% من هذه الأخماج، كما لوحظ وجود مقاومة للعديد من الصادات.

مما يؤكد ضرورة إجراء الزرع الجرثومي والتحسس للصادات أمام كل حالة خمج مشفوي.

المعالجة النبضانية في فرقية نقص الصفائح الأساسية "" دراسة مقارنة بين الميثيل بريدنيزولون والامينو غلوبولين وريديا ""

Randomized Trial Comparing IVIg With MPPT in ITP

عثمان حمدان. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد زياد شويكي

الهدف: دراسة مقارنة لنتائج معالجة الـ ITP باستعمال دوائين هما الميثيل بريدنيزولون MPPT والامينو غلوبولين وريديا بعد إخضاع المرضى لفترة مراقبة مدتها ثلاثة أيام قبل العلاج. الطريقة: مراقبة المرضى لمدة ثلاثة أيام بإجراء تعداد يومي للصفائح قبل تطبيق العلاج باستثناء حالات النزف المهدد للحياة أو النزف الرطب وذلك بتطبيق:

1- IVIG بمقدار 1 غ/كغ يومياً لمدة يومين متتاليين.

دمشق وريفها. يزداد حجم الآفات طرداً مع إزدياد عمرها في الأشهر الأولى ثم بعد ذلك عكسياً. إن إيجابية الفحص المباشر لا تتناسب عكساً مع عمر الآفة وتكون ذروة الإيجابية عندما يكون قطر الآفة 1-5 ملم كما أن الزرع يصل إلى ذروة إيجابيته في الشهر التاسع لعمر الآفة. لا علاقة للجنس في نتائج الفحص المباشر. تزداد إيجابية الفحص إذا كان الزرع إيجابياً والعكس صحيح. يكون تلوين غمزا إيجابياً في حوالي نصف المرضى.

الخلاصة

إن اللايشمانية الجلدية مرض مستوطن منتشر في كل بلاد العالم وتقله ذبابة الرمل وتختلف من منطقة لأخرى وأيضاً الأنواع المسببة والخازن وبالتالي الشكل السريري وعقابهله. تحدث خاصة عند الأطفال وتولد مناعة دائمة للنوع المسبب. درس هذا البحث بعض المظاهر الوبائية للمرض وتركز على طرق التشخيص البسيطة المتوافرة وهي الفحص المباشر والزرع وتلوين الخزعة بغمزا. وظهر أن المرض أشيع بعمر 16-24 سنة مع ميل أكبر لإصابة الذكور كما أكد أن المرض أشيع في فصل الشتاء. إن توجيه المعالجة نحو القضاء على الخازن والناقل في المناطق المستوطنة خاصة كفيل بالقضاء على المرض وتجنب ما يسببه من مشاكل جمالية هامة.

دور المكورات العنقودية في الأخماج

المشفوية وتحسبها للصادات

staphylococcus In Nosocomial Infections And Its Susceptibility To Antibiotics

رائدة وهبي. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ.د. صلاح الدين شحادة

تعتبر الأخماج المشفوية من أهم المشاكل التي تعرق سير الإجراءات الطبية في المشافي، وكانت وما تزال المكورات العنقودية بصنفها: إيجابية وسلبية المختراز، من أهم الجراثيم المسببة لأخمج مشفوية.

وقد اخترت موضوع الرسالة لمعرفة نسبة حدوث الأخماج المشفوية على مدى عام تقريباً، ولمعرفة الدور الذي تشغله العقديات من بين الجراثيم

وبالتالي فإن دراسة هذه الحالات وتوثيقها والاضطلاع على الأخطاء الواردة أثناء تدبيرها والعمل لتلافي حدوث هذه الأخطاء يشكل أمراً ملحاً. بلغ حجم عينة الدراسة 85 حالة من مرضى الرضوض الذين راجعوا قسم الإسعاف في مشفى الموساة وكانت الغالبية ناجمة عن الرضوض الجراحية و البعض نتيجة رضوض نافذة وقد تمت دراسة أشكال التدخلات الجراحية أو غير الجراحية لهذه الرضوض وعلاقتها بالأعضاء الأخرى في محاولة للوصول إلى تقرير حول صحة هذه التدخلات أو مناسبتها للحالة وهل كان بالإمكان الأفضل لهذه الحالات وهل هذه المداخلات بعيدة أو قريبة من الدراسات العالمية. نتيجة هذه الدراسات رأينا أن هناك ميلاً كبيراً لاستئصال الطحال في حالات قد يطبق فيها علاج أكثر محافظة وأقل جذرية. كما تم ملاحظة أذية كبيرة في الطحال بنسبة كبيرة تجعل الدراس يفكر في أسبابها إن كان في عدم التقيد بإشارات المرور أو بالسرعة المحددة عدم الانتباه على الطرقات وعدم توفر الوعي اللازم عند كثير من المارة أو عدم اتباع قواعد السلامة في الإنشاءات أو الأعمال الإنشائية. كما تمت ملاحظة غياب المتابعة الدقيقة لحالات استئصال الطحال بعد الجراحة. وهكذا نستنتج أن حالات رضوض الطحال تحتاج عندنا إلى عناية أكبر ومتابعة أكبر إن كان من خلال التدخلات الجراحية أو من حيث المتابعة بعد الجراحة والأرشفة والعناية بالأضابير وجمعها لهؤلاء المرضى أو من حيث إنشاء مركز متخصص لهذه الحالات ومتابعتها.

دور المتدثرة الحثرية في إمرضية التهاب عنق الرحم المزمن والعقم عند النساء
المراجعات لمشفى التوليد وأمراض النساء
الجامعي بدمشق

**Role Of Chlamydia Trachomatis
In The Pathogenesis Of Chronic
Cervicitis And Infertility In
Woman Attending The
Universal Gynaecology And**

2- MPPT بمقدار 30مع/كغ يومياً لمدة ثلاثة أيام متتالية.

متابعة مرضى الدراسة خلال مدة تجاوزت الـ 6 أشهر. وتطبيق العلاج البديل في حال النكس أو عدم الاستجابة.

النتائج: 57 مريضاً أخضعوا للدراسة طبقت المعالجة الفورية في 10 حالات. 47 مريضاً جرت مراقبتهم لمدة 3 أيام قبل تطبيق المعالجة. حصلت الهوادة العفوية في 23 حالة أي نسبة 49%. طبقت المعالجة في 34 حالة 17 حالة طبق فيها الـ IVIG وطبق الـ MPPT في 17 حالة أخرى.

وصل تعداد الصفيحات إلى $(233 \times 10^9/L)$ عند تطبيق الـ IVIG بينما وصل إلى $(59 \times 10^9/L)$ عندما طبق الـ MPPT. حصلت الاستجابة النهائية في 52% من الحالات التي طبق فيها الـ IVIG وفي 35% من الحالات التي طبق فيها الـ MPPT. حصل الازمان في 17% من الحالات في كل العلاجين.

الاستنتاجات: 1- الـ IPT مرض يميل للشفاء العفوي ولا حاجة لتطبيق العلاج إلا في حالات النزف المهددة للحياة أو النزف الرطب أو انخفاض رقم الصفيحات < 20000 أو في الحالات التي لم تحدث فيها الهوادة العفوية.

3- بلغت الكلفة الوسطية لـ 60000 ليرة عند تطبيق الـ IVIG بينما قاربت حوالي 3000 ليرة عند تطبيق الـ MPPT ونظراً للكلفة العالية وعدم وجود فوارق إحصائية كبيرة يصبح تطبيق الميثيل بريدنيزلون أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية في بلدنا.

رضوض الطحال وتدبيرها

Spleen Trauma And Treatment

نجم الدين محمد، كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. عبد الغني الشلبي

تشكل رضوض الطحال من أكثر حالات الجراحة الإسعافية التي يمكن أن يتعرض لها الطبيب الجراح في قسم الإسعاف وخاصة في رضوض الحوادث والرضوض المهددة بالموت نتيجة تلك الحالة.

Obstetric Hospital In Damascus

محمد آمال عساف.

كلية الطب، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد طاهر اسماعيل.

هدف البحث: تحري المتدثرة الحثرية عند النساء المصابات بالتهاب عنق الرحم مزمن وعند النساء المصابات باقم ومقارنة ذلك مع مجموعة .شاهد لنساء سليما لا عرضيات

اعتمدنا في هذه الدراسة على كشف مستضدات المتدثرة الحثرية في مفرزات عنق الرحم بالاعتماد على مبدأ الشظيرة بالاستشراب المناعي. تضمنت الدراسة 150 سيدة وزعت على 3مجموعات 60 منهن مصابات بالتهاب عنق رحم مزمن و 60 مريضة عقم و 30 حالة شاهد فكانت النتائج على التوالي بالنسب التالية 16.6 % 26.6 % 6.6 % بمقارنة مجموعة النساء المصابات بالتهاب عنق رحم مزمن مع مجموعة الشاهد كانت $p > 0.05$ وبالتالي لا يوجد فرق ذو مغزى إحصائي بين المجموعتين مما يدل على التهاب عنق الرحم بالمتدثرة قد يكون لا عرضياً. بينما مقارنة مجموعة العقم مع مجموعة الشاهد كانت $p < 0.05$ وبالتالي يوجد فرق ذو مغزى إحصائي مما يدل على أهمية المتدثرة في العقم.

القرحة الهضمية المنقبة

Perforated Peptic Ulcer

أنس الكسم، كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عصام العجيلي

الهدف من الدراسة: الوصول إلى طرق تشخيص دقيق ودراسة مؤهيات الانتقاب واختيار طريقة العلاج الأمثل. لمحة عن الطرائق المستخدمة في البحث: أجريت دراسة أتية لكل المرضى المقبولين بانتقاب قرحة هضمية في مشفى المواساة خلال 13 شهر مع متابعة كل مريض شخصياً أثناء إقامته بالمشفى وبعد تخرجه (الدراسة من أيلول 2000 حتى أيلول 2001).

النتائج التي توصل إليها البحث: إن علاقة انتقاب القرحة ببيض المؤهيات شبه مؤكدة حيث أن التدخين + مواد البناء تجاوز وجودها الـ 50%

إضافة للأدوية مضادة الالتهاب غير الستيروئيدية عند عينة واسعة من 50% الأخرى. وتبين أيضاً أن مصداقية الأميلاز والتعداد العام ليست ذات أهمية بالتشخيص. التوصيات:

- 1- تشجيع المرضى على مراجعة المشافي بشكل مبكر بحالات البطن الحاد
- 2- التأكيد على إجراء إيكو البطن لدى الشك بانتقاب قرحة خاصة مع سلبية الصور البسيطة.
- 3- إجراء دراسة موسعة لعلاقة مواد البناء بهذه الحديثة.
- 4- إجراء العمليات الجذرية (مثل قطع فائق الانتقاء) أكثر تواتراً.

استخدام السيس أتراكوريوم في تخدير الأطفال

Using Cisatracurium In Paediatric Anesthesia

كمال ادريس، كلية الطب . جامعة دمشق

إشراف: أ.د. منى عباس

السيس أتراكوريوم من الأدوية التي ظهرت حديثاً في التخدير، كمرخي عضلي غير مزيل للاستقطاب يهدف هذا البحث إلى دراسة استخدامه عند الأطفال 2-12 سنة. وتحديد جرعة المناسبة بإعطائه على دفعات وريدية منقطعة أو تسريب وريدي مستمر .

أجريت دراستنا في مشافي جامعة دمشق على 100 طفل بحالة سريرية 1 و 2 حسب تصنيف ASA، خضعوا لعمليات جراحية مختلفة دون تحضير دوائي بالمهدئات. تمت مباشرة التخدير في جميع الحالات بشكل متشابه (هالوثان+ نايتروز + أوكسجين) وجرت مراقبة الإرخاء العضلي بمنبه الأعصاب المحيطية. كما تمت مراقبة العلامات الحيوية أثناء العمل الجراحي، وظهور أي من الآثار الجانبية. كانت النتائج كالتالي

الجرعة البدئية التي تتراوح بين 2 إلى 4 أضعاف ED_{95} (أي 0.1-0.2 ملغ/كغ) تحقق حصاراً

نستنتج من الدراسة أن تسكين المرضى المحروقين يعتبر مسألة هامة جداً لكل من المريض والطبيب المناوب في شعبة الحروق على حد سواء لذلك لا بد من الفهم الكامل للفيزيولوجيا المرضية للحروق من جهة و الحرائك الدوائية للأدوية المستعملة لتحديد الدواء المثالي في كل مرحلة من مراحل الحرق بهدف إزالة الألم بشكل كامل.

آفات الثدي تحت السريرية ودور الستيرويدات كاستيرويد

The Role Of Stereotaxy In Subclinical Breast Lesions

محمد قريبي. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. سهيل سمعان

الهدف من الدراسة: بتؤكد هذه الدراسة أهمية الماموغرام في الكشف المبكر لسرطان الثدي وتضع خطة عمل لتدبير الآفات المكتشفة بالماموغرام دون علامات سريرية وذلك من خلال توضيح دور الخزعة الموجهة بالستيرويدات كاستيرويد في إعطاء معلومات نسيجية وهرمونية عن الآفة دون اللجوء للوسائط الأكثر غزواً.

لمحة عن الطرائق: تم الاعتماد بشكل أساسي على شعبة التشخيص الشعاعي في مركز الطب النووي وذلك بمتابعة المرضى بشكل مباشر تقديمي (Anterograde) وذلك بإجراء صور الماموغرام كفحص دوري أو فحص للمتابعة بعد استئصال الثدي أو عند وجود أعراض تستدعي التصوير وانتقاء الحالات المناسبة لإجراء الخزعة.

نتائج البحث: من بين 62 حالة خزعة موجهة تم كشف 7 حالات سرطان غازي و 4 حالات سرطان قنوي موضع في المكان DCIS و 2 حالة فرط تصنع نموذجي وكان هناك حالة سلبية كاذبة واحدة.
التوصيات:

- 1- إجراء ماموغرام عند النساء فوق سن 40 سنة كل 1-2 سنة أو قبل 10 سنوات من سن الإصابة العائلية إن وجدت.
- 2- التأكيد على دور التوعية الطبية لكل من المرضى والجراحين على فاعلية الخزعة الموجهة بالستيرويدات كاستيرويد حيث أنها أقل تكلفة

خلال 150-90 ثانية يؤمن ظرفاً مناسباً للتطبيق ويستمر لمدة 28-37 دقيقة على الترتيب. وكانت جرعة الدعم الموافقة هي 0.03-0.02 ملغ/كغ التي حققت استمراراً للحصار من 9-13 دقائق.

أما معدل التسرب البدني فهو 3 مكغ/كغ/د، ويستمر على معدل 1-2 مكغ/كغ/د. وبذلك يكون السيس أتر كوريوم دواء فعال وأمن عند استخدام بالجرعات السابقة.

تسكين المرضى المحروقين

Pain Control In burns Patient

عيسى الشيخ. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. منى عباس

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة تأثير المسكنات

المختلفة على المرضى المحروقين بهدف انتقاء المسكن المثالي لكل مرحلة من مراحل الحرق وصولاً إلى حالة تسكين جيدة مع أقل قدر ممكن من التأثيرات الجانبية.

تمت الدراسة على 100 مريض من شعبة الحروق في مشفى المواساة، حيث تم تقسيم المرضى إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى شملت 30 مريضاً في المرحلة الحادة من الحرق أي خلال الأيام تم تسكينهم بالبيتيدين بجرعة 1 مع/كغ بالوريد. أما المجموعة الثانية فقد شملت 40 مريضاً في الثانية من الحرق أي بعد طور الإدرار تم تسكينهم الديكلوفيناك بجرعة 2 مع/كغ/24 ساعة مقسمة على دفعتين بالعضل.

المجموعة الثالثة تشمل 30 مريضاً خلال مرحلة تبديل الضمادات تم تسكينهم بالكيتامين بجرعة 1 مع/كغ بالوريد.

تبين من هذه الدراسة أن البيتيدين هو المسكن المثالي للمرضى خلال المرحلة الحادة من الحرق، حيث أظهر تسكيناً جيداً ونال رضى كل من المريض والطبيب بنسبة 100%. أما الديكلوفيناك فقد حقق نجاحاً بنسبة تفوقه 80% كمسكن جيد للمرضى المحروقين في مرحلة ما بعد الإدرار. في حين أظهر الكيتامين فعالية ممتازة كمسكن وريد أثناء تبديل الضمادات في أكثر من 93% من الحالات.

تمت هذه الدراسة في مشافي جامعة دمشق على عينة من 150 مريضاً وبأعمار بين 15-60 سنة، قسم المرضى إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى ولم تحضر بأي دواء فعلي، بينما تم تحضير المجموعتين الثانية والثالثة باستعمال الأتروبين والسكوبولامين على التوالي بجرعة 0.01-0.2 مع/كغ زرقاً عضلياً قبل المباشرة بـ 30-45د.

تبين هذه الدراسة أن جرعة التيوبنتون المطلوبة للتسويم انخفضت لدى تحضير المرضى بالسكوبولامين بنسبة 21%، كما أنه حقق درجة من التهذئة والتركين جيدة، تظاهرات بوسن ونسوة وعيون مغلقة، كانت نسبة الغثيان والإقياء عند الصحو في المجموعة الثالثة 20% وبعد ساعتين من العمل الجراحي 18%. بينما كانت النسبة عند الصحو 46% و 42% وبعد ساعتين من العمل الجراحي 24% و 28% في المجموعتين الأولى والثانية على التوالي.

نستنتج من هذه الدراسة أن السكوبولامين يمتاز بفعل مهدئ مركزي جيد، كما أنه يساعد في خفض المتكبلات التخديرية، ويقلل من تراكم التيوبنتون في الجسم. بالإضافة لذلك فهو يمتلك فعلاً مضاداً للغثيان والإقياء متوسط الشدة، وهذا ما يجعله اختياراً جيداً للعمليات الجراحية القصيرة وعمليات اليوم الواحد.

التهاب الكبد الفيروسي C وعلاقته بتشمع الكبد

Hepatitis C Virus And Its Relationship With Cirrhosis

وائل الأسدي. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. وديعه ربحاوي

يهدف هذا البحث إلى دراسة حالات التهاب الكبد الفيروسي بالحمة C ودراسة مرضى التشمع الكبدي وتحديد نسبة انتشار أضداد الحمة C عند مرضى التشمع حيث بلغت هذه النسبة حوالي 14% من مجموع المرضى المصابين بتشمع الكبد بالإضافة لذلك تم تحديد الفئات العمرية الأكثر إصابة بتشمع الكبد ودراسة المعالم الكيميائية الحيوية للمرضى المصابين خاصة عيار ناقلاات الأمين ALT وAST وكذلك عيار <math>GT\> والبيروبين وزمن البروترومين.

بحوالي 50% من الخزعة الجراحية مع نفس الدقة والحساسية تقريبا وأنها أقل غزواً.

ذوات الرئة المتكررة عند الأطفال

Recurrent Pneumonias In Chidren

كمال بكور. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. عصام أنجق

الهدف من الدراسة: إجراء دراسة إحصائية تتناول الأطفال المصابين بذوات الرئة المتكررة بين عامي 1998-2000 وإظهار مدى شيوع هذا المرض مثبتاً للقبول العام في مشفى الأطفال الجامعي وقد أدخل في الدراسة جميع الحالات للمرضى الذين شخصوا ذات رئة وأصيبوا في سوابقهم بذات رئة مثبتة شعاعياً مرتين خلال عام واحد أو أكثر خلال العمر.

عينات وطرق الدراسة

لقد بلغت نسبة ذوات الرئة المتكررة حوالي 0.5% من مجموع القبول العام في المشفى، و 5% من القبولات كذات رئة بشكل خاص. وكان هناك أرجحية خفيفة للذكور نسبة للإناث وأظهرت الدراسة أن أكثر سبب مؤهب لتكرار ذات الرئة هو الاستنشاق بأسبابه المختلفة بنسبة 42%. وأن أكثر من 75% من الحالات حدثت ذات الرئة لأول مرة تحت عمر السنة. وإن العلامات الأكثر شيوعاً هو فشل النمو حيث أن أكثر من ثلثي الحالات كان مخطط الوزن والطول دون الخط الخامس المنوي.

التحضير الدوائي بالسكوبولامين

Premedication With Scopolamine

خلدون الصغير. كلية الطب. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. هند الدغلي

تهدف هذه الدراسة إلى بحث تأثير السكوبولامين في تحقيق أعراض التحضير الدوائي، كالوقاية من الغثيان والإقياء التاليين للعمل الجراحي وكذلك فعله المهدى والمركن على الجملة العصبية المركزية وبالتالي قدرته على الحد من جرعة المنومات.

دراسة مقارنة بين التنظير الهضمي
والاختبارات المصلية لبيان علاقة الملوية
البوابية مع الالتهابات والقرحات الهضمية
**Comparative Study Between
Endoscopy And Serotests To
Show The Co-Relation Between
Helicobacter And Gastritis And
Gastro Ulcers**

ميسون أبو حبيب. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. ودیعة الریحاوي

الهدف من الدراسة: مقارنة نتائج التنظير الهضمي والفحص المخبري مع الأعراض السريرية الهضمية، وتحديد إمكانية تقديم المخبر معلومات إضافية في التشخيص، بالإضافة إلى معرفة مدى انتشار خمج الملوية البوابية عند اللاعرضيين وكذلك معرفتها عند المصابين باضطرابات هضمية، وتقدير مدى إمكانية الاستعاضة عن التنظير الهضمي

العلوي بالتفاعلات المصلية.

فلقد تمت الدراسة خلال الأعوام 2000-2001 في قسم الطب المخبري في مشفى المواساة التابع لجامعة دمشق على 180 مريض قسموا لمجموعتين: مجموعة الشاهد: 80 شخص لا يشكون من أية أعراض هضمية. و مجموعة المرضى 100 مريض شملت عسر هضم، 24 مريض التهاب المعدة، 13 مريض قرحة معدية، 34 مريض قرحة عجيقة.

وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:

- الاعتناء بالنظافة فيما يتعلق بالنظافة بالطعام والشراب والأيدي.
- ارتداء القفازات والاعتناء بالتعقيم عند المتعاملين مع مرضى الهضمية.
- التشخيص المصلي سهل وغير باضع.
- علاج المعوية البوابية يخفف الأعراض.
- يعتبر اختبار البحث عن أضداد المعوية البوابية اختبار مسح و لابد من طرق أخرى لوضع التشخيص القطعي مثل التنظير الهضمي وفحص الخزعات.

كما قمنا بدراسة مجموعة المتبرعين بالدم وتعيين نسبة انتشار أضداد الحمة C عند هذه المجموعة حيث بلغت هذه النسبة حوالي 0.66% من مجموع المتبرعين البالغ عددهم 150 متبرع.

سرطانات الحجرة عند النساء

**The Cancers Of The Larynx In
Woman**

معين حميرة. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. أكرم الحجاز

يعد سرطان الحنجرة من السرطانات النادرة عند النساء بالمقارنة مع الرجال، لكن حدوثه أخذ بالتزايد في السنوات الأخيرة، وقد تضمنت الدراسة النظرية لمحة جنينية عن تطور الحنجرة مع لمحة موجزة عن تشريحها العام وفيزيولوجيتها، كما تضمنت دراسة سرطان الحنجرة من حيث وبائياته، عوامل خطورته، سبل تشخيصه، تصنيفه، تظاهراته السريرية، تدبير وإنذاره.

أجريت الدراسة على 106 مريضات بين عامي 1991-2001. كانت ذروة الحدوث في العقدین الخامس والسادس، 52% مدخنات و 36.7% مصابات بفقر الدم. الشكوى الرئيسية المسيطرة كانت عسرة البلع في 40.5% من الحالات تليها بحة الصوت بنسبة 33.9%. من الناحية التشريحية المرضية 82% من الحالات كانت من نوع السرطان شائك الخلايا. وقد صنفت الحالات حسب موقع الورم إلى 42% خلف حلقي، 24.5% فوق مزمار - 45% مزمار، 2.8% تحت المزمار و 15% منتشر ضمن الحنجرة. كانت 65.3% من الحالات بالمرحلة الرابعة Stage IV ووجدت النقائل العقيدية في 32.6% من الحالات فيما لم يلاحظ وجود نقائل بعيدة.

التدبير الأساسي كان بالمعالجة الشعاعية وحدها لـ 66.6% من الحالات المعالجة مقابل 33.2% للجراحة المشتركة، والخيار الجراحي الأساسي كان استئصال الحنجرة التام وحده أو المشترك مع تجريف عنق.

متابعة المريضات كانت مخيبة الأمل حيث لم تتابع 62.8% منهم جلسة الأورام بعد تلقي العلاج مما أدى إلى صعوبة في تحديد الإنذار ومعدل البقاء بشكل دقيق.

- يفيد الاختبار المصلي في مراقبة مدى فعالية العلاج للمعوية البوابية.

تخدير المرضى البدنيين

Anesthesia Of Obese Patients

نضال خلف. كلية الطب. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. هند الدغلي

الهدف من الدراسة هو بيان ما يتميز به تخدير المرضى البدنيين من خصوصية ناجمة عن تأثيرات البدانة.

أجريت الدراسة على 100 مريض في مشافي الجامعة (بأعمار مختلفة) على الذين خضعوا لعمليات الجراحة البطنية وذلك من خلال دراسة وتقييم المرضى قبل العمل الجراحي ودراسة طرائق التخدير التخديري العام والناسحي وأخيراً أهمية المراقبة والعناية بعد العمل الجراحي.

وتم تسجيل النتائج على جداول خاصة أعدت لهذا البحث حيث تمت مقارنتها بدراسات عالمية مشابهة ثم وضعت نتائج هذا البحث والتوصيات من أجل الحصول على أفضل النتائج عند تخدير المرضى البدنيين.

دراسة سريرية حول دور بعض محاليل الإرواء في شفاء الآفات الذروية

Clinical Study About The Role Of Some Endodontic Irrigants In The Healing Of The Periapical Legions

جورج أيشوع. كلية طب الأسنان. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. فيصل ديب

يهدف هذا البحث إلى دراسة الفعالية المضادة للجراثيم لبعض محاليل الإرواء القنوية ضمن الأقفنية الجذرية المترافقة مع آفات ذروية مزمنة والمقارنة فيما بينها في سياق التطبيق السريري. حضرت أقنية 74 حالة سريرية بالطريقة التقليدية ورويت أقنيتها الجذرية بالإبرة التقليدية وأخذت العينات الجرثومية من القناة الجذرية قبل وأثناء وبعد التحضير القنوي وزرعت ضمن وسط الغراء الدموي المسخن وحضنت هوائياً ولا هوائياً لمدة عشرة أيام. دلت هذه الدراسة على أن جميع سوائل

الإرواء قد كانت أفضل من الماء المقطر، كما دلت هذه الدراسة على عدم وجود فارق إحصائي بين عدد الوحدات المشكلة للمستعمرات في المرحلتين الثانية والثالثة من تحضير الأقفنية المترافقة بالإرواء 2% CH.g (كلا وسطي الزرع) و 2% CH.g، 2% NaOCL، 5.25% (سائل الإرواء الماء المقطر (الشاهد).

دراسة مقارنة بين الفورموكريزول و الغلوتارالدهيد في بتر اللب على الأسنان المؤقتة عند الأطفال

A Comparative Study Between Formocresol And Glutaraldehyde In Pulpotomy Of Primary Teeth In Children

خالد مصطفى قبش. كلية

طب الأسنان. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد نبیه خردجي

هدفت هذه الدراسة إلى تقدير معدلات النجاح السريري والشعاعي لكل من الفورموكريزول والغلوتارالدهيد كل من الأداء السريري والشعاعي لكلتا المادتين وتقرير فيما إذا كان الغلوتارالدهيد يصلح كبديل مقترح للفورموكريزول. وقد تألفت عينة الدراسة من 156 رحي مؤقتة عند 51 مريض من الأطفال المراجعين لعيادة طب الأسنان بجامعة دمشق. حيث طبق عند كل طفل كلتا المعالجتين. ومن خلال ذلك توصلنا إلى الاستنتاجات التالية:

- 1- إن معدل النجاح السريري للغلوتارالدهيد 98.7% أعلى من معدل نجاح الفورموكريزول 90.6% مع وجود فارق إحصائي هام بينهما.
- 2- إن معدل النجاح الشعاعي للغلوتارالدهيد 88% أعلى من معدل نجاح الفورموكريزول 80% ولكن دون وجود فوارق إحصائية هامة بينهما.
- 3- إن معدل النجاح العام (سريرياً شعاعياً) للغلوتارالدهيد 86.8% أعلى من معدل النجاح العام للفورموكريزول 77.4%.

زياد الدين البغدادى كلية طب الأسنان. جامعة دمشق
إشراف: أ.د. محمد نبيه خردجي مشاركة: أ.
د. رياض باشو

يهدف هذا البحث إلى تقييم أحد الأنظمة الرابطة الوحيدة العبوة عندما يتم استخدامها جنباً إلى جنب مع المواد الترميمية التالية: الألمغم والكومبومير والكومبوزيت. قمنا في البحث المخبري بتقييم التسرب الحفافي وشدة الارتباط، وقمنا في البحث السريري بتقييم الأداء السريري لهذه المواد عندما تستخدم في ترميم الأسنان الدائمة والمؤقتة عند الأطفال. أوضح بحث التسرب الحفافي حدوث التسرب مع كل المواد الترميمية المستخدمة ولكن بدرجات متفاوتة. إن استخدام المبدئات ذاتية التخریش تسمح بحدوث تسرب أكبر من تلك التي تسمح بها طريقة التخریش الكلي باستخدام حمض الفوسفور. إن الحواف العاجية تسمح بتسرب أكبر من تلك الحادثة عبر الحواف المينائية. وأخيراً يسمح الألمغم اللصاق بأقل نسبة تسرب وخاصة عبر الحواف العاجية مقارنة بالكومبومير والكومبوزيت.

أوضح بحث شدة الارتباط تبانياً في قوى القص التي تبديها عينات المجموعات المختلفة في البحث. ولكن يمكن القول بشكل عام إن قوى القص التي تبديها مجموعات الكومبومير والكومبوزيت المحضرة بطريقة التخریش بحمض الفوسفور هي الأعلى، بينما أبدت المحضرة بطريقة التخریش بحمض الفوسفور هي الأعلى/ بينما أبدت مجموعات الألمغم اللصاق قوى قص متدنية، وأخيراً أبدت مجموعات الكومبومير المحضرة بطريقة التخریش الذاتي قوى قص متوسطة الشدة. تماثلت قوى قص بين الأسنان الدائمة والمؤقتة.

أوضح التقييم السريري لهذه المواد أداء جيداً لها أخذين بعين الاعتبار أن تطبيق المواد تم تحت شروط عمل سريرية أكاديمية. حدثت حالات فردية من الفشل إما بسبب سقوط الحشوة أو انكسارها، ولكن لم يحدث أي فشل بسبب نكس النخر أو الأثر. يوجد بعض العوامل السلبية التي أثرت على الحواف والتطابق اللواني للحشوات وتحتاج لمزيد من التطوير لتحسينها.

التقييم السريري للزرع عقب القلع

استخدام محاليل المخدرات الموضعية
الحاوية على المقبضات الوعائية عند مرضى
الداء السكري

Usage Of Local Anaesthetic Solutions Containing Vasoconstrictors in Diabetic Patients

ماجد العجمي. كلية الطب الأسنان . جامعة دمشق
إشراف: أ.د. محمد صفوان جابر

أجريت هذه الدراسة في قسم جراحة الفم والوجه والفكين في جامعة دمشق لبيان إمكانية أو عدم إمكانية استخدام المخدرات الموضعية الحاوية على الأدرينالين والنور أدرينالين عند مرضى الداء السكري.

تأولت دراستنا 168 مريضاً سكرياً تراوحت أعمارهم بين 20-79 سنة شمل العمل الفموي إجراء عملية تخدير فقط تجنباً لإثارة المريض وتخفيف الألم قدر المستطاع. وتمت معايرة

السكر مخبرياً خلال خمس فترات لملاحظة التغيرات الحادثة في مستوى سكر الدم بعد استخدام الليدوكائين 2% الحاوي على المقبضات الوعائية عند المريض السكري.

وقد تبين نتيجة الدراسة أنه يمكن استخدام المخدرات الموضعية الحاوية على المقبضات الوعائية بشكل آمن عند مرضى الداء السكري.

مقارنة بين مواد ترميمية مختلفة باستخدام
النظام الرابط في الأسنان الدائمة والمؤقتة
عند الأطفال

Evaluation Of A One-Bottle Adhesive System With Three Restorative Materials In Permanent And Primary Teeth In Children

Clinical Evaluation Of Immediate Implantation

عمر أحمد حمشة. كلية طب الأسنان
إشراف: أ. د. عاطف غانم النداف
مشاركة: أ. د. صفوان جابر

انتقينا دراسة نجاح الزرع بعد القلع مباشرة وذلك بهدف تقصير فترة الانتظار حتى شفاء مكان السن المفلوع وتخفيف فترة الدرد عند المرضى والمحافظة على ارتفاع العظم السنخي، ومقارنة نسبة نجاح الزرع الفوري مع الزرع المتأخر ودراسة أداء أنواع مختلفة من الطعوم العظمية.

• أجري البحث العلمي على 37 مريضاً (21 ذكراً، 16 أنثى) تم وضع عندهم 175 زرعة من خمسة أنظمة مختلفة وهي: فرياليت 2(5زرعات) برينمارك (18زرعة) بيت إيزي (40 زرعة) سيمادوس (51 زرعة) إمبرلانت(61زرعة).

• بلغ عدد الزرعات الإجمالي الموضوعة في الفك العلوي (74 زرعة) بلغ عدد الزرعات الإجمالي الموضوعة في الفك السفلي (101 زرعة).

• توزع عدد الزرعات حسب توقيت الزرع: فوري 65 فوري متأخر 19 متأخر 91.

• كان عدد الزرعات التي توبعت وعوضت 161 زرعة عند 33 مريض ولم نستطع تعويض 14 زرعة وضعت عند 4 مرضى.

كان عدد الزرعات الناجحة الإجمالي 156 زرعة من أصل 161 زرعة معوضة.

أما عدد الزرعات الفاشلة فكان 5 زرعات من أصل 161 زرعة.

كان عدد الزرعات الفاشلة ثلاث زرعات من نوع سيمادوس و زرعتان من نوع إمبرلانت.

كان عدد الزرعات الناجحة 170 زرعة توزعت حسب الزرع كما يلي

متأخر 88 زرعة أي بنسبة نجاح 96.7%.

فوري 63 زرعة أي بنسبة 96.92%.

غوري متأخر كل الزرعات ناجحة أي بنسبة 100%.

كان عدد الزرعات الفاشلة 5 زرعات من أصل 175 زرعة توزعت هذه الزرعات حسب توقيت الزرع كما يلي متأخر ثلاث زرعات أي بنسبة 3.3% فوري زرعتان أي بنسبة 3.08% فوري متأخر لا يوجد أي بنسبة 0%.

وهذه النسب تتماشى مع كافة الأبحاث العالمية الأخرى وتخرج بنتيجة أن الزرع بعد القلع مباشرة هو عملية يمكن تطبيقها بنجاح كبير على المرضى لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث.

دراسة شدة ارتباط بعض المواد المرممة مع عاج وميناء الأسنان المؤقتة والدائمة.

Study Of Bonding Strength Of The Some Restorative Materials To Enamel And Dentin In Permanent And Primary Teeth

ندى بشارة. كلية طب الأسنان. جامعة دمشق
إشراف: أ. د. بنية خردجي.
وبمشاركة: أ. د. فليب سعيد

قارن البحث شدة ارتباط الرانتج المركب Tetric Ceram(TC) وSpectrum TPH(S) والكومبومير Dyract و Compoglass F(C) و AP(D) مع عاج وميناء الأسنان الدائمة والمؤقتة عند استعمال المواد الرابطة (Excite(E) و Prime&Bond و sintac Sprint(SS)، NT(P&BNT) تجاه قوى القص وتجاه التسرب الحفافي.

شمل اختبار القص 240 سناً منها ضاحكاً و 120 رحي مؤقتة، قسمت إلى 24 مجموعة تحوي كل منها عشرة أسنان فكانت شدة الارتباط مع الميناء المؤقتة غير المسحوقة لمدة 15 ثانية بحمض الفوسفور 35% أو كانت 36% كافياً وحقق شدة ارتباط أعلى من 21.6 Mpa وترافق بنسبة مرتفعة من حالات فشل الارتباط ضمن

أشهر، حيث أجريت التجارب على الفك السفلي لـ 9 خراف.

في حين أجريت الدراسة السريرية والشعاعية على الأسنان المؤقتة للأطفال وروقت مدة 6 أشهر وسنة، وكان عدد الأسنان 10 سنًا.

وتم تقسيم كلا من الدراسات النسيجية والسريرية والشعاعية إلى 3 زمر رئيسية وهي زمرة التغطية المباشرة بالمادة الرابطة للعلاج والمرممة بالكبوزيت أو الكومبوزيت وشكلت الزمرة الأولى 40 سنًا أما الزمرة الثانية فقد تمكن تغطية ألبابها مباشرة باستخدام مادة ماءات الكالسيوم، ثم تطبيق المواد الرابطة للعلاج ثم الترميم بالكبوزيت أو الكومبوزيت 40 سنًا أما الزمرة الثالثة فقد تم تغطية ألبابها بماءات الكالسيوم ورممت دون مواد رابطة بالكبوزيت أو الكومبوزيت 40 سنًا.

لم تجد الدراسة النسيجية فروقاً هامة ومميزة بين الثلاثة بعد مرور أسبوع حيث كان رد الفعل اللبي عبارة عن ارتكاس حاد تمثل بحدوث احتقان وعائي شديد في معظم عينات الدراسة وتوافق أحياناً بنزوف ضمن اللب السنّي، وحدث وذمة نسيجية.

في حين لوحظت فروقاً هامة نسيجياً بعد مرور 6 أشهر على المراقبة بين كل من الزمرتين الأولى والثانية بالمقارنة مع الزمرة الثالثة، حيث تشابهت القراءة النسيجية لعينات الزمرتين الأولى والثانية بشكل أظهرت محضراتها نسيجياً لباً طبيعياً وعاجاً مرمماً في منطقة الانكشاف، أما محضرات الزمرة الثالثة فقد أظهرت استمراراً في الاحتقان الشديد، ورشاحة النهائية كثيفة أحياناً مع ميل باتجاه التليف ولم تظهر علامات على تشكل عاج مرمم مقابل الانكشافات اللبية.

كما برزت الدراسة السريرية والشعاعية معدلات عالية ومتقاربة من النجاح بين الزمرة الأولى والثانية حيث كانت معدلات النجاح وعلى الترتيب 92.5% و 95%، أما الزمرة الثالثة فقد أظهرت معدلاً من النجاح بعد مرور عام يقدر بـ 75%، وقد بين التحليل الإحصائي وجود فرق هام إحصائياً بين الزمرتين الأولى والثالثة، والزمرة الثانية والثالثة، وبمعنى آخر تفوقت الزمرتين

الميناء (20-70%)، لم تجد الدراسة فرقاً في إداء كل من الكومبوزيتات والراتنج المركب على مستوى الأسنان الدائمة والمؤقتة والميناء والعاج إذا تم التعامل معهما بالطريقة نفسها.

شمل اختبار التسرب الحفافي الطاحن المينائي 150 سنًا، 80 ضاحكاً و 70 ناباً مؤقتاً قسمت إلى 15 مجموعة كان مقدار التسرب الحفافي الطاحن المينائي أقل من اللثوي العاجي حتى في العينات الشاهدة ولم تجد الدراسة فرقاً في التسرب الحفافي الطاحن المينائي بين الأسنان الدائمة والمؤقتة، بينما على مستوى الجدار العاجي كان التسرب الحفافي في مجموعة (P&BNT+S) و (P&BNT+d) أعلى في الأسنان الدائمة أما في مجموعة (SS+C) فكان أعلى في الأسنان المؤقتة ودون فرق جوهري في بقية المجموعات. توافقت نتائج اختبار شدة ارتباط المواد المرممة تجاه قوى القص مع نتائج اختبار التسرب الحفافي على مستوى الميناء والعاج.

دراسة سريرية وشعاعية ونسيجية لردود الفعل اللبية في التغطية اللبية المباشرة باستخدام المواد الرابطة للعلاج بالمقارنة مع ماءات الكالسيوم على الأسنان المؤقتة

Clinical , Radiographical And Histological Study Of Pulp Tissue Reaction In Direct Pulp Capping With Dentin Bonding Agent Compared With Calcium Hydroxide In Primary Teeth

مهند لفلوف. كلية طب الأسنان. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد نبيه خردجي.

وبمشاركة: أ. د. دارم طباع

هدف البحث إلى مقارنة مادة ماءات الكالسيوم Syntac- مع المواد الرابطة للعلاج Dycal و Sprint و Opti-Bond Solo في التغطية اللبية المباشرة على الأسنان المؤقتة نسيجياً وسريرياً وشعاعياً.

وقد أجريت الدراسة النسيجية على الأسنان المؤقتة للخراف و التي روقبت مدة أسبوع وشهر و 6

أما عدد الزرعات الفاشلة فكان 5 زرعات من أصل 161 زرة.
كان عدد الزرعات الفاشلة ثلاث زرعات من نوع سيمادوس و زرعتان من نوع امبلاندت.
كان عدد الزرعات الناجحة 170 زرة توزعت حسب الزرع كما يلي
متأخر 88 زرة أي بنسبة نجاح 96.7%.
فوري 63 زرة أي بنسبة 96.92%.
غوري متأخر كل الزرعات ناجحة أي بنسبة 100%.

كان عدد الزرعات الفاشلة 5 زرعات من أصل 175 زرة توزعت هذه الزرعات حسب توقيت الزرع كما يلي متأخر ثلاث زرعات أي بنسبة 3.3% فوري زرعتان أي بنسبة 3.08% فوري متأخر لا يوجد أي بنسبة 0%.
وهذه النسب تتماشى مع كافة الأبحاث العالمية الأخرى وتخرج بنتيجة أن الزرع بعد القلع مباشرة هو عملية يمكن تطبيقها بنجاح كبير على المرضى لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث.

دراسة طرائق مقايسة مضادات الاختلاج

Study Assays Of Anti Convulsants

دعاء العليبي، كلية الصيدلة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. غادة الأخرس

بمشاركة: أ.د. أحمد حسن

الصرع Epilepsi عبارة عن انفراغ شحنات غير طبيعي في الدماغ ينتج عنه إصابة المريض بأشكال مختلفة من النوب حسب منطقة الإصابة، أهم أشكاله المعروفة: الصرع الكبير - الصرع الصغير - الصرع النفسي الحركي - حالة الصرع المستمر. يعالج الصرع جراحياً أو دوائياً باستعمال أدوية الصرع وأهمها الفينيتوينين موضوع البحث الذي يتميز بحركيته غير الثابتة. تمت مقايسة تركز الدواء في الدم بعدة طرق Hitachi- Immulite TDx-HPLC. وقد حسب معامل ارتباط هذه الطرق مع بعضها ومستوى الدلالة الإحصائية فكان $P > 0.05$ لكافة الطرق بينما معامل الارتباط:

$r = 0.98$	TDx- HPLC
$r = 0.994$	TDx -Immulite
$r = 0.997$	TDx- Hitachi

الأولى والثانية على الزمرة الثالثة من حيث النجاح، وهذا يؤكد إمكان استخدام المواد الرابطة بشكل آمن في التغطية اللبية المباشرة على الأسنان المؤقتة كما هو الحال باستخدام مآت الكالسيوم المختومة بالمواد الرابطة، وبطبيعة الحال فإنه من غير المنصوح به تطبيق الترميمات الراتنجية دون مواد رابطة فوق الانكشافات اللبية حتى في حال استخدام مآت الكالسيوم فوق الانكشاف مباشرة.

التقييم السريري للزرع عقب القلع

Clinical Evaluation Of Immediate Implantation

عمر أحمد حمشة، كلية طب الأسنان

إشراف: أ.د. عاطف غاتم النداف

مشاركة: أ.د. صفوان جابر

انتقينا دراسة نجاح الزرع بعد القلع مباشرة وذلك بهدف تقصير فترة الانتظار حتى شفاء مكان السن المقلوع وتخفيف فترة الدرد عند المرضى والمحافظة على ارتفاع العظم السنخي، ومقارنة نسبة نجاح الزرع الفوري مع الزرع المتأخر ودراسة أداء أنواع مختلفة من الطعوم العظمية.

- أجري البحث العلمي على 37 مريضاً (21 ذكراً، 16 أنثى) تم وضع عندهم 175 زرة من خمسة أنظمة مختلفة وهي: فرياليت 2) (زرعات) برينمارك (18زرعة) بيت ايزي (40 زرة) سيمادوس (51 زرة) امبلاندت (61زرعة).
- بلغ عدد الزعات الإجمالي الموضوع في الفك العلوي (74 زرة) بلغ عدد الزرات الإجمالي الموضوع في الفك السفلي (101 زرة).
- توزع عدد الزرات حسب توقيت الزرع: فوري 65 فوري متأخر 19 متأخر 91.
- كان عدد الزرات التي توبعت وعوضت 161 زرة عند 33 مريض ولم نستطع تعويض 14 زرة وضعت عند 4 مرضى.
- كان عدد الزرات الناجحة الإجمالي 156 زرة من أصل 161 زرة معوضة.

Comparative Stability Study for Sodium Diclofenac Injectable Solutions Nationally Manufactured

المصري. كلية الصيدلة. جامعة دمشق.

إشراف: أ. د. محمد عامر المارديني
تصنف مادة الديكلوفيناك ضمن زمر م مضادات
الالتهاب غير الستيروئيدية، وتتمتع بخواص مسكنة
للآلام ومضادات الالتهاب وخافضة للحرارة على
نطاق واسع.

تصنع هذه المادة في سوريا بأشكال صيدلانية
مختلفة منها المحاليل الحقنية. كان هدف الدراسة
التحقق من فترة الثبات المعنوية والمقترحة من قبل
السلطات الصحية في الجمهورية العربية السورية
للمحاليل الحقنية المصنعة وطنياً.

تمت أولاً دراسة مواصفات هذه المادة الدوائية
الاستوائية وطرق معايرتها، وطرق تحضير
المحاليل الحقنية. ثم أجريت دراسات ثبات مسرعة
وطويلة الأمد على الأشكال الحقنية المصنعة
وطنياً.

وأجريت المقاييسات بهدف حساب العمر على
الرف فكان مساوياً 39,5 سنة في درجة حرارة
25س. وتم أيضاً تحضير نواتج تخرب
الديكلوفيناك بطرق متعددة، ومن ثم كشفها
 وتميزها بهدف إجراء مقاييسات نواتج التخرب
الرئيسية

$r = 0.987$ HPLC – Immulite

$r = 0.983$ HPLC- Hitachi

كما درس تأثير الفينيتوين على المعالم الحيوية في
الجسم فوجد أنه يؤدي إلى ارتفاع بعضها (كريات
الدم) بعد فترة من العلاج لذا يتوجب إجراء مقاييسات
دورية كل ستة أشهر مع إجراء الفحوص الدموية
الوقائية لمنع حدوث التخریب الكبدي أو حالات
الانسداد.

دراسة انتشار بعض الحمات المعوية

Prevalence Of Some Entero Viruses

سوسن مرسل أبو عمر. كلية الصيدلة. جامعة دمشق

إشراف: أ. د. فوزة منعم

ومشاركة: أ. د. نيكول مولر لاش

تنتشر الحمات المعوية Entero Viruses في
البيئة، وتعيش في التربة والمياه والمحاصيل
الزراعية. وتنتقل إلى البشر عن الطريق الهضمي
غالباً، حيث تحدث العديد من الأحماج الخطرة،
والتي تترأح بين الأحماج اللاعرضية إلى إحداث
الشلل والموت.

لذلك فإن نقصي انتشار هذه الحمات يعد أمراً
ضرورياً بسبب ما يمكن أن تحدثه من أضرار
صحية واقتصادية.

وتبلغ النسبة العالمية لانتشار هذه الحملة
اللاعرضية للحمات المعوية ولا يعرف انتشار هذه
الحمات في بلدنا، لذلك عمدنا في هذه الدراسة على
نقصي انتشار الحملة اللاعرضية لكن التكاليف
العالمية لطريقة تشخيصها وهي الزرع الخلوي
Cell Culturing قيدت البحث بعدد محدود من
العينات.

كما هدفتنا في الدراسة إلى التوصل للطريقة المثلى
لتشخيص وجود هذه الحمات في السائل الدماغي
الشوكي عندما تسبب خمجاً في الجملة العصبية
المركزية، بطريقة سريعة وسهلة هي طريقة
التفاعل التسلسلي للبوليمراز Polymerase
Chain Reaction.

دراسة ثبات مقارنة المحاليل الحقنية وطنياً

لمادة الديكلوفيناك

حساني، عبد الرزاق، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. موفق السيد حسن

الموضوع: السياسة النقدية والتوازن الاقتصادي، واقع السياسة النقدية في سورية وأفاقها

Monetary Policy, and Economic Equilibrium, “Situation, Prospective of Syrian Monetary Policy”

إن الاقتصاديات المعاصرة هي اقتصاديات نقدية أي أن النقد يؤدي دوراً أساسياً وحاسماً فيها سواء كان ذلك على صعيد الفرد أو المؤسسة أو المجتمع. ونظراً لأن الاستقرار في قيمة النقد يعدّ من أبرز العوامل التي تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني فإننا نعتقد أن هدف استقرار الأسعار يعدّ الهدف الرئيسي للسياسة النقدية.

إن البحث من أجل تطبيق أي سياسة اقتصادية إنما يستلزم في نظرنا العمل على استكشاف الأسس النظرية لها فلا بد من أساس. ومن ثم وضع تصور ما للسياسة النقدية في سورية يقتضي دراسة التطورات المعاصرة في النظرية النقدية.

وهكذا تنقسم خطة العمل في هذه الأطروحة إلى قسمين: الأول نظري يتناول أهم التطورات المعاصرة في النظرية والسياسة النقدية. والثاني يبحث في واقع السياسة النقدية في سورية وأفاقها.

إن تهميش دور السلطة النقدية في سورية وما نجم عن ذلك من سلبيات أبرزها انعدام استقلالية مصرف سورية المركزي، وبروز التضخم نتيجة للتمويل المستمر لعجز الموازنة من المصرف المذكور، وتدني كفاءة النظام النقدي... الأمر الذي يحتم إعادة النظر في الطبيعة القانونية للسلطات النقدية وبنيتها الإدارية، وفي استراتيجية السياسة النقدية وأهدافها في سورية؛ بما ينسجم مع تعزيز استقرار الأسعار في الأجل الطويل، وتعبئة الموارد المالية لدعم التنمية.

وهكذا لا بد من وضع أسس لإصلاح النظام النقدي ويستلزم ذلك وجود سلطة وإدارة نقدية تتمتع بالاستقلالية والكفاءة ينتظر منها أن تكون قادرة في المرحلة الأولى على إعادة التأهيل المؤسساتي للبنية النقدية ابتداء من المصرف المركزي وانتهاء بالرقابة على المصارف واستكمال البنية التحتية للنظام النقدي.

ديب، عماد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عبد اللطيف عبد اللطيف

الموضوع: أثر استخدام الحاسوب في نظم المعلومات الإدارية (مثال جامعة دمشق)

The Effect of the Computer's Usage al the Managerial information systems. (The Example is Damascus University)

يتضمن البحث خمسة فصول رئيسية نظرية تتناول مفهوم المعلومات ونظم المعلومات والهيكل التنظيمي لنظم المعلومات فيتضمن دراسة ميدانية لمشروع أتمتة الأعمال الإدارية في الجامعة ولمهام ومسؤوليات مديرية النظم والمعلومات ولمراحل بناء المشروع من خلال بعض الأمثلة العملية؛ إضافة إلى توزيع استبيان على المديرين الذين يتعاملون مع الحاسوب لبيان النتائج المترتبة على هذا الاستخدام وصولاً لتحديد بعض المشاكل وتقديم بعض النصائح والمقترحات.

محمد نذير السقا، محمد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. طارق أحمد الخير

الموضوع: التسويق عبر شبكة الإنترنت في سورية

الواقع والآفاق (دراسة تطبيقية على منظمات القطاعين العام والخاص

المرتبطة عبر شبكة الإنترنت في دمشق)

Marketing on Internet in Syria Current Position & Prospects Field Study Applied on Public & Private Sector Institutions Using Internet in Damascus

بدأت شبكة الإنترنت بالدخول إلى منظمات القطاعين العام والخاص في سورية بدءاً من عام ١٩٩٨، ولكن من خلال الدراسات السابقة الاطلاعات الأولية تبين أن مدى الاستفادة من خدمات الشبكة لا يتناسب مع إمكانياتها المتعددة خصوصاً من الجانب التسويقي بعناصره الأربع: المنتج، السعر، التوزيع، الترويج. فالتسويق الذي يعد من الأسس الهامة لاستمرارية حياة المنظمات الاقتصادية، ولاسيما مع المتغيرات العالمية الجديدة الحاصلة التي تتميز في شدة المنافسة الدولية، وحرية التجارة العالمية، وثورة المعلومات والاتصالات عبر شبكة الإنترنت كل ذلك دعم أهمية وضرورة فتح آفاق تسويقية جديدة في سورية لعل أهمها التسويق عبر الإنترنت إلى المنظمات المحلية. ومن خلال ذلك قام الباحث بعرض مفاهيم شبكة الإنترنت والتسويق الحديث ومدى استخدامهما محلياً، ودراسة المعوقات التي تؤدي إلى تضيق العمل والاستفادة من خدمات الشبكة، ومدى تأثير القوانين الحكومية الصادرة في هذا الخصوص، ووضع البنى التحتية المحلية.

ولمعالجة ذلك قام الباحث بالدراسات والاستقصاءات اللازمة المدعومة من خلال فروض الدراسة ومحاولة إثباتها عبر البرنامج التحليل الإحصائي SPSS، في سبيل الوصول إلى نتائج تسهم في دفع عملية التسويق لدى المنظمات المحلية مع دخول شبكة الإنترنت إليها.

صندوق، عبد الكريم عفيف، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. موسى الضير

الموضوع: دور السياسة المالية العامة في تحقيق التوازن الاقتصادي مع إشارة خاصة إلى واقع الجمهورية العربية السورية

The role of the Public Financial Policy in realizing the economic equilibrium, with a special reference to the Syrian Situation

يبقى للسياسة المالية العامة الدور الأهم في تحقيق التوازن الاقتصادي العام.

لم يعد التوازن الاقتصادي العام في مفهومه الحديث يتضمن مؤشرات لمتغيرات اقتصادية كلية حقيقية وأخرى نقدية تعمل في شروط يجب المحافظة عليها فحسب، بل يتضمن في مفهومه أيضاً تعظيم مردود النظام الاقتصادي لأنه يفرض ضرورة أن يؤدي استخدام أدوات السياسة المالية العامة إلى تحقيق منفعة للاقتصاد الوطني تعادل على الأقل تلك التي حُجبت عن الدخل القومي نتيجة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، فهو يستهدف بذلك تعظيم النمو الاقتصادي، كما يتضمن في مفهومه -ثالثاً- تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والعمل للحد من تقلبات مستويات الإنتاج والأسعار وتجنب مشكلة البطالة وتعظيم مستوى الاستخدام.

إن استخداماً فعالاً للسياسة المالية العامة وتحقيق دور معاضد لكل من السياسة النقدية وسياسة التجارة الخارجية وغيرها من السياسات الاقتصادية يؤدي إلى تحقيق توازنات العرض والطلب، الإنتاج والاستهلاك، الادخار والاستثمار، والاستيراد والتصدير عند مستويات أعلى للاستخدام وعند قيم مناسبة لمعدلات الدخل القومي.

محمود السيد، رفيف، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عبد اللطيف عبد اللطيف

الموضوع: التقانات الحديثة وأثرها في إجراءات وتعليمات العمل في النظام المصرفي السوري

The Impact of new technology on work process in the Syrian system Bank

تبحث الرسالة في خصائص عصر المعلومات من حيث تأثيره في الإدارة ومفاهيمها وأساليبها؛ وكذلك في مبررات استخدام تقانات المعلومات في القطاع المصرفي، وأثرها في العمل من حيث الإجراءات والتعليمات، وضرورة إعادة هندسة العمليات الذي تفرضه هذه التقانات للاستفادة القصوى من استخدامها. أما الدراسة العملية فقد كانت مقارنة بين المصرف التجاري السوري والمصارف اللبنانية لمعرفة مستوى الأئمة وتأثيراتها في العمل من حيث الإجراءات والتعليمات وتحسين مستوى الخدمة المصرفية بشكل عام.

وقد خلص البحث إلى أن استخدام التقانات يؤثر إيجابياً في محتوى العمل إلا أن التأثير الإيجابي في إجراءات العمليات من حيث تبسيطها يتطلب إعادة تصميم كاملة للعمليات من جديد لتكون أكثر مرونة، وسهولة بحيث لا تكون عائقاً في وجه الاستفادة القصوى من استثمار هذه التقانات، وقد انتهى البحث إلى ضرورة الإسراع بالأئمة الشاملة للعمليات المصرفية في المصرف التجاري السوري، وإعادة تصميم عملياته بكامل إجراءاتها وتعليماتها بشكل يؤدي إلى تحسين الخدمة المصرفية المقدمة لربائعه وتقديم خدمات جديدة وتطوير القدرة على المنافسة.

محمد الأشقر، ميادة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. حسين القاضي، ومشاركة د. سوسن الحجار

الموضوع: دراسة نظام الجودة ISO 9000 وتحليل أثر تكاليف الجودة في تكاليف الإنتاج مع التطبيق العملي في شركة أديداس

Study of Quality System ISO 9000 and Analysis of Quality Costs Effect on Production Costs with Practical Application in Adidas CO

يحتّم اتخاذ القرار المناسب للاستثمار في مشروعات تحسين الجودة ضرورة تفهم إجارة المنشأة للعلاقات بين مكونات وأنواع تكاليف الجودة الأربعة (المنع، التقييم، الإخفاق الخارجي)، فعلى سبيل المثال: تؤدي زيادة تكاليف أنشطة التقييم إلى زيادة حجم اختبارات الإنتاج، ومن ثمّ اكتشاف عدد أكبر من الوحدات المعيبة قبل تسليمها للمستهلكين، الأمر الذي من شأنه تدنيّة تكاليف الإخفاق الخارجي نتيجة لانخفاض عدد الوحدات المعيبة التي كانت ستشحن للمستهلكين لو لم يتم اكتشافها.

ومع ذلك فإن تكاليف الإخفاق الداخلي يمكن أن تحدث وتزداد أيضاً نتيجة لذلك حيث ستزيد كمية الوحدات المعيبة وستزداد تكاليف إعادة التشغيل وإعادة الفحص. لكن نتيجة لذلك فإن إجمالي تكاليف الجودة سوف تنخفض نظراً لأنه من الأرخص والأفضل إصلاح المنتجات المعيبة داخل المنشأة منه عند العميل.

ويستحسن أن يتم الاتجاه والتركيز نحو تكاليف الوقاية والمنع مفترضين أن هذه الزيادة من شأنها تدنيّة احتمال اكتشاف المستهلكين للوحدات المعيبة، ومن ثمّ انخفاض تكاليف الإخفاق الخارجي دون أن تتأثر تكاليف الإخفاق الداخلي بهذه الزيادة. حيث يركز هذا الاتجاه على اكتشاف العيوب واستئصالها وتجنب أسباب حدوثها وليس التركيز فقط على أعراض المشكلة.

وخلاصة ذلك ترتبط تكاليف المنع والتقييم بتكاليف الإخفاق، وهو ما يعرف بأنثر الرافعة الذي يتحدد بتدنيّة الأموال المستثمرة والمنفعة على أنشطة المنع والتقييم، وتكاليف الإخفاق الداخلي والخارجي بالقدر الذي يتجاوز التكلفة الاستثمارية المبدئية.

البلخي، راتب، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. شفيق عربش

الموضوع: المعاينة الإحصائية وتطبيقاتها في مراجعة الحسابات

Statistical Sampling and its Application Auditing

لقد أدى ازدياد مجالات عملية المراجعة واتساعها إلى عدم قدرة مراجعي الحسابات على القيام بمراجعة جميع العمليات المالية والمستندية، لذلك ظهرت الحاجة إلى استخدام المعاينة الإحصائية بأساليبها المختلفة (البسيطة والطبقية...)، وذلك حتى يتمكن المراجع من إنجاز عملية المراجعة، ومن ثمَّ إعطاء رأي فني وموضوعي حول عدالة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المالي مع اكتشاف أي غش أو أية أخطاء متعمدة أو غير متعمدة في وقت سريع وتكلفة مناسبة.

ويهدف البحث إلى توضيح استخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة والطبقية في مراجعة الحسابات؛ لتمكين المراجعين من ممارسة عملية المراجعة، وتخفيض تكلفتها وتحقيق رقابة فعالة وصحيحة على الأموال.

زاهر، عناية، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. علي كنعان

الموضوع: دور المصارف التجارية في الاقتصاد الوطني – دراسة تطبيقية على المصرف التجاري السوري خلال الفترة ١٩٩٢-١٩٩٨.

**The role of commercial banks in national economics practical study
on Syrian commercial banks during 1992-1998.**

يتناول البحث أهمية المصارف التجارية في الاقتصاد الوطني ودور المصرف التجاري السوري في الاقتصاد الوطني.

وتوزيع البحث على أربعة فصول:

ففي الفصل الأول: بحث في دور المصارف التجارية في النظم الاقتصادية المعاصرة من خلال قيامها بأنشطتها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وخصص الفصل الثاني لبيان مدى تأثير المصارف التجارية بالاقتصاد الوطني عبر ما تفرزه السياسة الاقتصادية التي تتحدد بالمذهب الاقتصادي، وكذلك المحيط الاقتصادي الوطني والدولي الذي يؤثر بالمصرف التجاري وكيفية إدارة المصارف التجاري للمخاطر التي يتعرض لها.

وكان الفصل الثالث والرابع من نصيب الاقتصاد والمصرف التجاري السوري، فقد تطرق الفصل الثالث إلى نظرة تاريخية للنظام المصرفي السوري، وتحليل واقع المصرف التجاري السوري عبر تحليل موارده واستخداماته، وبيان أثرهما في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ضم دراسة تحليلية إحصائية لمعرفة آلية تأثيره في الاقتصاد الوطني السوري، أما الفصل الرابع فقد احتوى على مبحثين تناول الأول الإصلاحات التي يقوم بها المصرف التجاري السوري، وتناول المبحث الأخير أهم الإصلاحات المقترح تنفيذها على السياسة الاقتصادية وعلى المصرف التجاري السوري.

الجمعة المحمد موسى، حسن، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. حمزة حمزة

الموضوع: البيان بخبر الواحد وأثره في استنباط الأحكام الشرعية

Interpretation by Sole, and its Effect Concluding the Islamic rules

يهدف البحث إلى بيان النصوص الشرعية بخبر الواحد، والعمل به مقابلها، وبيان حالات العمل في الشريعة وضوابطه. ويدرس في الفصل التمهيدي البيان وخبر الواحد، ثم يدرس في الفصل الأول تخصيص العام بخبر الواحد، ثم يدرس في الفصل الثاني تقبيد المطلق بخبر الواحد، ثم يدرس في الفصل الثالث النسخ بخبر الواحد، ثم يدرس في الفصل الرابع بيان المجمل بخبر الواحد، ثم يدرس في الفصل الخامس التأويل بخبر الواحد، ومع بيان أثره في استنباط الأحكام الشرعية في كل ذلك.

روماني، هدى، كلية الاقتصاد، قسم الإحصاء، جامعة دمشق

إشراف أ.د. شفيق عريش

الموضوع: نماذج رياضية وإحصائية مبرمجة للتنبؤ وتطبيقاتها في دراسة

الآفاق المستقبلية لمعمل الشرق لللبسة الداخلية القطنية

**Mathematical and statistical Models Programmed for Forecasting
and its Application in Studying the Future Horizons for Al-Shark
Factory of Cotton Underwear**

قدّم في هذا البحث مجموعة نماذج إحصائية ورياضية تصف الواقع الإنتاجي والتسويقي والتقني لمعمل الشرق لللبسة الداخلية خلال الأعوام ١٩٩٠-١٩٩٩، وبين كيفية بناء هذه النماذج واستخدامها في عملية التنبؤ، وذلك بالاستعانة بالحزمة الإحصائية (SPSS). أنشئ نموذجاً يدرس كل منهما المتغيرات المستقلة المؤثرة في كل من كميات الإنتاج وكميات الإنتاج المفقودة، كما تم تحليل السلاسل الزمنية لكل من المبيعات الداخلية والمبيعات الخارجية والمخزون وإنتاجية عامل الإنتاج واستخرجت نماذج (ARIMA) التي تصف حركة هذه المتغيرات، ومن ثم استخدمت في التنبؤ للقيم المستقبلية للمتغيرات المذكورة أعلاه والعائدة للنصف الأول من عام ٢٠٠٠ حيث أثبتت نماذج (ARIMA) المستخرجة قدرتها على إعطاء تنبؤات ذات أخطاء ضئيلة. استخدم نموذج الانحدار لكميات الإنتاج في عملية التنبؤ بالاعتماد على تحليل السلاسل الزمنية حيث خلّلت السلاسل الزمنية للمتغيرات المستقلة المشكلة لنموذج الانحدار من أجل التنبؤ بقيمتها المستقبلية، ومن ثم تعوضها في هذا النموذج والحصول على القيم المستقبلية للمتغير التابع الممثل بكميات الإنتاج، كما خلّلت السلاسل الزمنية لقيم الأخطاء الناتجة عن نموذج الانحدار وتم التنبؤ بالقيم المستقبلية لهذه الأخطاء، ومن ثم أضيفت هذه القيم إلى قيم المتغير التابع المتنبأ بها من أجل زيادة دقة نتائج التنبؤ بنموذج الانحدار، وبيّنت النتائج أن نموذج لكميات الإنتاج أعطى تنبؤات أكثر دقة من تلك المحسوبة بواسطة نموذج (ARIMA). طُبّق التحليل الماركوفي في دراسة الواقع التقني لآلات الحياكة في المعمل عن طريق تتبع الحالات التي مرت بها كل آلة من حيث كونها إما دائمة التشغيل أو متوقفة عن التشغيل إما جزئياً أو كلياً، حُسبت قيم مصفوفات احتمالات الانتقال، ثم مصفوفات متوسط احتمالات الانتقال، وتم إثبات أنها مصفوفات مستقرة، ومن ثم استخدمت في تنبؤ الواقع التقني لهذه الآلات في شهر كانون الثاني عام ٢٠٠١.

قيلان، سمر، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. سليمان الفارس

الموضوع: مشاركة العمال في الإدارة وعلاقتها بالإنتاجية والروح المعنوية في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في القطر العربي السوري

Worker's Participation In Management and Its Relationship with Production and Morale Spirit In the General Organization For Textile Industry In Syria

نتعرض في بحثنا هذا لإحدى مشاكل إدارة الموارد البشرية التي تعاني منها شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وهي القصور في الاستخدام الفعال لأسلوب مشاركة العمال بالإدارة، مما يؤثر في دافعية العمال وإنتاجيتهم وروحهم المعنوية، حيث سنعمل على دراسة واقع مشاركة العمال بالإدارة في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، ومدى فعاليتها في تحسين الإنتاجية والرفع من الروح المعنوية للعاملين. ومن ثم تحديد المشكلات التي تعاني منها عملية المشاركة بالإدارة والكشف عن أسبابها وصولاً إلى تقديم حلول وتوصيات مناسبة لتلافي الثغرات وتخطي العقبات التي تعترض إنجاز أهداف الفرد والمؤسسة معاً. فأكدنا في هذا الشأن أهمية اختيار الأعضاء في اللجنة الإدارية أو المجلس الإنتاجي من ذوي القدرات الفكرية والمعرفية لتبادل الآراء وجهات النظر، ومن ذوي الخبرة الواسعة في مجال العمل. وقبل كل ذلك لا بد من توفر الرغبة لدى هؤلاء العمال بالمشاركة في اتخاذ القرار، والعمل، قدر الإمكان، على دراسة مواقف العمل بصورة جماعية في اجتماعات اللجنة الإدارية أو المجلس الإنتاجي، ومنح الأعضاء ولاسيما العمال الوقت الكافي للتضير للمواضيع المطروحة في الاجتماعات والمراد اتخاذ قرار بشأنها، وتدريبهم على الطرق العلمية في جميع المعلومات بحيث يتم استغلال هذا الوقت المتاح بالشكل الأمثل؛ وبما يخدم عملية اتخاذ القرار، وتأكيد قيام المدير العام بتقويض الأعضاء في قيادة الاجتماعات واتخاذ القرارات؛ بشرط أن هؤلاء الأعضاء مؤهلين لدرجة كافية. وأخيراً محاولة تطبيق أشكال وأساليب متطورة للمشاركة بالإدارة مثل حلقات الجودة التي يتم تطبيقها في بعض البلدان المتقدمة. وقد دلت الدراسات على تحقيقها لنتائج جيدة.

العمروري، محمد رسول، كلية الحقوق، جامعة دمشق.

إشراف: أ. د. يوسف شباط.

الموضوع: الرقابة المالية العليا ومدى حاجة القطر العربي السوري إلى هيئة رقابة مالية ذات طابع قضائي.

Le contrôle Financier Supérieur et le République arabe Syrienne à une Organization de contrôle Financier à caractère Judiciare

تتبع أهمية الرقابة على أموال الدولة من أهمية هذه الأموال ذاتها، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال من أموال الدولة العامة، أو الخاصة، ذلك أنها عصب الحياة بالنسبة لكيونة الدولة، وسبلتها الأساسية في الحفاظ على وجودها، وتأمين العيش الكريم لمواطنيها، وهي الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة، لا بل تأمين الرفاهية بأجل صورها لمختلف فئات الشعب.

وتعد الرقابة المالية من أهم الموضوعات التي تمس الكيان التنظيمي للدولة، ذلك أنها ضرورة لازمة لحماية المال العام، فضلاً عن أن تنظيمها من أدق مشكلات التنظيم وأهمها، لما لها من أثر فعال في سلوك الأفراد والجماعات، وما يعكسه ذلك من آثار على الاقتصاد القومي بوجه عام.

تم التطرق إلى موضوع البحث من خلال المحاور الثلاثة التالية:

الباب التمهيدي يتناول الفصل الأول منه مفهوم الرقابة المالية العليا وتنظيماتها الدولية، والفصل الثاني أجهزة الرقابة المالية في الدولة الإسلامية.

القسم الأول: يتضمن دراسة تحليلية لأنماط الرقابة المالية العليا في بعض الأنظمة، حيث شملت الدراسة أجهزة الرقابة المالية العليا في كل من فرنسا ولبنان ومصر والأردن.

القسم الثاني: تم من خلاله تركيز الضوء على واقع الرقابة المالية في القطر العربي السوري، وبيان مدى حاجة هذا القطر إلى هيئة رقابة مالية ذات طابع قضائي.

حيث إن هذه الرقابة تمارس الآن من قبل أجهزة متعددة يغلب على معظمها طابع الرقابة الداخلية، وهنا تتكرر وتتعدد الاختصاصات الرقابية مما ينعكس سلباً على أداء الأجهزة الإدارية في الدولة.

شربا، أمل، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. محمد عبد الله ومشاركة أ.د. سامي منصور
الموضوع: النظام العقاري في النظم القانونية الكبرى (اللاتينية- الجرمانية-
الأنكلوساكسونية)

Land System- In great systems: Latin-German- Anglo Saxon

يتناول هذا البحث دراسة النظام العقاري وفق منظار مقارنة للتشريع العقاري السوري مع التشريعات العقارية الحديثة.

وقد أوضحت هذه الدراسة أن نظام التسجيل العيني يتميز عن نظام التسجيل الشخصي بأن التسجيل فيه يتم على أساس العقار ذاته، بحيث تخص لكل عقار صحيفة في السجل العيني يقيد بها كل ما يتعلق بالعقار من بيانات وصفية وقانونية. مما يجنب أصحاب الشأن المخاطر المرتبطة بتشابه أسماء أصحاب الحقوق، لأن الكشف في السجل العيني لا يتم بالبحث عن اسم المالك وإنما يتم تعرف أصحاب الحقوق من خلال الصحيفة العينية العقارية. كما يتميز نظام التسجيل العيني بالدقة في إجراء عملية التسجيل العقاري، وذلك باتباع إجراءات إدارية وفنية وقضائية بإشراف هيئات متخصصة بالشؤون العقارية.

ومن أهم ميزات نظام التسجيل العيني أيضاً، أنه يسمح باستقرار الملكية والحقوق العينية، من خلال توظيف هيئات قضائية متخصصة في الشؤون العقارية، ومن خلال منح سبل طعن بالتسجيل، مما يؤدي إلى الفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ سواء بين المتعاقدين وغيرهم.

أخيراً فإن التنظيم الدقيق للصحائف العينية للعقارات يسمح بتجنب تعارض سندات تمليك، ويعد حاسماً في شأن تعرف صاحب الحق العيني العقاري، مما ينهي المشكلات التي تنشأ عن وضع اليد أو بيع ملك الآخرين. ففي هذا النظام يصبح السجل العيني هو المصدر الوحيد الذي يمكن من خلاله الحصول على سندات الملكية، وهذا يعني بالضرورة تطابقاً بين بيانات الصحيفة العينية العقارية، وبين الصور التي تؤخذ عنها والتي تعد سنداً للحق العيني العقاري.

محرزي، عبد المطلب، مي، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. يوسف شباط

الموضوع: الرقابة على تنفيذ النفقات العامة (دراسة مقارنة)

The Control on the Execution of Public Expenditure (A Comparative Study)

تعد الأموال العامة عصب الحياة للدولة والأداة الرئيسية لبلوغ غايتها الإنمائية. لذلك كان لا بد من الاهتمام بها وإحاطتها بسياس متين من الرقابة، يكفل عدم العبث بها بصرف النظر عن نوع هذه الرقابة. وقد حظي موضوع الرقابة على الأموال العامة باهتمام جميع الدول، ويبدو ذلك واضحاً من خلال تشريعاتها التي وضعتها للمحافظة عليها. وقد جاءت هذه الرسالة لتلقي الضوء على أسلوب الرقابة الذي يتضمنه التشريع المقارن (فرنسة ومصر ولبنان)، ومحاولة الاستفادة منه في تطوير الأسلوب المتبع في سورية.

يتضمن البحث، مقدمة وفصلاً تمهيدياً وبابين أساسيين وخاتمة.

- نتناول من خلال الفصل التمهيدي، التعريف بظاهرة ازدياد حجم النفقات العامة وأسبابها الظاهرية والحقيقية وضوابط الإنفاق العام.
- أما الباب الأول، فيتضمن دراسة تحليلية لأنماط الرقابة المالية ومفهومها ومعناها وتطورها التاريخي وأجهزتها في التشريع المقارن.
- ويختص الباب الثاني بدراسة الرقابة المالية في سورية وأجهزتها الداخلية والخارجية، وبيان أهمية إنشاء هيئة قضائية، مالية، مستقلة، وملحقة بمجلس الشعب، تمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. كما قدمت تصوراً لهذه الهيئة وطرائق عملها في الفصل الثاني من هذا الباب.
- أخيراً الخاتمة وتشمل خلاصة الدراسة وجملة من المقترحات والتوصيات التي توصلت إليها.

دندني، الحكم، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. سليمان الفارس

الموضوع: العوامل المؤثرة في اختيار المزيج الترويجي للسلع الاستهلاكية

"دراسة ميدانية في واقع الشركات المنتجة للمواد الكيميائية في محافظتي دمشق وريف دمشق"

Influencing Factors in Deciding the Promotional Mix for Consumer Products

يهدف البحث إلى دراسة واقع العوامل المؤثرة في اختيار المزيج الترويجي في شركات الصناعات الكيميائية عامة وخاصة- وذلك للوقوف على نطاق الخلل وأوجه القصور فيها وتقديم التوصيات التي يتوقع أن تسهم في زيادة الاهتمام بالعوامل المؤثرة في اختيار المزيج الترويجي. وقد تضمنت الدراسة شرحاً لعناصر المزيج الترويجي ولأهم العوامل المؤثرة في اختياره، بالإضافة إلى بعض البحوث والدراسات الحديثة المتعلقة بهذه العوامل.

أما الدراسة العلمية قد تضمنت عينة من شركات الصناعات الكيميائية عامة وخاصة في محافظتي دمشق وريف دمشق، وقد تم تجميع البيانات عن طريق استبيانات وجهت لمديري التسويق في هذه الشركات بالإضافة إلى طريقة المقابلة الشخصية والملاحظة. هذا وقد تم تحليل هذه البيانات بهدف اختبار فروض البحث ومعرفة الأسس التي يعتمد عليها مديرو التسويق في تلك الشركات- في اختبار المزيج الترويجي. وكنتيجة لما سبق توصل الباحث إلى جملة نتائج وتوصيات.

مرزا، معن، قسم إدارة الأعمال ، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. سليمان الفارس

الموضوع: سياسات إدارة قوى البيع وأساليب تطويرها

"دراسة ميدانية لواقع سياسات إدارة قوى البيع في شركات الصناعات الكيماوية الخاصة في

محافظة دمشق وريف دمشق"

Policies of Sales Force Management and Development Methods

يهدف البحث إلى دراسة واقع سياسات إدارة قوى البيع في شركات الصناعات الكيماوية الخاصة للوقوف على نقاط الخلل وأوجه القصور فيها وتقديم التوصيات والمقترحات التي يتوقع أن تسهم في تحسين أداء رجال البيع في هذه الشركات. وتضمنت الدراسة أهم النظريات والمبادئ العلمية المثبتة وأحدث البحوث والدراسات التي تمت مؤخرًا والمتعلقة بسياسات اختيار رجال البيع، تدريب رجال البيع، تحفيز رجال البيع، تعويض رجال البيع.

واشتملت الدراسة العملية على ثماني عشرة شركة من شركات الصناعات الكيماوية الخاصة في محافظة دمشق وريف دمشق، حيث تم تجميع البيانات منها عن طريق نموذجين من الاستبيانات الأول وجه لمديري المبيعات و الآخر لرجال البيع. وتم الاعتماد في تحليل البيانات المجموعة على البرنامج الإحصائي SPSS بهدف اختبار فروض البحث وتقديم إجابات لتساؤلاته الاستكشافية ورصد ودراسة العلاقات بين المتغيرات. وكنتيجة لما سبق توصل الباحث إلى جملة نتائج وقدم توصيات معينة.

اسلامبولي، مرام، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. نبيل الحلبي.

الموضوع: استخدام النسب المالية في التنبؤ بتعثر شركات الصناعات الغذائية العامة في سورية

Using Financial Ratios to Predict Financial Distress of General Food Industries Companies in Syria

تهدف الدراسة إلى اختبار إمكانية استخدام النسب المالية في تطوير نموذج رياضي يمكن الاستفادة منه في التنبؤ بتعثر شركات الصناعات الغذائية العامة في سورية. وبعد إجراء مراجعة شاملة لأهم مؤشرات تقييم الأداء والمفاهيم المرتبطة بموضوع التعثر بالإضافة إلى أهم الدراسات العالمية السابقة في هذا المجال تم تقديم تحليل مالي مفصل لسيرة كل من الشركات موضوع البحث وذلك على امتداد فترة زمنية تتراوح بين عامي ١٩٩١ - ٢٠٠٠ وذلك بهدف تعرف مفهوم التعثر في هذه الشركات وتقسيمها إلى مجموعتين من الشركات (متعثرة وغير متعثرة). وبالاستناد إلى كل ما سبق تم اختيار عشر نسب طبق عليها أسلوب التحليل التمييزي ذو الخطوات لاختيار النسب الأفضل في التمييز بين المجموعتين، وكانت النتيجة نموذجاً مكوناً من ثلاث نسب هي: ربحية المبيعات، نسبة السيولة السريعة، نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الموجودات.

ولدى إجراء مجموعة من الاختبارات الإحصائية تبين أن النموذج يحقق معدلات تصنيف صحيحة ومقبولة مما يسمح باستخدامه في التنبؤ بمستقبل هذا النوع من الشركات مع الأخذ بالحسبان ضرورة مراعاة العوامل غير الكمية المكملة لهذا النموذج عند إجراء عملية التنبؤ.

تميم، ختام، كلية الاقتصاد والتخطيط، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. عبد الرحيم بوادجي ومشاركة: أ.د. عبد الهادي يموت
الموضوع: العلاقة المتبادلة بين الصحة الإيجابية والوضع الاقتصادي
والاجتماعي في سورية

**Interrelationship between Reproductive Health and Socio-economic
Situation in Syria**

إن موضوع السكان وتأمين صحة سليمة لهم شغلت الإنسان منذ وجد على هذه الأرض. إلا أن الاهتمام بالسكان بدأ بالتزايد بشكل مطرد وملحوظ ومع هذا التزايد تقشت الأمراض أكثر فأكثر، وبدأ الإنسان يعمل جاهداً لمواجهة تحدي التزايد السكاني وما نتج عنه، وتمكن شيئاً فشيئاً من التحكم والسيطرة على أغلبها. مع تحسن الحياة الصحية للإنسان، تفاقمت مشكلة الاختلال بين الموارد المتاحة والنمو السكاني وخصوصاً في دول العالم الثالث، ومن بينها تأتي الدول العربية، وسورية واحدة من هذه الدول.

لقد حققت سوريا خلال السنوات الثلاثين الماضية إنجازات كبيرة في توفير رعاية صحية أولية أفضل وأشمل، من بينها رعاية صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة والتي يطلق عليها اسم رعاية الصحة الإنجابية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة وطيدة بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولذا لا يمكن دراسة وعلاج مشكلة النمو السكاني المتزايد والمتسارع، بشكل مستقل، بل يجب ربط النمو السكاني بمعالجة المشكلة الاقتصادية الاجتماعية، ومشكلة الصحة الإنجابية.

ومن المعروف أن الصحة الإنجابية على الرغم من خطوها خطوة إيجابية في الجمهورية العربية السورية. إلا أنه لا يزال يشوبها الكثير لكي تصبح قريبة إن لم تكن موازية لما هي عليه في الدول المتطورة. ومن هذه الاتجاهات السلبية التي يعاني منها مجتمعنا السوري لا بد من طرحها:

- النمو السكاني في سورية مرتفع جداً ٣,١ % لعام، ١٩٩٩.
- التفرق المعتدل والحاد لا يزال مرتفعاً جداً في سورية وهي ٢١ % لعام ٢٠٠٠.
- استخدام الملح وبنسبة قليلة جداً في سورية وهي ٤٠ % لعام ٢٠٠٠.
- عدد وفيات الأمهات الحوامل ١١٠ لكل ١٠٠,٠٠٠ ولادة لعام، ١٩٩٩.

يهدف البحث التعرف إلى مدى معرفة الشباب السوري بالصحة الإنجابية، دور العوامل السكانية والاجتماعية في تحديد المصادر، رؤيتهم المستقبلية لاستقاء المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية، وقياس هذه المعرفة عندهم وإلقاء الضوء على بعض المشكلات الاقتصادية والتربوية، والصحية، التي يتعرض لها الشباب وذلك عن طريق العينة، وإبراز دورها في التأثير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية، والوقوف على أهم المعوقات التي تحول دون تطور أمثل للصحة الإنجابية. ووضع اقتراحات وحلول لتوطيد ركائز الصحة الإنجابية، عند الشباب، لتأمين صحة نفسية جيدة، وصحة جسدية سليمة لهم كي تساهم في دفع عملية التنمية المنشودة.

فرحات، منى، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. حسين القاضي ومشاركة أ.د. أحمد حسين علي حسين
الموضوع: نظام التكلفة حسب الأنشطة "دراسة تطبيقية على إحدى الوحدات الاقتصادية في سوريا"

Activity-Based Costing System: Practical Study in one Economic Units in Syria

هدف البحث إلى دراسة تحليلية لنظام التكلفة حسب الأنشطة الذي انتشر تطبيقه في الكثير من الشركات الصناعية وخدمية الكبرى وفي هيئات القطاع العام في أنحاء العالم، والاستفادة من هذه الدراسة في وضع نموذج مقابل للتطبيق في إحدى الوحدات الاقتصادية في سورية.

تم الرجوع إلى العديد من الدراسات السابقة والمنشورات الصادرة عن هيئات المحاسبة والشركات الاستشارية الرائدة العاملة في مجال المحاسبة، وتم تحليل العديد من النماذج الموضوعية من قبل العديد من الباحثين العرب والأجانب، وذلك من أجل تعرف الظروف التي ساعدت على نشوء نظام التكلفة حسب الأنشطة ومفهومه ومراحل تطوره وآلية تطبيقه. وتم دراسة العديد من تجارب الشركات التي قامت بالتطبيق الفعلي لهذا النظام الجديد من أجل تعرف اتجاهات تطبيق هذا النظام وأهم المنافع التي جنتها الشركات من ذلك التطبيق وأسباب فشل بعض الشركات في تطبيق هذا النظام.

تبين من الدراسة أهمية نظام التكلفة حسب الأنشطة كنظام تم تطويره للتغلب على قصور نظام التكاليف التقليدي وعدم ملائمة للتطورات التكنولوجية واستخدام نظم التصنيع المتطورة. ولقد مرت عملية تطوير هذا النظام بعدة مراحل، وأصبح ينظر إلى نظام التكلفة حسب الأنشطة كجزء من نظام الإدارة حسب الأنشطة، حيث يتم الاستفادة من المعلومات التي يقدمها من أجل تحسين القيمة المقدمة للزبون. ساعد تطبيق نظام التكلفة حسب الأنشطة على الحصول على بيانات تكلفة أكثر دقة من البيانات التي يقدمها نظام التكاليف التقليدي، وتحسين عملية اتخاذ القرارات الإدارية، وترشيد توزيع الموارد، ودعم عملية التحسين المستمر.

كريم، شوقي، عفيف، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. خالد الخطيب، ومشاركة أ.د. فوزت فرحات
الموضوع: أثر الربح المحاسبي في تحديد العبء الضريبي على الضرائب على
الدخل (دراسة مقارنة)

The Effect of Accounting Profit on the Income Tax Burden

يعرف العبء الضريبي الفردي بأنه نتيجة حاصل قسمة مجموع الضرائب على دخل الفرد إلى مجموع دخله قبل اقتطاع الضرائب خلال فترة معينة من الزمن، وهذا العبء الضريبي الذي يبلغ ١٠ % بالنسبة لفرد ذي دخل ضعيف هو أكثر وطأة من العبء الضريبي الذي يبلغ ٣٠ % لفرد ذي دخل مرتفع، إضافة إلى ذلك فإن العبء الضريبي الفردي يزداد في الكيان الضريبي الذي تعقدت تشريعاته لتوالي التعليمات التي تطرأ عليه، ولتعدد وتنوع ما تتضمنه من إعفاءات وتخفيضات وإضافات تؤثر كثيراً من الصعوبات أمام الإدارة الضريبية ذاتها بصدد تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وتحصيل قيمة الضريبة بعد إجراء التعديلات المختلفة على الأرباح المحاسبية.

من جهة أخرى فإن العبء الضريبي للمجتمع في الدول النامية، والذي هو النسبة بين مجموع الضرائب على الدخل التي يتم تحصيلها خلال فترة معينة وبين الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها لا يتجاوز ١٠ % في حين تتجاوز هذه النسبة في الدول المتقدمة ٢٥ %، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في حجم الاستقطاع الضريبي في الدول المتقدمة فإنه لا يشكل عبئاً بالنسبة للمكلفين الذين يرتفع مستوى دخولهم ارتفاعاً كبيراً إلى الحد الذي لا يؤثر فيه الاستقطاع الضريبي على مستوى معيشتهم ومقدرتهم على الادخار والاستثمار والإنتاج ورغبتهم في العمل. إضافة إلى أنه بحساب معدل مجموع الضرائب على الدخل إلى إجمالي الإيرادات الضريبية الفعلية في الدول النامية نجد أن هذه الإيرادات، ورغم أهميتها، غير قادرة على تمويل برامج التنمية.

ولعل من أهم أسباب تدني الإيرادات الضريبية في الدول النامية:

- ١- انخفاض الدخل الفردي، حيث يحتل القطاع الزراعي المرتبة الأولى بين القطاعات المنتجة في هذه الدول.
- ٢- عدم الشفافية والوضوح في التشريعات الضريبية وتعليماتها بسبب قدمها، والافتقار إلى إدارة ضريبية تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة.
- ٣- اتساع نطاق الإعفاءات الممنوحة إلى فئات عديدة من المكلفين، والذي يؤدي بدوره إلى عدم تحقيق العدالة في فرض الضرائب عليهم.

الخياط، محمد أسامة ، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: د. بطرس ميالة، و مشاركة د. علي كنعان
الموضوع: موازنة البرامج والأداء وإمكانية تطبيقها على الموازنة العامة للدولة في سورية

Programs & Performance Budget and the Possibility of Its Application on the Public Budget in Syria

تحتل موازنة البرامج والأداء أهمية خاصة في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيهه؛ لذلك قام الباحث بإعداد دراسة تتناول بشكل أساسي النقاط التالية:

- ١- بيان أنواع الموازنة العامة للدولة وفقاً لمراحل تطورها وتوضيح سلبيات وإيجابيات كل منها.
- ٢- تعرف موازنة البرامج والأداء من حيث: مفهومها- تعريفها- شروط تطبيقها- الصعوبات التي تواجه هذا التطبيق- طرق إعدادها وتنفيذها ورقابتها- العناصر الأساسية المكونة لها.
- ٣- التعرف واقع الموازنة العامة للدولة في سورية ووضع الأسس والتوصيات اللازمة لتطويرها إلى موازنة برامج وأداء من خلال تقديم مشروع عملي مقترح من الباحث لتطبيق موازنة البرامج والأداء في مركز الطب النووي بالإفادة من الدراسات العلمية والتجربة الأردنية في هذا المجال.
- ٤- خاتمة وتوصيات البحث.

كنان مالك، ندة، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. حسين القاضي

الموضوع: دور مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في ظل الإدارة بالأهداف

**The Role of the Inspectors in Central Institution for Financial Control
under Management by Objectives**

يهدف البحث إلى تقديم إطار عمل إلى مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية بما يتلاءم مع مفهوم الإدارة بالأهداف وأسلوبها بقصد تفعيل عملية المراجعة الحكومية التي يقوم بها الجهاز في سورية ولتحقق الدور المطلوب منها. وفي إطار ذلك يدرس الباحث في الباب الأول أسلوب الإدارة بالأهداف من حيث مفهومها وطبيعتها والتطبيقات العملية لها في ظل الإصلاح الاقتصادي في سورية، ثم دور المراجعة الحكومية وأهميتها.

في الباب الثاني يدرس الأثر القانوني في تطبيق هذا الأسلوب على عمل الجهاز، وأسلوب المراجعة الملزم كإطار عمل للمفتشين. أخيراً، في الباب الثالث دراسة ميدانية وإحصائية لواقع الرقابة المالية وإمكانية تطويرها.

العفاش، ممدوح، كلية الشريعة، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. وهبة الزحيلي
الموضوع: وسائل الإعلام في التشريع الإسلامي
Mass Media in Islamic Sharia

الحمد لله الذي خلقنا ودعانا إلى معرفته وعبادته والإيمان به والإعلام عنه الذي قال في كتابه الكريم : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات : ٥٦/٥]

والإعلام في التشريع الإسلامي عبادة قولية وعملية، روحية وعقلية، فيما بين العبد وربّه وفيما بينه وبين الناس، تعتمد على بذل الجهد الممكن من قبل الفرد أو الجماعة أو الدولة المسلمة من أجل إيصال الحقائق الدينية والأحكام الاعتقادية والوجدانية والعملية من مصادرها التشريعية إلى الناس كافة في كل زمان ومكان عن طريق مختلف الوسائل الإعلامية، بأسلوب إعلامي ذي منهج إسلامي.

ولعل القرآن الكريم المعجزة الكبرى والرسالة الإعلامية الخالدة لدى الأمة الإسلامية خاصة، ولدى العالم كله عامة، هو المعجزة الإعلامية الربانية الأولى التي اتسمت بالعمومية والشمولية والعالمية.

أما المصدر الثاني للإعلام الإسلامي فهي السنة النبوية الشريفة التي صدرت عن الداعية المثل والإعلامي الأول محمد صلى الله عليه وسلم الذي استطاع أن يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة خلال فترة أذهلت عقول رجال الفكر والحرب والعلم وذلك وفق أسس فنية إعلامية دعوية لم يعرف الإعلام المعاصر لها مثيلاً. وذلك من خلال الاتصال الشخصي والجمعي والإعلام الدولي وال جماهيري. وهو النبي الأمي الذي لم يدرس الإعلام في المعاهد ولا الجامعات، ولكنه تعلمه من لدن حكيم.

إنه الإعلام الإسلامي الذي يعتمد الصدق والأمانة والموضوعية سواء في خصائصه أو ميزاته، أو عناصره وأهدافه. الذي يعتمد المنهج الرباني والفكر النبوي، قال الله تعالى: (قل لنن اجتماعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) [الإسراء: ٨٨/١٧].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)).

عبدو قياسية، ندى، كلية الشريعة ، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. مصطفى البغا ، ومشاركة، أ.د. محمد خير هيكل
الموضوع: أحكام الحمل في الفقه الإسلامي

The Rules of Pregnancy in the Islamic Jurisprudence

الحمد لله الذي أكمل هذا الدين الحنيف وأتم نعمته على خلقه بهذه الشريعة الإسلامية المثالية الواقعية المحكمة الترابط والمنظمة البنيان في مراحل حياة الإنسان وكل ذلك لسعادته الدنيوية والأخروية.

يدور محور هذه الأطروحة حول المرحلة الأولى من حياة الإنسان والتي يشترك فيها مع أمه التي تحمله في بطنها مدة من الزمن إلى أن يحين موعد جلوسه على مائدة الحياة... هذه المرحلة التي يشترك فيها الجنين مع أمه الحامل في جملة من الحقوق الشرعية التي تمتن روابطهما في المجتمع.. وهذا ما نتحدث عنه المقدمة والتمهيد لكل خطوة في هذا البحث.

أما الباب الأول: الذي يتحدث ضمن سطورهِ عن المنهج المتكامل التي تسري فيه رعاية الشريعة الإسلامية في أحكامها لحقوق الأبوين في اتخاذ الأساليب الوقائية لتنظيم الحمل وفق الطرق والإجراءات المشروعة سواء أكانت وسائل طبيعية أم صناعية ضمن ضوابط القاعدة الفقهية ((لا ضرر ولا ضرار)).

وفي الباب الثاني:

توسعت في مجال الحكم الإلهية الملزمة والتي تحصن الحقوق الشرعية لتكون حماية للأم الحامل ضمن رخص خاصة بالمرأة الحامل دون الحائل، وما يكون لها من حقوق وما عليها من واجبات في المحافظة على حياة الحمل ورعايته.

والمحور الأساسي في هذا الباب صور الجنائية وألوانها وحماية الشريعة للجنين وأمه. وهذا دليل آخر على مثالية الشريعة الإسلامية وواقعيتها في رعايتها وصيانتها للحمل.

وأما الباب الأخير: فهو يتحدث بدوره عن الحقوق التي تخص الجنين والتي تحقق له اكتسابها في طور الاجتنان ضمن رعاية الشريعة الإسلامية للجنين بمنحه نوعاً خاصاً من الأهلية في هذا الطور من حياته وهو يشق طريقه في سلم الحياة، من أجل أن تحفظ حقوقه كاملة غير منقوصة.

حوران، محمد سليمان كلية الشريعة ، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد فاروق العكام

الموضوع: ضمان الضرر المالي غير المادي - دراسة مقارنة بين الفقه والقانون

Financial not Material Damage Insurance a Comparative Study between Law and Islamic Fiqh

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فإن موضوع رسالتي في الماجستير، والتي جاءت بعنوان ""ضمان الضرر المالي غير المادي، دراسة مقارنة بين الفقه والقانون""، يتناول الأضرار المالية غير المادية كضرر فوات الربح، وضرر فوات المنفعة، وضرر فوات الفرصة والضرر المعنوي ومدى ضمانها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ذلك أن هذه الأضرار تسبب للإنسان فوات ربح أو ضياع مصلحة أو حقاً متعيناً له، لذا فإن قواعد الإسلام العامة ومقاصده التشريعية والقوانين المدنية الوضعية توجب ضمان هذه الأضرار محافظة على أموال الناس وحقوقهم، وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة التي أرسى قواعدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ""لا ضرر ولا ضرار""^(١).

وهذا نفي للضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه. أما قبل وقوعه فيكون بنفي ما من شأنه أن يؤدي إليه من كل فعل غير مشروع، وأما نفيه بعد وقوعه، فيكون بتضمين الضار جبراً لما فوت على المتضرر من حق.

(١) أخرجه ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/٢٣٤٠ وجاء في التلخيص الجبير: ٤٣٨/٢
""أنه مرسل من رواية مالك. وقال ابن صلاح إنه حسن. وقال ابن داود هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه"".

السقا، موسى عبد الكريم، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد الحسن مصطفى البغا

الموضوع: التطبيقات المعاصرة للكفالة

Contemporary Application of the Guarantee

بعد موضوع الكفالة من الموضوعات المهمة في عصرنا لتعدد التطبيقات المعاصرة له، والدراسة التي يحويها هذا البحث دراسة مقارنة بين مذاهب الفقه الإسلامي والوضعي. فعملت على ربط الماضي بالحاضر وشملت كل ما يمكن تخريجه على عقد الكفالة من خدمات مصرفية وغيرها. وقد جعلت هذا البحث مشتملاً على فصل تمهيدي وستة فصول وخاتمة: تضمن الفصل التمهيدي منه ملخصاً لأحكام الكفالة في الفقه الإسلامي والوضعي، أما الفصول الستة التالية فقد خصصت للتطبيقات المعاصرة للكفالة وهي ما يأتي: خطابات الضمان المصرفية، الاعتمادات المستندية، التأمين، الأوراق التجارية، بطاقات الإتمان، كفالات استقدام الأجانب في دول الخليج. وقسم كل فصل إلى مباحث عدة عرض فيها نظرة عامة لكل من هذه الموضوعات وأحكامها الشرعية والوضعية.

الخاتمة وفيها التوصيات والنتائج.

عبد الرزاق الخطيب، محمد أيمن، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد الحسن مصطفى البغا

الموضوع: أحكام الأنهار والينابيع في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)

The Rules of Rivers and Springs in the Islamic Purism (Comparative Study)

إن الماء من اعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، وليس هناك سائل آخر يحل مكان الماء فيما يقدمه من منافع.

إن للإسلام موقفاً محدداً من قضية توزيع المياه في البيئات حسب الأولويات، فالإنسان أولاً، ثم الحيوان، ثم النبات وباقي الكائنات الأخرى.

وتعد الأنهار العظيمة ملكاً مشتركاً لكل الدول الشاطئية التي تجري في أراضيها ولذلك لا يجوز لدول المجرى الأعلى أن تتحكم في دول المجرى الأسفل بأن تملك الماء وتمنعه منها بحجة السيادة على المنبع، لأن من الواجب أن ينظر إلى الماء بأنه سلعة تقدم بالمجان لكل من يحتاجها على مستوى الأفراد والجماعات ما دامت في مجاريها الطبيعية، أما لو أن شخصاً حاز شيئاً منها بعمل أو جهد بذله فلا بأس بأخذ ثمن هذا الماء المحرز، وهذا ينطبق على الأفراد في المجتمع الواحد وعلى الجماعات في الحوض المائي الواحد.

ومن الواجب على كل الدول أن تتنظر إلى الماء باعتباره أساس الحياة، وليس سلعة تستخدم للضغط على الدول الأخرى في أمور السلم والحرب للتنازل عن بعض الحقوق، لأن الشريعة الإسلامية قررت أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكأ والنار.

وحرصاً على صحة الإنسان وتأمين الماء الصالح للشرب، فقد دعت الشريعة الإسلامية إلى الحفاظ على موارد المياه وعدم تلويثها، وقررت مسؤولية المباشر أو المتسبب عن تلويث الماء المشترك إن أدى ذلك إلى ضرر بالآخرين.

وهذا الذي ذكرناه يمكن أن نطبقه الآن على واقع نهر الفرات التي تدعي تركيا ملكية منبعه ومن ثم لها الحرية بمنع المياه عن دول المجرى الأسفل، وهذا لا يؤيده شرع ولا قانون دولي ولا أعراف دولية.

صباهي، محمد ربيع، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد فاروق العكام

الموضوع: جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي

Juvenile's Crimes in Islamic Law

تعد مشكلة جرائم الأحداث في الوقت الحاضر من المشاكل الخطيرة التي تهدد الكثير من المجتمعات.

وقد ساعد على تفاقم هذه المشكلة وتزايد خطرهما ما يسود المجتمعات من اختلال النظم واضطراب الحياة الاجتماعية فيها، وانشغالها عن علاجها بما تراه أكثر نفعاً من المشاريع الاقتصادية والإنمائية المعاشية ونحوها.

وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مشكلة جرائم الأحداث، فبدأت بالحديث عن عوامل هذه الجرائم وأسبابها في الباب التمهيدي، وكانت هذه العوامل قسمين:

- العوامل العامة وهي العامل الديني والأخلاقي والاقتصادي والاجتماعي.
- العوامل الخاصة وهي العامل الجسدي (البدني) والنفسي.
- ثم جاء البحث في أحكام هذه الجرائم في ثلاثة فصول:
- الأول: أحكام جرائم القصاص.
- الثاني أحكام جرائم الحدود.
- الثالث: أحكام جرائم التغرير والإتلاف.

بينما اختص الباب الأخير بتفصيل ما شرع في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من طرق الوقاية من هذه الجرائم والتدابير التي تكفل علاجها واستئصالها.

وقد تم التعرض في أثناء ذلك إلى التدابير الإصلاحية والتأديبية التي نصت عليها القوانين الوضعية في سبيل الأخذ على يد الحدث ومنعه من معاودة الجريمة أو التوجه إليها بعد مقارنة هذه التدابير بما جاء في الفقه الإسلامي.

ثم كانت النتائج التي خرجت بها الدراسة والمقترحات التي توصلت إليها.

وانتهت الدراسة بالخاتمة التي اشتملت على ملخص للدراسة وبيان فوائدها.

محمد المحمد، محمد نجدت، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. وهبة الزحيلي

الموضوع: ضمان العقد في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون)

The Contract Security in Islamic Law (Study Compared with Law)

ضمان العقد في الإسلام موضوع مهم، لأن الضمان يحفظ الحقوق والمصالح وقيم العدالة الاجتماعية بين المتعاقدين. ومن الناحية الإفتائية والقضائية واجب على المفتي والقاضي أن يكونا ضليعين بمسائل الضمان لأن الخطأ فيها يؤدي إلى ضياع الحقوق بين الناس.

والواجب على كل مسلم بيع ويشترى ويستأجر ويؤجر ويوكل ويرهن... الخ. أن يعرف ما له وما عليه. ومتى يلتزم بالتعويض للمتعاقد الآخر إن أضر به أو قصر في حقوقه، ومتى يستحق التعويض عن الضرر من الطرف الآخر.

وأيضاً على كل مسلم أن يلتزم التزاماً دينياً وخلقياً أن يبتعد عن الغش والخداع في المعاملات، وعليه أن يتبين عيب السلعة المباعة وأن يضع نصب عينيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

ولكن عندما تقل الأمانة ويقل الخوف من الله ينتشر الظلم في التعامل مما يؤدي إلى ضياع الحقوق، وهنا يأتي واجب القاضي والمفتي في رد الالتزامات إلى الحالة الطبيعية قبل وقوع الخطأ المتعمد أو غير المتعمد، وهذه هي العدالة الاجتماعية.

من هنا تأتي أهمية هذه الرسالة، ثم تأتي المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني لتكشف كم تأثر القانون بأحكام فقهاء المسلمين.

والدراسة المقارنة لها أهميتها للباحث والقاضي والمفتي، إذ أنها تنمي الملكة العقلية وتفتح بناابيع المعرفة وهي من أهم الأسس لتوحيد القوانين في البلاد العربية، كما أنها تظهر مدى استفادة القانون من الشريعة الإسلامية.

ثم كانت هناك كثير من التطبيقات المعاصرة للمسألة الفقهية كما تجرّيها المصارف وبيوت التمويل الإسلامية وغيرها، مع معرفة أصلها الفقهي حتى يكون التعامل مع هذه المصارف حلالاً شرعاً.

الخطيب الحسيني، مصونة، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف أ.د. وهبة الزحيلي

الموضوع: الباعث وأثره في العقود والتصرفات في الفقه الإسلامي

The Motive and it's Trace in the Contracts and the Conducts in the Islamic Jurisprudence

شرع الله لعباده من الحكام ما فيه صلاح أمرهم في حياتهم ومعادهم، فبين لهم الهدف والغاية والسبيل التي ينبغي أن يسلكوها للوصول إلى أهدافهم فحثهم على الإخلاص في نياتهم. ولا خلاف بين العلماء أن النية الباعثة على العمل هي مدار حل الفعل وحرمة، فليس للإنسان من عمله إلا ما نواه وقصده والأصل في هذا الحديث المشهور ""إنما الأعمال بالنيات"" وهذا ما يعرف بالحكم الدياني لكن وقع الخلاف بين العلماء في الحكم القضائي أي في أثر الباعث على صحة العقد وفساده. وقد انقسمت آراء الفقهاء بشأن أثر الباعث إلى اتجاهين:

- فمنهم من غلب على فروعه وأصوله الأخذ بظاهر القول من غير بحث في النيات الباعثة فلا أثر للباعث عندهم، ويشترطون للبحث فيه ظهوره في دائرة التعاقد، ويمثل هذا الاتجاه الحنفية والشافعية.

- ومنهم من أخذ بالنيات والبواعث ولم يشترط للبحث فيها ظهورها على متن العقد ما دام الطرف الآخر على علم بها، ودلت القران والأمارات على أن العاقد يقصد بعقده التوصل إلى الحرام، ويمثل هذا الاتجاه المالكية والحنابلة، هذا طبعاً بعد استكمال العقد لأركانه وشروطه الشرعية أو ما يعرف بكيان العقد الفني.

الصباغ، رفيف، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد الحسن البغا

الموضوع: حفل الزفاف في الفقه الإسلامي (ضوابطه وأحكامه)

Wedding in Islamic Jurisprudence (Criteria and Rulings)

إن حفل الزفاف نشاط اجتماعي يقام بمناسبة إهداء العروس إلى زوجها، يضم أعمالاً متنوعة تهدف إلى إظهار الفرح والسرور وإعلان النكاح. ويتناول هذا البحث حفل الزفاف بالدراسة ويبين أحكامه في الشريعة مستمداً مادته من المذاهب الأربعة المشتهرة ""الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي"" مع ذكر أدلة كل مذهب والمقارنة بين تلك الأدلة ثم الترجيح. وقد تم تقسيم البحث إلى تمهيد وفصلين، فكان التمهيد للتعريف بالحفل وذكر أدلة مشروعيته ثم عرض صوراً تاريخية عنه منذ عصر النبوة حتى عصرنا الحاضر، ثم جاء الفصل الأول للكلام على الأعمال المشهورة للنكاح وهي: الوليمة وما يتعلق بها، ثم سائر أنواع الملاهي كالغناء والموسيقى وغير ذلك، وكان الفصل الثاني للكلام على أعمال الحفل التي لا علاقة لها بالإشهار فتحدث أولاً عن أنواع الزينة في حفل الزفاف، ثم عن الأمور المتعلقة بتنظيم الحفل كالنفقات ونحوها، وختم البحث بأهم النتائج والتوصيات.

الحلبي، ثناء م. علي، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، كلية الشريعة ، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. مصطفى ديب البغا

الموضوع: تحقيق ودراسة كتاب لباب المحصول في علم الأصول للحسين بن أبي الفضائل عتيق بن الحسين المعروف بابن رشيق

A Study and Investigation for the Book "Lobab Al Mahsoul in Elm Alausool" Al Husein Abi Al Fadael Attek Ibn Ahusein Whois Famous As Ibn Rasheek

إن علم أصول الفقه من أهم علوم الشريعة وأرفعها منزلة، إذ هو المعتمد في الأمور الاجتهادية، والقاعدة في معرفة أدلة الأحكام الشرعية للفروع الفقهية، ومما لا يخفى على أحد أهمية كتاب المستصفى الذي يعد من أمهات الكتب في هذا العلم ومما يزيده أهمية كونه لإمام عظيم الشأن في علوم الشريعة الإسلامية كونه للإمام الغزالي رحمه الله تعالى .

غير أن كتاب المستصفى يحتاج إلى تحرير في كثير من عباراته وإلى تمحيص وتلخيص واختيار دقيق لمباني ومعاني ألفاظه ومسائله، فجاء الحسين بن عتيق بن رشيق صاحب "لباب المحصول" وبذل جهداً كبيراً في تذليل بعض صعاب ما في المستصفى وتقريبه لأذهان طلابه، وذلك إما باختصار ما يحتاج إلى اختصار ، أو زيادة أو حذف كما أنه أتى بنقود وردود كثيرة على الغزالي، وعلى غيره من الأصوليين.

بدأ المؤلف بذكر مقدمة عن أصول الفقه وأهميته، والفرق بينه وبين الفقه، ثم بين أن أصول الفقه عبارة عن أدلة الأحكام، والنظر في هذا العلم بالأدلة، لا من حيث خصوصية كل دليل، بل من حيث ما يشترك فيه سائر الأدلة الشرعية من حيث دلالة اللفظ على مدلوله من حيث لفظه ومنصوصه وفحواه ومفهومه، ومعناه ومعقوله، وهو القياس.

فتعين النظر في الأحكام وأقسامها والأدلة وأحكامها، وفي وجوه دلالتها على مدلولاتها، وفي صفات من يتأتى له الاستدلال بالأدلة فانحصر دور هذا العلم على أربعة أقطاب: القطب الأول: في الأحكام وأقسامها .

القطب الثاني: في الأدلة وأقسامها، وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس.

القطب الثالث: في كيفية دلالة هذه الأدلة على مدلولاتها.

القطب الرابع: في صفة من يستدل بها، وهو الناظر المجتهد، وفي مقابلته المقلد الذي يتعين عليه تقليده.

فالمؤلف في كتابه هذا تبع أبا حامد الغزالي في انتظام موضوعات الكتاب وتسلسله المنطقي في أغلب مواضع الكتاب. غير أنه اعترض على الغزالي في مواضع أخرى كثيرة، لا مجال لذكرها الآن. فكان كتاباً عظيماً الشأن في هذا العلم المهم في الشريعة الإسلامية نفع الله به المسلمين.

بيطار، حسن حسين، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. حمزة حمزة

الموضوع: سرقة المال العام وعقوبتها في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)

**Riles and Punishment of the theft of Public Wealth (A Comparative Study
of Islamic Jurisprudence)**

كثرت التعدييات في عصرنا الراهن على المال العام، واختلفت حجج المتعدين عليه، ونظراً لكون المال العام يشكل عصب الحياة المعاصرة فقد فضلت الكتابة فيه لإزالة الغموض عن كثير من القضايا المشككة المتعلقة بهذا الموضوع. وقد جاءت الدراسة مقارنة بين مذاهب الفقه الإسلامي والوضعي، واشتملت على مقدمة تمهيدية وفصلين وخاتمة: تضمنت المقدمة تعريفاً بالمال وأنواعه ثم انتقلت للحديث عن المال العام وأنواعه، أما الفصل الأول فقد كان للحديث عن سرقة المال العام في الفقه والقانون وضمنته مقدمة موجزة عن السرقة أعقبها مباحث عن صور سرقة المال العام القديمة والمعاصرة، وتحدثت في الفصل الثاني عن عقوبة سرقة المال العام في الفقه والقانون وضمنته مقدمة موجزة عن عقوبة السرقة وعن مدى انطباق شروط إقامة الحد على السرقة من المال العام ثم عن عقوبة السرقة من المال العام. ثم جاءت الخاتمة متضمنة التوصيات والنتائج.

بركات محمود، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. وهبة الزحيلي

الموضوع: السلطة التقديرية للقاضي

Judge's Right of Estimation

القضاء منصب خطير، والقاضي هو الأداة الأساسية لتحقيق الغاية المرجوة من منصب القضاء، والسلطة التقديرية للقاضي هي جوهر عمل القاضي ونشاطه، لذلك أولت الشريعة الإسلامية السلطة التقديرية أهمية خاصة بها، فشرعتها ثم وضعت لها ضوابط خشية أن تؤدي إلى غير الغاية المرجوة منها، وذلك بعد أن جعلت الشريعة الإسلامية القاضي في مكانة مميزة ومنحته صلاحيات تعينه على تأدية عمله على الوجه الصحيح.

والسلطة التقديرية تشمل عمل القاضي بمجمله، منذ رفع الخصومة إليه إلى قبوله للدعوى من عدمه إلى إثبات الدعوى والطرق المقبولة لذلك، ثم إلى الحكم على الدعوى، وأخيراً إلى طريقة تنفيذ الحكم على الدعوى.

- وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في اشتراط كون القاضي أهلاً للاجتهاد فهو لأن دور القاضي يبرز في تطبيق المنصوص عليه من الأحكام والإجراءات، والاجتهاد فيما وراء المنصوص عليه ومشاورة العلماء لذلك. وقد اختلف الفقهاء في جواز تقليد القاضي المجتهد لغيره من المجتهدين، أما إذا كان القاضي غير مؤهل للاجتهاد ونقلد القضاء فيجب عليه تقليد غيره من المجتهدين.

- من أجل ذلك وغيره كانت السلطة التقديرية موضوع بحث مهم لكثير من الباحثين لأهميتها وخطورتها.

المحمد، معن، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: د. طارق الخير

**الموضوع: دراسة الجوانب التنظيمية ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف شركات
الألبان ومشتقاتها في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية**

**Study of the Organizational Aspects, and the Extent of its
Contribution to Achieving the Objectives of dairy Companies in the
Public Sector of Syrian Arab Republic**

جاءت هذه الدراسة في ظروف اقتصادية نتيجة تغير الاقتصاد من مركزي إلى حر. وفي وقت
كثرت فيه التساؤلات عن حقيقة الواقع الاقتصادي لبعض الشركات في الجمهورية العربية
السورية من قبل المواطنين أنفسهم فما بالنّا بالمختصين في هذا المجال، الأمر الذي دفعني لأن
أبذل جهداً غلب أحياناً على قدراتي لإعداد هذه الدراسة لتكون في متناول الجميع من ذوي
الاختصاص وغيرهم في هذا البلد.

وتتمثل هذه الدراسة في قسمين إحداهما نظري والآخر عملي.

فالقسم النظري يحتوي على أربعة فصول متمثلة في:

(مشروع البحث- التنظيم الإداري- الهياكل التنظيمية- دمج المؤسسات والشركات المتماثلة
بالاختصاص والإنتاج).

أما القسم العملي فيحتوي أيضاً على أربعة فصول متمثلة في:

(الواقع التنظيمي لشركات الألبان في القطاع العام- الهياكل التنظيمية لشركات الألبان في القطاع
العام- شركات الألبان ومشتقاتها في ظل القانون رقم ١٠/ لعام ١٩٩١- دراسة ميدانية لتقصي
الجوانب التنظيمية لشركات الألبان في القطاع العام ومعوقاته).

وهي دراسة اعتمدت على الدراسة النظرية الدقيقة المقرونة – بالدراسة العملية الميدانية ومن ثمّ
اعتمدت اعتماداً رئيسياً على تحليل واقع هذه الشركات، وعرض حقيقي لمشكلات تطورها
وتقدمها، ومن ثمّ جاءت بالحلول التي تناسب وضع هذه الشركات من جانب مختلفة.

الباكير، لميس عساف، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف د. محمد خالد المهائني

الموضوع: تجنب الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل ""مع دراسة تطبيقية مقارنة""

The Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income “with Applied Comparative Study”

ينقسم هذا البحث إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: يتناول الإطار النظري للازدواج الضريبي والتهرب الضريبي من الضرائب على الدخل من خلال بحث الجوانب النظرية لهاتين الظاهرتين. إضافة إلى التعرف على المفاهيم المختلفة للتنسيق والتعاون الضريبي.

القسم الثاني: يتناول الجهود التي بذلتها المنظمات الدولية والعربية في كيفية معالجة المشاكل التي يثيرها الازدواج الضريبي. إضافة إلى عرض أهم التكتلات الاقتصادي الدولية وما تضمنته من تنسيق وتعاون بين الدول، وأثر هذه التكتلات في تنشيط الاستثمار والتبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء.

القسم الثالث: يتناول المجهودات والإجراءات التي اتخذتها سورية في مجال تجنب الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل ومكافحة التهرب الضريبي. إضافة إلى عرض دراسة تطبيقية لاتفاقيات جماعية وثنائية مبرمة في هذا المجال، وأثر هذه الاتفاقيات في تحرير التجارة وتنشيط عمليات الاستثمار في سورية.

القسم الرابع: يتناول النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال دراسته. مع تقديم مجموعة توصيات بما يتناسب مع الوقائع الاقتصادية والمستجدات الدولية والإقليمية، وبما يدعم عملية التنمية التي تنتهجها سورية.

النحاس، عمار غسان، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: د. سليمان الفارس

الموضوع: التغليف وأثره في فعالية التسويق للصناعات الغذائية

Packaging and its effective influence on the marketing of the Production of Manufactured foods

الغلاف هو الصورة المرئية للسلعة، وهو الرمز الذي يحكم عليه المستهلك قبل أن يحكم على السلعة، ضمن الغلاف يمكن للمستهلك أن يستشف ما بداخله، ويمكن للغلاف أن يقول للمستهلك إذا كانت السلعة بدرجة عالية أو بدرجة منخفضة من الجودة، أو إذا كانت هي التي يريدونها فعلاً. كان الغلاف في الماضي وسيلة لاحتواء السلعة والمحافظة عليها، أما الآن فقد أصبح عاملاً نفسياً وأداة ورجل بيع صامتاً.

مما سبق يتبين أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى الاهتمام بالتغليف من وجهة النظر التسويقية ولعل أهم هذه العوامل هي:

- ١- انتشار طريقة الخدمة الذاتية وهنا الغلاف يقوم بمهمة رجل البيع الصامت.
- ٢- تنوع حاجات المستهلكين، وزيادة دخول العديد منهم وهذا أدى إلى تفضيلهم للسلع التي تحقق لهم سهولة في الاستعمال، وحب الاهتمام بالمظهر الخارجي المناسب.
- ٣- شدة المنافسة بين المنتجين مما دفعهم إلى زيادة الاهتمام بترويج السلعة والغلاف بهذا المعنى وهو عامل مساعد على تحقيق ذلك.
- ٤- حماية السلعة وإيصالها للمستهلك بالزمان والمكان المناسبين.

محمد محمد شوقي، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: د. عصام خوري ، ومشاركة د. غسان ابراهيم
الموضوع: تمويل الاستثمار العام والخاص في الصناعات التحويلية في سورية
**Finance of the Public and Private Investment in the Manufacturing
Industries in Syria**

يسلط هذا البحث الضوء على مسألة التمويل المالي للمشاريع الاستثمارية في الصناعات التحويلية في سورية، ووفقاً لذلك فقد تطرق البحث إلى العديد من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع.

حيث تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول: تضمن الفصل الأول الحديث عن عوامل النمو الاقتصادي وأهمية الاستثمار في تحقيق التراكم الرأسمالي، كما تم استعراض مصادر التمويل الداخلية والخارجية.

أما الفصل الثاني فقد تم التركيز على دراسة تكلفة الاستثمار والعائد الاستثماري في الصناعات التحويلية في كل من القطاعين العام والخاص في سورية، مع توضيح واقع وبنية الصناعات التحويلية وسياسات التمويل المتبعة في كل من القطاعين. وفي الفصل الثالث تناول البحث حالة تطبيقية في دراسة تكلفة الاستثمار والعائد الاستثماري في المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء. أما الفصل الرابع فقد اهتم بالبحث عن الطرق والسياسات الحديثة في التمويل وعن المناخ الاستثماري الملئ في ظل قوانين تشجيع الاستثمار، كما تناول هذا الفصل الحديث عن إمكانية إقامة سوق للأوراق المالية في سورية ووضع الجهاز المصرفي وإمكانيات وضرورات تحديثه.

سنده، محمد تيسير، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. حمزة حمزة

الموضوع: ضوابط المنافسة في التنمية المالية

The Criterion of the Competence in Monitory Development

الحمد لله والصلاة على سول الله الكريم وبعد:

التنمية المالية من أهم الأركان التي ترتكز عليها الأمة، وهي جهد واع وعمل رشيد يهدف إلى تحسين الإنتاج وتطويره وتنميته، وحتى تكون التنمية مشروعة لا بد أن تمارس ضمن ضوابط وقيود تحفظ حق الآخرين ولا تلحق به ضرراً أو أذى، لذلك أثرت أن أجعل موضوع الرسالة في ضوابط المنافسة في التنمية، وذلك لأن التنمية اليوم اتخذت صوراً وأشكالاً شتى وجعلت البحث مؤلفاً من بابين، الباب الأول: في نظرة عامة من المنافسة والتنمية، وقسمته إلى فصلين. والباب الثاني: تكلمت فيه عن ضوابط المنافسة في التنمية، وذلك في فصلين: الأول أن لا تمارس هذه التنمية عن طريق الاحتكار، وفيه مباحث. والثاني: أن لا تمارس عن طريق الربا وفيه مباحث. وقد اعتمدت في كتابة الموضوع على أقوال المذاهب الأربعة وأدلتهم والترجيح بينها. ثم ذكرت المعاملات التي تتعلق بالاحتكار والربا وبينت الرأي الراجح فيها. وضمنت الرسالة ببعض القواعد الاقتصادية التي نبه عليها فقهاؤنا. والله الموفق.

الديرشوي، محمد جنيد، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد سعيد رمضان البوطي

الموضوع: الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية

Economic Freedom and the Extent of State Power in restricting it in the Islamic Sharia

تتألف الرسالة من مقدمة وتمهيد وبابين اثنين وخاتمة، أما التمهيد ففيه بان مفهوم الحرية بشكل عام والحرية الاقتصادية بشكل خاص، ثم عرض لمواقف المذاهب الاقتصادية القديمة والحديثة من مسألة الحرية الاقتصادية. الباب الأول: مفهوم الدولة أو (ولي الأمر) في الإسلام ومفهوم التدخل وفيه فصلان، الفصل الأول: وفيه مبحثان، المبحث الأول: من هو ولي الأمر وما شروطه؟ المبحث الثاني: أدلة وجوب إقامة ولي الأمر شرعاً وعقلاً. الفصل الثاني: تدخل ولي الأمر للحد من الحريات الاقتصادية وحكمه، وفيه مبحثان، المبحث الأول: ماذا نعني بالتدخل وما دائرته؟ المبحث الثاني: حكم هذا التدخل في الشرع. الباب الثاني: مجالات التدخل ومؤيداته، ويتألف من خمسة فصول، الفصل الأول: التدخل في توزيع مصادر الإنتاج وفيه أربعة مباحث، المبحث الأول: إحياء الأرض الموات، المبحث الثاني: الإقطاع، المبحث الثالث: حكم الأرض المفتوحة عنوة، المبحث الرابع: تدخل الدولة في توزيع المعادن والثروات التي لم تدخلها يد المنعة.

الفصل الثاني: تدخل الدولة في الإنتاج وفيه أربعة مباحث، المبحث الأول: هل للدولة إجبار الأفراد على ممارسة بعض الأعمال؟ المبحث الثاني: هل للدولة منع الأفراد من ممارسة بعض الأعمال؟ المبحث الثالث: التسعير. المبحث الرابع: المنافسات المذمومة وتعطيل الأموال.

الفصل الثالث: نزاع الملكية، وفيه مبحثان، المبحث الأول: الضرائب، المبحث الثاني: التأميم.

الفصل الرابع: الحجر، وفيه مبحثان، المبحث الأول: الحجر بسبب التقليس، المبحث الثاني: الحجر بالسفه.

الفصل الخامس: المؤيدات الجزائية لتدخل الدولة في تقييد حرية الأفراد الاقتصادية، ويتألف من مبحثين، المبحث الأول: العقوبة بإتلاف المال، المبحث الثاني: العقوبة بأخذ المال (التغريم).

خاتمة فيها التوصيات والنتائج والتوصيات.

نزار، رامي، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. نور الدين عتر

الموضوع: أحكام المصحف

The rules of the Islam Holy Book

المصحف هو مجموعة الصحف التي دوّن فيها القرآن الكريم، فهو من الحاجات الأساسية لكل مسلم.

- وقد بينت الشريعة الإسلامية الأحكام والآداب المتعلقة بهذا الكتاب المقدس بما يليق باحترامه وتعظيمه.
- لذا عمدت إلى جمع هذه الأحكام من أبوابها المتفرقة من كتب الفقه وعلوم القرآن فكانت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.
- في المقدمة تعريف بأهمية البحث وسبب اختياره، وفي الباب الأول بيان الأحكام المتعلقة بمسّ المصحف والقراءة فيه، وفي الباب الثاني تفصيل للأحكام المتعلقة بكتابة القرآن ورسمه وترجمته، وفي الباب الأخير عرض للتصرفات العامة بالمصحف، مثل بيعه وإجارته ووقفه، ومظاهر تعظيمه، ثم الختام بخلاصة البحث وأهم النتائج. ومعتمدي في البحث هو الرجوع إلى المصادر الفقهية والأصولية مع بيان الأدلة ومناقشتها واختيار الراجح من الآراء.

النفوري، مجد منذر، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. علي ابراهيم الخضر

الموضوع: تخطيط الحملات الاعلانية للسلع الاستهلاكية وأثرها في سلوك المستهلك

Planning of Advertising Comparing for Consumption Goods and their Impact on Consumer Behavior

نحن جميعاً -المستهلكين والمنتجين- مدينون لفكرة الإعلان بالكثير فهو يحسن مستوى الكفاءة التسويقية للشركة من خلال مساعدتها في محاولتها لتسويق السلع والخدمات، ومن خلال مساعدته المستهلك بتعريفه بالسلع والخدمات المتاحة، وتزويده بمعلومات عن خصائصها ومميزاتها، وأسعارها، وأماكن توزيعها، وغير ذلك من المعلومات اللازمة لترشد قرارات المستهلك النهائية. ورغم الدور الحيوي الذي يقوم به الإعلان في ميدان تسويق السلع والخدمات فقد تكون له آثار عكسية، إذا لم يعتمد على التخطيط العلمي السليم الذي يتطلب تأهيل الأطر العاملة في ميدان التسويق والإعلان، وهذا البحث يهتم بدراسة مفهوم تخطيط الحملات الاعلانية وأهميتها وأساليبها والعوامل المؤثرة فيها ودراسة تخطيط الحملات الاعلانية بما في ذلك، تصميم الرسائل الاعلانية وبرمجتها الزمنية وجدولتها وتقييمها. كما تطرق إلى دور الوكالات الاعلانية الحيوي الذي تقوم به لكل من المعلنين والمستهلكين... فضلاً عن إلقاء الضوء على ردود فعل المستهلكين المتباينة تجاه الحملات الاعلانية، ومد تقبلهم لفكرة الحملات الاعلانية مع التعرض وبشيء من التفصيل إلى أهمية بحوث الحملات الاعلانية في نجاح الحملات.

بادنجكي، حسن بن عبد الرحمن، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. حمزة حمزة

الموضوع: الزكاة وإنفاقها في المشروعات الخيرية والمصالح العامة

Zakaat and spending it in the Benevolent Projects and Common Services

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

لقد غدت بحوث الزكاة الحياة الحديثة من أدق البحوث الفقهية وأخطرها، حتى شكك كثير من المعاصرين في بعض أحكامها وفرقوا على أقوال مختلفة؛

ولقد كثر سؤال الأغنياء عن مصارف الزكاة، وهل يجوز لهم أن ينفقوا زكواتهم في المشروعات الخيرية والمصالح العامة؟

وبسبب ذلك جمعت -بعون الله تعالى- هذا البحث مبيناً تعريف الزكاة ودليل مشروعيتها وحكم مانعها والحكمة من تشريعها وركناتها، ثم ذكرت شروط وجوب الزكاة وشروط صحتها، ثم شرحت مصارف الزكاة الثمانية وما يتعلق فيها من أحكام، وتوسعت قليلاً في الكلام عن مصرف سبيل الله -إذا هو لب هذا البحث- مبيناً مصادر تمويل المشروعات الخيرية والمصالح العامة، وحكم صرف الزكاة في تلك المشروعات، وعدم إجزاء صرفها في المصالح العامة.

وصلى الله مولانا العظيم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.

والحمد لله رب العالمين

الريشلي، سمير، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. حسين القاضي، ومشاركة أ.د. أدولف أنثوفن
الموضوع: أثر المعايير المحاسبية المستخدمة في شركات صناعة إنتاج النفط والغاز في سورية على
تحديد التكاليف والدخل -دراسة تحليلية مقارنة-

The Impact of Accounting Standards Used in Syria's Upstream (Exploring, Development & Producing Oil & Gas Companies) on Costs and Income

تقارن هذه الدراسة بين المعايير المحاسبية المستخدمة في شركات إنتاج النفط والغاز في سورية
والمعايير المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فشركات إنتاج النفط والغاز في سورية تتمثل
بشكل أساسي بالشركة السورية للنفط كشركة عامة والشركات المشتركة لتقاسم الإنتاج المتمثلة
بشكل رئيسي بشركة الفرات للنفط.

لقد ركزت الدراسة على مدى توافق المعايير المحاسبية المستخدمة في سورية مع المبادئ
المحاسبية المقبولة عموماً في صناعة إنتاج النفط والغاز المتمثلة بطريقة المجهودات الناجحة
وطريقة التكلفة الكلية. ففي سورية تطبق الشركة السورية للنفط النظام المحاسبي الموحد المصمم
أصلاً لاستخدامه من قبل شركات القطاع الاقتصادي؛ لا يلبي متطلبات صناعة إنتاج النفط والغاز
من أي ناحية من النواحي الجوهرية، أما شركات تقاسم الإنتاج فتطبق النصوص العقدية التي
تخدم بشكل أساسي تقاسم الإنتاج واسترداد التكاليف.

لقد أظهرت الدراسة التجريبية أن المصاريف وفقاً للمبادئ المحاسبية لشركات تقاسم الإنتاج أكبر
من مثيلاتها وفقاً للتكلفة الكلية بقرابة ٦٣ %، وأكبر من مثيلاتها وفقاً للمجهودات الناجحة بنحو
٤٠ %، كما أن المصاريف وفقاً للمبادئ المحاسبية للشركة السورية للنفط أكبر من مثيلاتها وفقاً
للتكلفة الكلية بقرابة ١١ %، وأصغر من مثيلاتها وفقاً للمجهودات الناجحة بقرابة ٤ % . وقد أظهر
التحليل أن الفروقات تنسب لاختلاف المعالجة المحاسبية بشكل جوهري في كل طريقة لكل من
مصاريف الإطفاء والاستكشاف والتشغيل والمصاريف العامة.

وقد استنتجت الدراسة بالنهاية أنه من الضروري إحداث تغيرات وتطويرات جذرية في المبادئ
المحاسبية المطبقة في شركات إنتاج النفط والغاز في سورية، وذلك بما يتوافق مع المبادئ
المحاسبية المتعارف عليها دولياً في مجال الصناعات الاستخراجية، أو تطبيق المعايير المحاسبية
الدولية خاصة المعيار (المعايير) المرتقب الخاص بالمحاسبية في الشركات العاملة بالصناعات
الاستخراجية.

أبو حسنة، نعيمة قاسم، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عبد الرحيم بوادقجي

الموضوع: الوعي السكاني لدى الأسرة وأثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة ميدانية مقارنة لواقع الوعي السكاني لدى الأسرة السورية بين محافظتي مدينة دمشق والقنيطرة-

The Comprehensive Population about a Family and the Impact on the Economic and Social Development –Comparative Survey about the Comprehensive Population for Syrian Family in Quentin and Damascus cities-

يرتبط تقدم المجتمعات وتطورها بتقدم الفرد وتطوره ، وهذا بدوره منوط بوعيه الذاتي والموضوعي، وبحثنا هذا جاء ليبين الوعي وأثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تضمن البحث ثلاثة فصول:

- الفصل الأول: تضمن تعريف الوعي السكاني وعناصره ومؤشراته والعوامل التي تسهم في تكوينه، كما يتضمن الاتصال الجماهيري ودوره في تكوين الوعي السكاني.
- الفصل الثاني: يتضمن الأسرة وأشكالها ودورها في تكوين الوعي السكاني، كما يتضمن الوعي السكاني لدى الأسرة وأثره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- الفصل الثالث: يتضمن دراسة ميدانية مقارنة لواقع الوعي السكاني في محافظتي مدينة دمشق والقنيطرة، وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج التحليلي باستخدام مجموعة من الأدوات (الملاحظة- المقابلة- الاستبانة- مقياس كب لقياس الوعي السكاني)، كما اعتمدت الأسرة الواحدة التحليل في البحث. هذا وبلغ حجم عينة البحث (٥٠٠) أسرة في كل من المحافظتين.

نهاده، حيدر، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. مطانيوس حبيب

الموضوع: نقل التكنولوجيا في عصر العولمة وأثرها في صناعة النفط في سورية

Technology Transfer in Globalization Age and Its Effect on Oil Industry in Syria

جاءت الرسالة في ١٧٥/ صفحة، مكونة من مقدمة، وأربعة فصول، واستراتيجية مقترحة، وخاتمة، تحدثنا في الفصل الأول عن نقل التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، في ثلاثة بحوث، الأول عن ماهية التكنولوجيا ونقلها، والثاني مبررات نقلها وشروط نجاحها، والثالث، قنوات نقلها، وفي الفصل الثاني عن عولمة الاقتصاد ونقل التكنولوجيا، وقسمناه إلى بحوث ثلاثة، الأول عن منظمة التجارة العالمية، والثاني عن المشروعات الإقليمية، والثالث، عن الشركات متعددة الجنسية، وفي الفصل الثالث: البناء التكنولوجي في سورية، تحدثنا في البحث الأول عن مؤسسات البحث العلمي. والبحث الثاني: عن سياسة الدولة في نقل التكنولوجيا. والبحث الثالث، عن صعوبات نقل التكنولوجيا إلى سورية، وفي الفصل الرابع والأخير، درسنا أثر نقل التكنولوجيا في صناعة النفط في سورية، وفي الخلاصة رسمنا استراتيجية مقترحة، ثم الخاتمة.

الكوري، جواد، قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد جميل عمر، ومشاركة د. هشام مخلوف

الموضوع: القوى العاملة والتعليم الفني في الجمهورية العربية السورية (الواقع والأفاق)

Labor Forces and Technical Education in Syria

يتزايد في الوقت الحاضر الاهتمام بالمسألة السكانية؛ نظراً للتزايد السكاني السريع وخاصة في الدول النامية؛ ولما كان القطر العربي السوري من بين الدول النامية التي غدَّ معدل النمو السكاني فيها مرتفعاً؛ بل من أعلى المعدلات في العالم.

لذلك فإن دراسة المسألة السكانية فيه تزداد أهمية؛ خاصة أن المجتمع السوري يتميز ديمغرافياً بكونه مجتمعاً فتيّاً وهذا ما يدعو إلى دراسة واقع القوى العاملة التي يتناسب نموها طرداً مع معدل نمو السكان واستخدامها بالشكل الأمثل بما يتلائم ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق تأهيلها وتدريبها من أجل تحسين تركيبها النوعي؛ ومن ثمَّ قدرتها على استخدام التكنولوجيا المتطورة والمتجددة؛ لأنه في هذا العصر أصبح من غير الممكن فصل عملية تخطيط التعليم عن عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فالنظام التعليمي يجب أن يقوم بتوفير المهارات والاختصاصات الفنية والعلمية والإدارية التي تحتاجها عملية التنمية والتي يتناسب مستواها الفني والعملي مع المستوى المتطور لوسائل الإنتاج؛ فالتباين بين النظام التعليمي واحتياجات التنمية؛ يؤدي إلى نقص العمالة المطلوبة المؤهلة وعدم الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية لوسائل الإنتاج.

لذلك أن نرى أنَّ دراسة تركيب القوى العاملة من حيث المستوى التعليمي على جانب كبير من الأهمية؛ لأن التعليم يعدُّ مؤشراً اجتماعياً واقتصادياً؛ يصف الجانب النوعي للسكان والقوى العاملة ويدل على تطور المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسوف نعتمد في هذا البحث على أسلوب الدراسات التحليلية إضافة إلى العديد من الطرق الرياضية والإحصائية التي تساعد على الوصول لتقديرات مستقيلة للسكان والقوى العاملة ولتطور التعليم الفني والمهني، ومن ثمَّ الوصول إلى نتائج وتوصيات تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

منار، خولاني، كلية الاقتصاد ، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. خالد الخطيب

الموضوع: الموازنة الصفريّة وإمكانية تطبيقها في الوحدات الإدارية المحلية في سورية

Zero Base Budgeting and the Possibility of its Application in the Local Administrative Units in Syria

جذب نظام الموازنة الصفريّة اهتمام المهتمين بإعداد الميزانيات سواءً أكان في القطاع الحكومي أم في قطاع الأعمال منذ بداية الستينيات من القرن الماضي، حيث تم استخدامه في عدد من الولايات والمحليات والمؤسسات الأمريكية منذ ذلك الوقت.

لذلك هدفت هذه الرسالة إلى إيضاح مفهوم الموازنة الصفريّة مع عرض لخطوات إعدادها، والتعرف على فوائد تطبيقها والمشاكل التي تعترض هذا التطبيق. كما هدفت إلى دراسة مدى إمكانية نظام الموازنة الصفريّة في الوحدات الإدارية المحلية في سورية، حيث تم تقديم نموذج مقترح لتطبيق الموازنة الصفريّة في هذه الوحدات تبين من خلاله أن التطبيق يحقق العديد من الفوائد.

السماك، غانم سعيد، كلية الحقوق، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد الحسين

الموضوع: الاعتداء المادي في القانون الإداري

La Voie de Fait en Droit Administratif

استعرضنا في مقدمة الرسالة قصة الإنسان مع السلطة منذ وجوده على وجه الأرض وحتى وقتنا الحاضر، وبيّنا كيف نشأت الدولة وكيف تطورت من دولة حامية إلى دولة راعية، ثم إلى متداخلة فهيمنت على مختلف الشؤون الحياتية وتنظيمها مستخدمة نشاطها لضمان حسن سير المرافق العامة فيها عن طريق الإدارة العامة المختصة بهذه المهمة.

والإدارة وهي تنهض في مهامها لا بد لها أن تتمسك بمبدأ المشروعية مبدأ سيادة القانون وإذا ما خرجت عنه وخالفت أحكامه كان تصرفها معيباً وشاب قرارها البطلان، أما إذا بلغ خروجها قدراً كبيراً من الجسامة انقلبت قراراتها معدومة. والمشرع في مجال القانون العام خص الإدارة بامتيازات بأن أعطاها الحق بإصدار قرارات بإدارتها المنفردة وخولها سلطة التنفيذ المباشر في بعض الحالات ودون انتظار لحكم القضاء. وتأكيداً على هذه الامتيازات فقد أنشأ المشرع المحاكم الإدارية بقانون مجلس الدولة لتختص بالنظر في المنازعات التي تقع بينها وبين غيرها من الإدارات وبينها وبين الأفراد إن هي اعتدت على حقوقهم. وتجمع شريحة من رجال القانون الإداري أو تكاد على أن فكرة الاعتداء المادي غامضة وغير محددة الملامح ومعقدة وتبعث على الحيرة والتردد، وهذا الأمر حفز بعض فقهاء القانون الإداري للتخلي عنها من أساسها.

ولأهمية بحث الاعتداء المادي فقد اخترناه موضوعاً لهذه الرسالة وبحسنا فيه بأبعاده الثلاثة الفقهية والقضائية والتشريعية في الدول الثلاث في فرنسا وسورية ومصر، وتمهيداً لذلك خصصنا الباب التمهيدي لبيان منطلقات فكرة الاعتداء المادي في فصول ثلاث تناول الفصل الأول منها لمحة تاريخية عن الاعتداء المادي، والفصل الثاني القرار الإداري، والفصل الثالث

مبدأ المشروعية، وبعد الباب التمهيدي قسمنا موضوع الرسالة إلى قسمين: القسم الأول ويبحث في ماهية الاعتداء المادي وعناصره وموقف الفقه والقضاء منه، فكان الباب الأول منه تعريف الاعتداء المادي وعناصره وانتهينا إلى تعريف شخصي له بأنه: "عمل مادي تنفذه الإدارة ونطوي على مخالفة جسيمة لمبدأ المشروعية باعتدائها على الملكية الخاصة أو الحريات الفردية".

وتناولنا في الباب الثاني تمييز الاعتداء المادي عما قد يتشابه معه وموقف الفقه والقضاء منه. ثم فصلنا في القسم الثاني من الرسالة الآثار التي تترتب على الاعتداء المادي في بابين الباب الأول منه اختصاص القضاء في النظر في الاعتداء المادي والقيود التي ترد عليه. وتناولنا في الباب الثاني من هذا القسم مسؤولية الإدارة عن فعل الاعتداء وموقف المتضرر منه ، ثم أتبعناه بخاتمة بيّنا فيها رأيًا ومقترحاتنا فما عالجناه.

الدباس، مايا، كلية الحقوق، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد عزيز شكري ومشاركة د. ماهر ملندي

الموضوع: نظام استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية

– حالة نهر الفرات-

The System of Non-Navigational Uses of International Water Courses the Situation of Euphrates River

قال الله تعالى:

""أو لم يرَ الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون"" . (الأنبياء (٣٠)).

آية كريمة تبين أهمية الماء في حياة الأمم والشعوب، منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكل من على الأرض وما عليها من الإنسان والحيوان والنبات وسائر الكائنات الحية الأخرى، حياته وبقائه مرتبط بالماء، فالماء عصب الحياة بل هو الحياة ذاتها.

فمسألة المياه تشكل موضوع الساعة، لا يسبب خطورة المنازعات الناتجة عن ظواهر الندرة والجفاف والاستغلال غير المدروس للمصادر المائية فحسب، بل كذلك نتيجة لتصاعد الحاجة إلى إيجاد حلول قانونية مقبولة من الدول المعنية. والطبيعة الخاصة كونها لا تعرف الحدود والادعاءات المتعارضة للدول المعنية، التي غالباً ما تستند إلى مطالب السيادة والحقوق التاريخية المؤكدة أو المشكوك فيها، كل ذلك يدفعنا في البداية إلى دراسة التصاعد المستمر للمشاكل الناجمة عن استخدامات مصادر المياه العذبة (الباب الأول) لبيان أسباب الأزمة المائية في الوطن العربي (الفصل الأول)، وما خلفته من آثار على بعض الدول العربية (الفصل الثاني).

ثم نتناول التطور التاريخي لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية (الباب الثاني). وذلك عبر أربعة فصول متتالية: الاتفاقيات الدولية (العامة والخاصة) (الفصل الأول). والقواعد العرفية الدولية (الفصل الثاني)، والقضاء والتحكيم (الفصل الثالث)، والمؤسسات الفقهية والمنظمات الإقليمية والدولية (الفصل الرابع).

ثم نبحث في القواعد والمبادئ القانونية القابلة للتطبيق على استخدام مجرى الفرات (الفصل الثالث). وذلك عبر أربعة فصول متتالية: السيادة على المصادر الطبيعية (الفصل الأول)، ومدى احترام الالتزامات الاتفاقية بين الدول (الفصل الثاني)، والاستخدام المنصف وغير الضار للمجاري المائية الدولية (الفصل الثالث)، والتعاون والتفاوض بحسن نية (الفصل الرابع).

وصولاً إلى الخاتمة المتضمنة دراسة الوضع الدولي لمجرى الفرات والرؤية المستقبلية للتسوية الممكنة لمسألة الفرات.

كمال الدين الشماط، محمد، شوقي، قسم القانون العام، القانون الإداري،
كلية الحقوق، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد الحسين
الموضوع: عيب الانحراف بالسلطة

Detournement de Pouvoir

تقوم السلطة التنفيذية بوصفها إدارة عامة بإدارة المرافق العامة وتسييرها وإشباع الحاجات العامة مفتحة شتى ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي سعيها الدؤوب لتحقيق المصلحة العامة تستخدم السلطات والامتيازات الواسعة والخطيرة المستمدة من القانون العام والتي خولها لها المشرع لأداء وظائفها على أكمل وجه.

وفي مسعاها هذا لا بد أن تلامس حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم المشروعة ولاسيما في استخدامها لوسائلها الأهم: القرار الإداري الذي تتمتع بامتياز افتراض سلامته من عيوب المشروعية وقابليته للتنفيذ بإدارتها المنفردة، الأمر الذي يقتضي معه ممارسة رقابة قضائية فاعلة وكافية على قراراتها الإدارية صيانة للمشروعية ولحقوق الأفراد وحرياتهم ولاسيما لجهة مشروعية الغاية منها، وهي ما يرد عليها عيب الانحراف بالسلطة عند سعيها لغايات غير مشروعة و غير معترف بها أو سعيها إليها بغير الوسائل التي رسمها القانون لذلك.

وتتعرض الرسالة إلى بحث مستجد ومعقد لعدد من القضايا المتصلة بعيب الانحراف بالسلطة من حيث نشأته وتطوره وتعريفه في الفقه والقضاء الإداريين، وبحث حالاته وخصائصه، وشروط تحققه، وتحديد موقعه بين عيوب المشروعية الأخرى (عيب السبب والاختصاص والشكل ومخالفة القانون) ومقارنته بالنظريات المشابهة (نظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية الغلو في قضاء التأديب) وبحث علاقته بفكرة النظام العام ومسألة إثباته وجزائه.

ولقد جاءت الرسالة مقارنة لطريقة تعاطي القضاء الإداري مع عيب الانحراف في فرنسا وسورية ومصر ولبنان، ووقعت بما يقارب /٤٧٠/ صفحة نأمل أن تصادف النجاح والتوفيق والله من وراء القصد.

منصور، يمن، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ. د. صباح الدين بقجه جي، وبمشاركة: د. صوفي سيغاري
الموضوع: الموثوقية ومعاييرها الرياضية

La Fiabilité et Ses Critères Mathématiques

يعنى هذا البحث بدراسة موثوقية الآلات والمشكلات الاحتمالية المتعلقة بالتوقف عن العمل والاستبدال.

حيث تم توضيح ماهية الموثوقية، وأسسها الرياضية الإحصائية، والتعرض إلى بعض القوانين الأساسية النظرية المستخدمة في دراستها، ومن أجل الحصول على تقدير الموثوقية في التراكيب الآلية تمت دراسة الهياكل الأساسية لها.

من ناحية أخرى حاولنا تقدير القانون الاحتمالي المعبر عن موثوقية آلة قابلة للإصلاح بشكل مستجد، ووضع صيغة تحليلية له بالاعتماد على نظرية الفروق، وكذلك وضع بعض الصيغ لقوانين احتمالية لتوقف هذه الآلة عن العمل من خلال تركيب وتجزئة في الصيغ الرياضية لبعض القوانين الاحتمالية النظرية المعروفة.

نطرقنا أيضاً إلى الأعطال والتعطلات في الأجهزة المعقدة، فتم التعرف على مصادر التعطل في هذه الأجهزة، ودراسة الفجوات بين أعطالها، ومن ثم تقدير كيفية توزيع الأعطال خلال فترة استخدامها.

وعالجنا الآلات واستبدالها من خلال تقدير الاحتمالات المرتبطة بفعاليتها وتوقفها ودراسة الخطر العمري لها، وتنسيقها واستبدالها ببديل جديد.

أما صيانة الآلات وإصلاحها فتمت معالجتهما باستخدام نظرية صفوف الانتظار والمصفوفة الماركوفية.

وتم إيجاد تكلفة استخدام الآلة في حالات متعددة بغية تحديد أفضل الأوقات التي يجب عندها القيام بعمليات الصيانة والاستبدال.

أخيراً قمنا بدراسة تطبيقية على الآلات وأعطالها في شركتي بردي والحافظ للبرادات وبعرض النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.

صيوح، لؤي، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين

إشراف: أ.د. نزار قنوع و أ.د. هيثم سطايجي

الموضوع: الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط بعدها الاقتصادي والسياسي

US. Strategic in the Middle East Political and Economical Level

إن فهم الاستراتيجية الأمريكية وسياساتها الخارجية أصبح ضرورة حتمية، نظراً لكونها -سواء شئنا أم أبينا- تشكل القطب الأهم في النظام الدولي الحالي، والقوة الخارجية المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط اقتصادياً وعسكرياً فهي واقع يفرض نفسه على أغلبية المجتمعات الإقليمية.

ومن ناحية أخرى فإننا سنبرز العلاقة المعقدة بين الرئيس والكونغرس وجماعات الضغط التي تؤدي دوراً حاسماً في تشكيل السياسة الأمريكية الخارجية، ونوضح التضارب بينها حول تحديد المصالح الأمريكية، ولكنها نادراً ما تختلف في حال وجود إسرائيل كطرف. ومحاولة سلب العرب نفطهم بأرخص الأثمان واللعب بمصائره بشكل يومي واعتبارها كامل المنطقة مزرعة لعسكرييها ولشركاتها، وتهدد بالتدخل وتحاول كسر الإرادات والتلويح بالعقوبات بجميع أنواعها الأمريكية واحتضانها المشروع الصهيوني في حلته الإسرائيلية المعادية. فجعلت منه مجتمعاً مدججاً بالسلاح الحديث متجاهلاً القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص احتلاله الأراضي العربية ومحاولة فرض نظام (شرق أوسطي) بديل عن النظام القومي العربي تكون فيه إسرائيل القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية بدعم مبارك من الولايات المتحدة الأمريكية.

فمطلوب من العرب اليوم تجميع القوى والموارد والسعي لبناء سوق عربية مشتركة، والوقوف موقفاً واضحاً من القضايا التي تستهدف فك وإعادة ترتيب الخارطة السياسية والاقتصادية للمنطقة بما ينسجم ويتوافق مع أعداد المنطقة والأمة.

خضري، رولا، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. عبد الرحيم بوادقجي

الموضوع: السكان والأمن الغذائي في الوطن العربي مع إشارة خاصة لسورية

La Population et la Sécurité Alimentaire dans la Région Arabe avec un Indice Spécial Pour la Syrie

تُعَدُّ قضية الأمن الغذائي من أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي لما لها من تأثيرات مباشرة في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما يرتبط بها من قرارات ومسارات تنموية.

وبطبيعة الحال تؤثر العوامل الطبيعية والمناخية والتقنية والسياسات الاقتصادية الزراعية تأثيراً مباشراً في تحديد ملامح الأمن الغذائي العربي. وتنعكس آثار تلك العوامل والجهود التنموية المبذولة على أوضاع إنتاج وتجارة واستهلاك السلع الغذائية ومعدلات الاكتفاء الذاتي منها على المستويات القطرية والقومية.

ومن ناحية أخرى فإن معدلات النمو السكاني المرتفعة نسبياً، وما يترتب عليها من زيادة الاحتياجات الاستهلاكية بمعدلات عالية. لا تزال من العوامل التي تؤثر في أوضاع الأمن الغذائي العربي، وتقترض سابقاً غير متكافئ بين القدرات والإمكانات الإنتاجية وبين الاحتياجات والمتطلبات الاستهلاكية. الأمر الذي أدى إلى تفاقم العجز الغذائي، وتزايد الاعتماد على الخارج، وتزايد المديونية الخارجية والتبعية الغذائية، وما تجره هذه التبعية من ضغوط خارجية من قبل الدول المنتجة. لذلك لا بد من تبني استراتيجية زراعية عربية تكاملية لسد الفجوة الغذائية المتفاقمة وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

ومن الجدير بالذكر أنه نتيجة لانتهاج سورية استراتيجية واضحة، بدءاً من التسعينيات في مجال التنمية الزراعية، استطاعت أن تنتقل من مرحلة استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي منها، ثم إلى مرحلة توفير فائض تصديري من بعض السلع الغذائية يؤمن احتياجاتها من القطع النادر.

عبد الرؤف، رياض، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. حسين القاضي

الموضوع: استخدام تقانات المعاينة الإحصائية في تقويم نظم الرقابة الداخلية

مع التطبيق العملي على شركة الفرات للنفط

The Using of Statistical sampling Techniques in the Evacuation of Internal Control Systems –With Practical Application to Alfurat Petroleum Company

يبين هذا البحث أنه يمكن الاستفادة من تقانات المعاينة الإحصائية في تقويم نظم الرقابة الداخلية كمرحلة من مراحل المراجعة، وذلك وفق خطوات محددة حيث يساهم استخدام تقانات المعاينة الإحصائية في تخفيض درجة الاعتماد على الحكم الشخصي دون أن يلغي الحاجة إليه. هناك عدة تقانات للمعاينة الإحصائية يمكن استخدامها ولكن لكل منها ظروفًا وشروطًا تطبق ضمنها أي أنها ليست بديلة عن بعضها بعضاً وينبغي أن ينتقي المراجع التقنية الأكثر ملاءمة ضمن البيئة المحيطة، وقد تم عرض التقانات التي يمكن استخدامها ثم شرح البحث كيفية تطبيقها عملياً في سياق مراجعة حسابات شركة الفرات للنفط من خلال خطوات واضحة وموجهة تمثل دليل عمل لكيفية استخدام التقانات، ونتيجة لما سبق، توصل الباحث إلى نتائج وقدم توصيات معينة.

غانم، ممدوح، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد خالد الحريري

الموضوع: جدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سورية

Benefit of Foreign Direct Investment in Syria

يتناول البحث دراسة تجربة سورية مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن بدأت مسيرة الانفتاح الاقتصادي على إثر صدور قانون الاستثمار رقم ١٠ لعام ١٩٩١. حيث استطاعت سورية جذب بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسعت جاهدة لتوطينها. لكن عدم توافر المناخ الاستثماري الملائم ووجود العديد من الصعوبات والمعوقات في وجه تلك الاستثمارات، قد عمل على تقليصها، وغدت الإمكانية ضعيفة جداً للاستفادة منها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي والتكوين الرأسمالي الثابت وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الدخل واستقدام تكنولوجيات متطورة. لذلك ينبغي على سورية أن تسعى لتحسين المناخ الاستثماري وتذليل كل الصعوبات والمشاكل لكي تصبح إحدى مناطق الجذب الاستثماري في العالم لتوظيف الاستثمارات المباشرة في خدمة التنمية الاقتصادية.

العلي، محمود ابراهيم، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. مصطفى العبد الله الكفري، د. غسان محمود ابراهيم
الموضوع الاستثمار الحكومي في قطاع الصناعة ودوره في تنمية الصادرات في
سورية

The Governmental Investment in the Industrial Sector and its Role in the Development of Exports in the Syrian Arab Republic

يدور الحديث والنقاش في جميع الأوساط، منذ فترة طويلة نسبياً، حول جدوى وكفاءة القطاع العام والصناعي منه بشكل خاص، والجميع متفق حول ضرورة القيام لعملية إصلاح شامل في الاقتصاد الوطني ومعالجة مشاكله، والاختلاف يدور حول كيفية المعالجة وأسلوبها، فظهرت آراء ووجهات نظر متعددة. انطلاقاً من هنا تم اختيارنا لموضوع الدراسة للوقوف على حالة هذا القطاع. وقد أثرت أن تكون الدراسة شاملة، فتناولت الدراسة وصف وتحليل بيئة الاستثمار بمجمل عناصرها ومكوناتها وتطور الاستثمار في سورية خلال مرحلة التسعينيات والآثار المتولدة عنه، ثم انتقلت إلى دراسة هيكل الاقتصاد الوطني وتحليله والقطاع الصناعي منه بشكل خاص مع التركيز على الصناعة التحويلية، والدور الذي يقوم به القطاع العام محاولاً تطبيق بعض مؤشرات قياس الفعالية الاقتصادية، كما تناولت دراسة الدور الاقتصادي للدولة ومستقبل القطاع العام الصناعي في ظل عملية الإصلاح الجارية الآن، بعد ذلك قمنا بدراسة دور القطاع العام وتحليله في التصدير، من خلال تحليل تطور الصادرات وهيكلها والسياسات الاقتصادية التي تؤثر في حركة تطورها، ومدى النجاح الذي حققه القطاع العام في هذا المجال، من خلال دراسة بعض المؤشرات وصولاً إلى دراسة العقبات والتحديات التي تواجه الصادرات الصناعية على الصعيد الداخلي والخارجي، وكيفية تطويرها وتحديثها.

جمعة، محمد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. خالد الحريري، أ.د. فضل الله سراج
الموضوع: السياسة النقدية في سورية وأثرها في نمو الناتج المحلي الإجمالي
خلال الفترة ١٩٧٠-٢٠٠٠

The Monetary Policy in Syria and it's Effect on the Growth of Gross Domestic Product during the Period 1970-2000

كثيراً ما شبهت وظيفة النقود في الاقتصاد بوظيفة الدم في جسم الإنسان، فليس بخافٍ على أحد الأهمية القصوى للنقود في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وترسيخ دعائم النمو، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها ترتبط بجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى جميع الأصعدة (الاستهلاك، الإنتاج، الأجور، الأسعار، الادخار، الاستثمار، الأجور....الخ). ولا يخفى على أحد منا أيضاً آثارها الخطيرة في التوازن الاقتصادي واستقرار الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال التأثير في حجم العرض النقدي، وحجم الائتمان لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة. فالاضطرابات النقدية تؤدي لا محالة إلى عرقلة النمو الاقتصادي بسبب انعكاسها على مجمل مؤشرات الاقتصاد الوطني. فالبحث هو محاولة علمية جادة لفهم آلية عمل السياسة النقدية في الاقتصاد السوري، وفهم طبيعة الوسائل والإجراءات النقدية في سورية، وطبيعة النتائج التي أدت إليها هذه الإجراءات والممارسات النقدية طول مدة الدراسة، إضافة إلى الاستنتاجات إلى تحقيق التوازن الاقتصادي واستقرار الأسعار، وتحقيق الاستخدام الكامل وتوازن ميزان المدفوعات السوري، وثبات سعر الليرة السورية مقابل باقي العملات. هذه الإنجازات التي تشكل مجموعها دفعةً قوياً للنمو الاقتصادي المنشود.

كرارز ، إباد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. بطرس ميالة

الموضوع: أثر البنية التنظيمية للشركات الخاضعة للمراجعة في استقلال المراجع (دراسة مقارنة)

Organization's Structure on the Auditor's Independency

(Comparative Study)

يهدف البحث إلى بيان أثر البنية التنظيمية للشركات الخاضعة للمراجعة والمتمثلة بكيفية تسلسل السلطات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمراجع، حيث استخدم الباحث أسلوب المقارنة للدراسات والبحوث التي تناولت هذا الموضوع وتوصيات المنظمات المهنية في دول المقارنة، ومن ثم مقارنة لأهم مقومات استقلال المراجع الواردة في القوانين وتوصيات المنظمات المهنية المختصة في دول المقارنة، وفي نهاية البحث أجرى الباحث استنباطاً يسبر من خلاله وجهات نظر عدة جهات في هذا الموضوع، وهذه الجهات هم المراجعون الخارجيون ومراقبو الدخل ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية ومفتشو الهيئة العامة للرقابة والنقش، ولعل أهم النتائج التي خرج بها الباحث أن المراجع في سورية معرض لفقدان استقلاله وبسهولة تجاه إدارة الشركة محل المراجعة وبالأخص الشركات المشتركة، وذلك بسبب بنيتها التنظيمية.

وردة، حسام، منار، قسم الإحصاء، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: د. خلف مطر الجراد

الموضوع: تحليل التباين واستخدامه في دراسة بعض جوانب القطاع الزراعي
في سورية (قمح ، شعير ، أغنام)

Analysis of Variance and its Usage in Studying Some Sides of Agricultural Sector (Wheat, Barley, Lambs)

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واحدة من أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة لاختبار وجود الفروق بين متوسطات عدة مجتمعات ونظراً لكونها توفر الوقت والجهد، فاستعرضنا في هذا البحث بعض جوانب هذه الطريقة وذلك من أجل أهم التصميمات المتبعة في تنفيذ التجارب من خلال بابين: الباب الأول: يعالج الأسس النظرية لتحليل التباين متضمناً خمسة فصول، الأول منها تم فيه استعراض بعض التوزيعات الاحتمالية، أما الفصول الثاني والثالث والرابع فقد كان تمن أجل التصميم التام العشوائية، تصميم الزمر تامة العشوائية، تصميم المربع اللاتيني على الترتيب، أما الفصل الأخير فقد عني بموضوع المقارنات المتعددة.

الباب الثاني: فتضمن استخدام تحليل التباين في دراسة بعض جوانب القطاع الزراعي نظراً لمساهمة الأخير الكبيرة والمتزايدة في الدخل القومي لسورية، وقد شمل هذا الباب ثلاثة فصول فكانت من أجل طريقة تحليل التباين على محصول القمح وعلى محصول الشعير وعلى الأغنام وفق الترتيب مع الفصل الأول والثاني والثالث.

حسن، حسام، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. طارق الخير

الموضوع: الإدارة بالأهداف: دراسة ميدانية للشركات المشمولة بالقرار

الوزاري رقم ٧٨١ / تاريخ ١٧/١/١٩٩٩

**Managements by Objectives an Applied Study to the Included
Establishments by the Ministerial Decision –No. 781 dd. 17.1.1999**

إن الهدف من الدراسة هو تقييم نتائج تجربة الإدارة بالأهداف في الشركات (موضوع البحث) وتضمنت الدراسة أهم الأفكار التي تركز عليها الإدارة بالأهداف والتي تمثلت في توضيح ماهيتها وتطورها التاريخي وفلسفتها، إضافة إلى مقومات هذه الإدارة وأهم فوائدها والنظم الداعمة لتطبيقها.

اشتملت الدراسة العملية على أربع شركات من شركات القطاع العام، حيث تم القيام بدراسة تحليلية للبيانات الإحصائية المتعلقة بعلم الشركات فيما يخص كمية الإنتاج، كمية المبيعات، مستوى المخزون، وذلك بهدف التعرف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تحقيق بعض الزيادات في كمية الإنتاج والمبيعات وانخفاض مستوى المخزون عن طريق إجراء دراسة مقارنة لأربعة أعوام عامي ٩٧/٩٨ قبل البدء بتطبيق التجربة وعامي ٩٩/٢٠٠٠ من عمر التجربة. إضافة إلى تحليل نتائج الاستبيان الموزع في تلك الشركات. وكنتيجة لما سبق توصل الباحث إلى جملة نتائج وقدم توصيات معينة.

وقاص، بشير، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. حسين القاضي

الموضوع: إجراءات مراجعة نفقات التطوير في شركات إنتاج النفط والغاز مع
التطبيق العملي على شركة الفرات للنفط

**Auditing Procedures for Development Expenses in Petroleum and Gaz
Companies. With Practical Application on AFPC Company**

يمثل هذا البحث دراسة ميدانية لإجراءات المراجعة المتبعة في شركاتهم تقاسم الإنتاج (الشركات النفطية) وتتبع أهمية هذا البحث من كون شركات تقاسم الإنتاج النفطية في سورية هي شركات منتجة للنفط بنسبة تتجاوز ٧٠% من إجمالي النفط المُنتج في سورية. وقد عالج البحث هذا الموضوع بمدخل نظري ثم بتطبيق عملي على إحدى شركات تقاسم الإنتاج في سورية وهي شركة الفرات للنفط.

قام الباحث بتطبيق إجراءات المراجعة التحليلية والجوهرية على الشركة الهدف، بعد أن قام بدراسة نظم الرقابة الداخلية للدورات التالية:

دورة العقود، دورة الرواتب والأجور، دورة المرأة الشراء، دورة المخزون.

وقد انتهى الباحث إلى الاستنتاج بأن الإجراءات المراجعة الملزمة لنفقات التطوير في صناعة إنتاج النفط والغاز والأخص شركات الإنتاج هي إجراءات خاصة يراد من تطبيقها الوصول إلى القناعة الكافية بأن النفقات لا تحمل أخطاءً جوهرية تؤثر في عدالة الإفصاح في القوائم المالية.

طبّاخة، محمد صالح، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. خالد الخطيب

الموضوع: قياس الربح في المؤسسة العامة للتأمين

Mesure du Profit dans L'entreprise Générale Syrienne

عرف التأمين منذ عدة قرون في أماكن متعددة من العالم، وتطور مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح له دور مهم في نواحي الحياة، حيث إنه فعلاً يمثل الضمان القوي الذي يعطي الإحساس بالأمان والاطمئنان.

فالتأمين الشخصي أي تأمين الحياة يكفل للأسرة الدخل المناسب بعد رحيل معيها أو عجزه أو مرضه أو توقفه عن العمل على الرغم من استطاعته عليه في حالة البطالة، وإن أي مشروع اقتصادي لا يمكن عدّه مكتملاً إلا إذا شملته رعاية التأمين، الذي هو الإجراء العملي للإدارة، وبذا يمكنه الثبات والاستمرار في العمل في عالم كثرت فيه المخاطر التي هي تحت السيطرة وخارجها.

فبين لحظة وأخرى نرى منشآت دهمها حريق قضى عليها، أو على معظمها، أو سرقة سببت لها مشكلات عرقلت مسيرتها، وأخطاراً أخرى يغطيها التأمين في النقل البري والبحري والجوي سواءً أكانت للركاب أو للبضائع أو للحوادث تجاه الآخرين، كمسؤولية مدنية معهم.

ضمن هذه المخاطر نجد أن التأمين منهج علمي يتبناه علماء الاقتصاد والاجتماع، كاحتياط وحذر، أفضل من الندم بعد فوات الآوان، في حماية خاصة وعامة للاقتصاد الوطني، وإن هذه الرسالة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التأمين السوري وبعث الروح فيه، ليوكب التطور في هذا العصر العالمي المتغير بكل أبعاده، وفي كل المحاور الفنية في التأمين والاستثمارية والمحاسبية، والاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية، دون تكرار التجارب التي لا فائدة فيها، مع مراعاة الظروف الخاصة المحلية ومتطلباتها كالتأمين الصحي والزراعي والتلوث البيئي والحوادث، والعمل على زيادة الوعي والثقافة التأمينية، باستخدام وسائل الإعلام المتاحة جميعها.

هذا ويخضع عقد التأمين إلى مبادئ جوهرية ومهمة أبرزها مبدأ منتهى حسن النية والمصلحة التأمينية كي يكون التعويض ممكناً عند حدوث الخطر لقاء أقساط يدفعها المؤمن له مسبقاً، كما يجب أن يكون الخطر المؤمن احتمالياً، وتوقع عدم وقوعه أكبر من وقوعه، إذ لو كانت الأخطار مؤكدة فلا مجال لتأمينها، ولتوقفت شركات التأمين عن العمل وأفلست، مع ملاحظة أن تأمين الحياة له طبيعة فنية خاصة به، إذ هو فعلاً تأمين الدخل وتعيد شركات التأمين المباشر تأمين جزء من أخطارها لدى شركات إعادة التأمين، بشكل إجباري أو اتفاقي أو اختياري ولكن تبقى علاقة المؤمن له معها فقط.

ومن الناحية المحاسبية، يجب على شركات التأمين الإفصاح عن نتائج كل قسم وكل فرع على حدة لاتخاذ القرارات والمقارنة المناسبة، وتحقيق الأفضل دائماً، ولا يكون هذا إلا بتحليل البيانات المحاسبية بشكل واضح خالٍ من الالتباس أو الغموض، حيث تتميز حسابات شركات التأمين بنواح فنية تؤثر فيها وتتطلب خبراء مختصين في رياضيات التأمين ومحاسبته واستثماراته ومعالجة تكوين الاحتياطات الفنية (الاحتياطي الحسابي والأخطار السارية وتعويضات تحت التسوية) وتسعير الأقساط، فالبيانات المالية الواضحة والصادقة، هي الأساس في الإصلاح والتطوير والتعامل مع الانحرافات بسرعة وجدية والوصول إلى النجاح.

صباغ، أسامة، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد توفيق رمضان البوطي

الموضوع: العمليات الجراحية التجميلية، أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي

Plastic Surgical Operations Their Rules and Outcomes in Islamic Jurisprudence

في ظل التقدم العلمي والطبي الكبير، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، التي شهدت تقدماً طبياً هائلاً، لكن هذا التقدم غير مضبوط بالأخلاقيات والقيم الإنسانية والسموية. وهذا البحث فيه محاولة لوضع ضوابط شرعية لخضوع الإنسان إلى العمليات الجراحية التجميلية.

وفي هذا البحث بيان لأنواع العمليات التجميلية مع وضع لجواز تعريض الإنسان نفسه للعمل الجراحي، فإن كان ثمة علاج أو تشوه خلقي أو طارئ فلا حرج من علاجه، وإن كان هناك شكل شاذ أو غير معهود في خلقه الإنسان فلا حرج أيضاً من علاجه وتجميله. أما الخضوع للعمليات التجميلية بناء على الرغبة العشوائية والهوى فغير مقبول في الشريعة.

ويبين البحث كذلك مسؤولية الجراح في العمليات التجميلية وصورة العقد بينه وبين المريض.

ويتبين للقارئ في ختام البحث حرص الإسلام على الإنسان وتحقيق مصالحه.

العسة، منى، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. نور الدين عتر

الموضوع: دراسة وتحقيق جزء من مخطوطة تحفة الأبرار من ورقة (٦٥-١)

للبابرتي

The studying and the Inspection of Apat of the Manuscript (Tohfet Al-Abrar) in the Babrty Form Page (1-65)

يُلقي هذا البحث في قسمه الأول الضوء على إمام من أئمة العلوم الشرعية، الذين امتازوا بالعلم الواسع المتنوع: أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي (ت ٧٨٦هـ). وكتابه ""تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار""، الذي يُعدّ أحد كتب الشروح الحديثة الغزيرة الفائدة.

وذلك من خلال دراسة عصر المؤلف وحياته العامة والعلمية، ثم التعريف بكتابه هذا وتحقيق اسمه ونسبته إليه ومنهجه فيه.

ثم يشير البحث إلى الطريقة المتبعة في تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه، وذلك من خلال إثبات الفروق بين نسخ المخطوط، وتخريج الآيات والأحاديث، وعزو الآراء الفقهية واللغوية إلى مصادرها المعتمدة، والتوثيق بذكر مصادر المعلومات التي ينقل عنها المؤلف.

كل ذلك مع التعليق على يُحتاج إليه من شرح مفردة غريبة أو مسألة غامضة أو استدراك شيء فات المؤلف.

ثم يأتي القسم الثاني من البحث والذي يتضمن النص المحقق على بابين: الباب الأول في شرح الأحاديث التي أولها من. والباب الثاني شرح الأحاديث التي أولها إن.

صفي الدين، بلال، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. وهبة الزحيلي

الموضوع: أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي – بحث مقارن

(Ahlu-alhalli wa alaked) In the Islamic Political System Comparative Search

يكتسب البحث في هذا الموضوع أهمية خاصة، بسبب قلة الدراسات المتقدمة فيه، سواء عند إظهار الفقهاء المتقدمين أو عند الباحثين المعاصرين، كما يشهد لأهمية الكتابة فيه ضرورة إظهار هذا المصطلح الأصيل الذي مست الحاجة إلى المقارنة بينه وبين المفاهيم السياسية المتداولة اليوم ويشتمل هذا البحث على تمهيد وفصول أربعة.

فالتمهيد في الأسباب الداعية إلى دراسة هذا الموضوع.

وبيحث الفصل الأول في مفهوم أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، فيبين تعريف هذا المصطلح لغة واصطلاحاً، ويقارن بينه وبين المصطلحات الشرعية والسياسية الوضعية التي يمكن أن تشتبه به.

أما الفصل الثاني فيبين مشروعية وجود أهل الحل والعقد من خلال دراسة هذه الجماعة في العصر النبوي وعصر الخلفاء، ومن خلال بيان التأصيل الشرعي للإلزام بقرار أهل الحل والعقد.

أما الفصل الثالث ففيه تفصيل نظام أهل الحل والعقد، سواء في مجال الشروط الواجب توافرها فيهم، أو عناصرهم، أو في طريقة اختيارهم، قديماً وحديثاً، كما أن فيه صياغة لقانون يشتمل على تفاصيل عمل جماعة أهل الحل والعقد.

أما الفصل الرابع ففيه بيان مسؤولية أهل الحل والعقد، وتتلخص هذه المسؤولية في جانبين: الجانب الديني، والجانب السياسي، وقد كان التفصيل في الجانب الثاني أكثر، فقد اشتمل على

وظيفة هذه الجماعة في بيعة رئيس الدولة، والرقابة على أعماله، وعزله عند وجود دواعي هذا العزل.

وقد عملت في هذا البحث على إيجاد الحلول الواقعية لما يجد من حوادث في ميدان نظام الحكم، بالاستناد إلى النصوص الشرعية، والسعي لتوخي تحقيق المصلحة، والعمل على تلافي الظواهر المرضية التي وقع فيها بعض الباحثين في موضوعات نظام الحكم الإسلامي.

سعيد المجاهد، محمد، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد الحسن البُغا

الموضوع: التعارض بين النصوص في العموم والخصوص

Contradiction and Ovtweighing between Texts in the General and the Particulan

هذه أطروحة أعدت لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله من كلية الشريعة في جامعة دمشق، وقد جعلت عنوانها: التعارض والترجيح بين النصوص في العموم والخصوص، وقسمتها إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهارس. تحدثت في الفصل الأول: عن التعارض، وفي الفصل الثاني: عن الترجيح، وفي الفصل الثالث: عن العام، وأما الفصل الرابع: فتحدثت فيه عن الخاص، ثم ذكرت في الخاتمة النتائج التي توصلت إليها، وقسمت الفهارس إلى سبعة أنواع وإن الذي دفعني إلى اختيار هذا البحث الهام وجود بعض النصوص من الكتاب أو السنة التي ظاهرها التعارض، وحقيقتها التوافق؛ لأنها تنزّل من لدن حكيم عليم، فأردت أن أدفع هذا التعارض الظاهري بطريقة منهجية أصولية، ولا بد من الإشارة إلى وجود بحوث في هذا الشأن، وهي مع قلتها لم توفّر الموضوع حقه.

المصري، غيداء، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد الحسن البغا

الموضوع: شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون دراسة مقارنة

Woman witness in the Islamic Jurisprudence and the Law Comparative Study

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ومن والاه وبعد:

تثار تساؤلات شتى حول بعض أحكام شهادة المرأة في الفقه الإسلامي، ويعدّها بعضهم دليلاً على أن الإسلام ما أنصف المرأة، فتناولت هذا الموضوع بالبحث فجاءت الدراسة في أربعة فصول، وفصل تمهيدي سابق عليها. فبينت أولاً حقيقة الشهادة بتعريفها وبيان شروطها العامة، ثم بحثت في الفصل الأول: شهادة المرأة في المسائل المدنية: في المعاملات المالية والأحوال الشخصية. وفي الفصل الثاني: تناولت شهادة المرأة في الجريمة والعقوبة فبحثت شهادة في إثبات مختلف أنواع الجرائم على اختلاف عقوباتها، وشهادتها لدفع العقوبة أو تخفيفها وتأخيرها أو تكميلها. وفي الفصل الثالث: بحثت شهادة المرأة فيما تختص بالاطلاع عليه غالباً من أمور النساء كالولادة والرضاع والعيوب الباطنة ونحوه، وما يترتب على ذلك من النسب والإرث وفسخ بعض العقود ونحو ذلك. وفي الفصل الرابع بحثت شهادة المرأة بمعنى الإخبار أو الخبرة في شهادتها في الشهور والزمان والترجمة للقاضي، وتعديل الشهود، وبحثت في شهادة المرأة الخبيرة في بعض العلوم والطب والقيافة.

الزبداني، عمر، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد الحسن البغا

الموضوع: الاجتهاد المقاصدي وأثره في قضايا إسلامية معاصرة

Al Ijtihad Al Maqasedi and its Effect in Modern Islamic Cases

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الاجتهاد المقاصدي، ودوره في معالجة قضايا الفقه المعاصرة، وكان الاهتمام بهذا الموضوع ناتجاً عن نواتج الاهتمام بموضوع مقاصد الشريعة، وتعدد الدراسات حولها.

وكنت واحداً من الذين أولوا عناية واهتماماً بهذا الموضوع، فاخترت عنواناً لبحثي الجامعي "الاجتهاد المقاصدي وأثره في قضايا إسلامية معاصرة" بينت فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد، وأكدت أهمية مقاصد الشريعة ودورها في عملية الاجتهاد الفقهي، وأن الفقه الحي هو الفقه الناظر إلى مقاصد النصوص وغاياتها، لا إلى ألفاظها وحرفيتها. وألمعت إلى أنه لم يعد يكفي أن نؤكد أهمية مقاصد الشريعة، بل لا بد من الاجتهاد على ضوءها، وتطبيقها على قضايانا الراهنة، ومن هنا ضمنت بحثي ثلاث مسائل فقهية معاصرة هي: التأمين على الحياة، والشورى السياسية، وسفر المرأة، حاولت معالجتها وفق ذلك المنظور.

الباشا، مؤمنة، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. نور الدين عتر

الموضوع: تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار

The Faithes of Precious Explain the Lights of Easts

لقد كلفت بتحقيق جزء من كتاب تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار ""للعلامة محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي المتوفي سنة ست وثمانين وسبعمئة هـ.

والكتاب عبارة عن شرح لأحاديث انتقاها حسن بن محمد حسن الصغاتي صاحب كتاب ""مشارق الأنوار"" ورتبه بترتيب أنيق جعله اثني عشر باباً.

وقام المؤلف البابرتي بشرحها شرحاً حسناً، عني بالمعاني اللغوية والفوائد البلاغية والمسائل الفقهية والاعتقادية والفوائد الإرشادية.

وقد قمت بتحقيق جزء من هذا الكتاب وهو شرح أحاديث الباب الثاني من كتاب ""مشارق الأنوار"" حيث قابلت بين نسخ المخطوط التي توافرت بين يدي وخرجت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ووثقت معاني الألفاظ اللغوية والأقوال الفقهية والمسائل الاعتقادية لمصادرها المعتمدة، كما أضفت الكثير من التعليقات للتوضيح والفائدة العلمية، كما ترجمت للأعلام والقبائل والبلدان الواردة في الكتاب، وحاولت الالتزام بالدقة الشديدة في العزو إلى المصادر وبالنزاهة العلمية.

السعدي، أحمد محمد سعيد، كلية الشريعة ، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد الحسن البغا

الموضوع: شروط المجتهد ومدى توافرها في الاجتهاد المعاصر

Conditions for Jurisprudence & How far they are Available in Contemporary Jurisprudence

هذا البحث (شروط المجتهد ومدى توافرها في الاجتهاد المعاصر) بحث أعدته لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي وأصوله، والغاية الأساسية منه تحديد مدى أهلية الشرعيين للمشاركة في بحوث المجامع الفقهية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في جميع من يريد أن يتصدى للفتوى والاجتهاد الفقهي.

وقد قسمت البحث إلى بابين: الأول في الشروط المتعلقة بمصادر التشريع، والثاني في الشروط المتعلقة بفهم النصوص. وقد استعنت لتفصيل هذه الشروط بطريقة الموازنة والترجيح عند اختلاف الأصوليين، وطريقة استعراض الأقوال وتحليلها عند اتفاقهم. وقد خرجت نتيجة هذا البحث المستقصي إلى جملة من النتائج المهمة؛ ولعل أهمها وجوب إتقان الباحث الذي يريد أن يتصدى للفتوى لعلمي الأصول والعربية، بالإضافة إلى فهم الواقع الذي يريد أن يتصدى للفتوى لعلمي الأصول العربية، بالإضافة إلى فهم الواقع الذي يريد أن يحكم عليه. واستنتجت جملة من الحقائق أبرزها غياب آلية واضحة تحدد أهلية المشاركين في المؤتمرات الفقهية ومجامع الفقه الإسلامي.

السماك، غانم سعيد، كلية الحقوق، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد الحسين

الموضوع: الاعتداء المادي في القانون الإداري

La Voie de Fait en Droit Administratif

استعرضنا في مقدمة الرسالة قصة الإنسان مع السلطة منذ وجوده على وجه الأرض وحتى وقتنا الحاضر، وبيّنا كيف نشأت الدولة وكيف تطورت من دولة حامية إلى دولة راعية، ثم إلى متداخلة فهيمنت على مختلف الشؤون الحياتية وتنظيمها مستخدمة نشاطها لضمان حسن سير المرافق العامة فيها عن طريق الإدارة العامة المختصة بهذه المهمة.

والإدارة وهي تنهض في مهامها لا بد لها أن تتمسك بمبدأ المشروعية مبدأ سيادة القانون وإذا ما خرجت عنه وخالفت أحكامه كان تصرفها معيباً وشاب قرارها البطلان، أما إذا بلغ خروجها قدراً كبيراً من الجسامة انقلبت قراراتها معدومة. والمشرع في مجال القانون العام خص الإدارة بامتيازات بأن أعطاها الحق بإصدار قرارات بإدارتها المنفردة وخولها سلطة التنفيذ المباشر في بعض الحالات ودون انتظار لحكم القضاء. وتأكيداً على هذه الامتيازات فقد أنشأ المشرع المحاكم الإدارية بقانون مجلس الدولة لتختص بالنظر في المنازعات التي تقع بينها وبين غيرها من الإدارات وبينها وبين الأفراد إن هي اعتدت على حقوقهم. وتجمع شريحة من رجال القانون الإداري أو تكاد على أن فكرة الاعتداء المادي غامضة وغير محددة الملامح ومعقدة وتبعث على الحيرة والتردد، وهذا الأمر حفز بعض فقهاء القانون الإداري للتخلي عنها من أساسها.

ولأهمية بحث الاعتداء المادي فقد اخترناه موضوعاً لهذه الرسالة وبحثنا فيه بأبعاده الثلاثة الفقهية والقضائية والتشريعية في الدول الثلاث في فرنسا وسورية ومصر، وتمهيداً لذلك خصصنا الباب التمهيدي لبيان منطلقات فكرة الاعتداء المادي في فصول ثلاث تناول الفصل

الأول، منها لمحة تاريخية عن الاعتداء المادي، والفصل الثاني، القرار الإداري، والفصل الثالث

مبدأ المشروعية، وبعد الباب التمهيدي قسمنا موضوع الرسالة إلى قسمين: القسم الأول ويبحث في ماهية الاعتداء المادي وعناصره وموقف الفقه والقضاء منه، فكان الباب الأول منه تعريف الاعتداء المادي وعناصره وانتهينا إلى تعريف شخصي له بأنه: ""عمل مادي تنفذه الإدارة ونطوي على مخالفة جسيمة لمبدأ المشروعية باعتدائها على الملكية الخاصة أو الحريات الفردية"".

وتناولنا في الباب الثاني تمييز الاعتداء المادي عما قد يتشابه معه وموقف الفقه والقضاء منه. ثم فصلنا في القسم الثاني من الرسالة الآثار التي تترتب على الاعتداء المادي في بابين الباب الأول منه اختصاص القضاء في النظر في الاعتداء المادي والقيود التي ترد عليه. وتناولنا في الباب الثاني من هذا القسم مسؤولية الإدارة عن فعل الاعتداء وموقف المتضرر منه ، ثم أتبعناه بخاتمة بيّنا فيها رأيًا ومقترحاتنا فما عالجناه.

الدباس، مايا، كلية الحقوق، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد عزيز شكري ومشاركة د. ماهر ملندي

الموضوع: نظام استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية

– حالة نهر الفرات-

The System of Non-Navigational Uses of International Water Courses the Situation of Euphrates River

قال الله تعالى:

""أو لم يرَ الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففلقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون"" . الأنبياء (30).

آية كريمة تبين أهمية الماء في حياة الأمم والشعوب، منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكل من على الأرض وما عليها من الإنسان والحيوان والنبات وسائر الكائنات الحية الأخرى، حياته ويقائه مرتبط بالماء، فالماء عصب الحياة بل هو الحياة ذاتها.

فمسألة المياه تشكل موضوع الساعة، لا يسبب خطورة المنازعات الناتجة عن ظواهر الندرة والجفاف والاستغلال غير المدروس للمصادر المائية فحسب، بل كذلك نتيجة لتصاعد الحاجة إلى إيجاد حلول قانونية مقبولة من الدول المعنية. والطبيعة الخاصة كونها لا تعرف الحدود والادعاءات المتعارضة للدول المعنية، التي غالباً ما تستند إلى مطالب السيادة والحقوق التاريخية المؤكدة أو المشكوك فيها، كل ذلك يدفعنا في البداية إلى دراسة التصاعد المستمر للمشاكل الناجمة عن استخدامات مصادر المياه العذبة (الباب الأول) لبيان أسباب الأزمة المائية في الوطن العربي (الفصل الأول)، وما خلفته من آثار على بعض الدول العربية (الفصل الثاني).

ثم نتناول التطور التاريخي لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية (الباب الثاني). وذلك عبر أربعة فصول متتالية: الاتفاقيات الدولية (العامة والخاصة) (الفصل الأول). والقواعد العرفية الدولية (الفصل الثاني)، والقضاء والتحكيم (الفصل الثالث)، والمؤسسات الفقهية والمنظمات الإقليمية والدولية (الفصل الرابع).

ثم نبحث في القواعد والمبادئ القانونية القابلة للتطبيق على استخدام مجرى الفرات (الفصل الثالث). وذلك عبر أربعة فصول متتالية: السيادة على المصادر الطبيعية (الفصل الأول)، ومدى احترام الالتزامات الاتفاقية بين الدول (الفصل الثاني)، والاستخدام المنصف وغير الضار للمجاري المائية الدولية (الفصل الثالث)، والتعاون والتفاوض بحسن نية (الفصل الرابع).

وصولاً إلى الخاتمة المتضمنة دراسة الوضع الدولي لمجرى الفرات والرؤية المستقبلية للتسوية الممكنة لمسألة الفرات.

كمال الدين الشماط، محمد، شوقي، قسم القانون العام، القانون الإداري،
كلية الحقوق، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد الحسين
الموضوع: عيب الانحراف بالسلطة

Detournement de Pouvoir

تقوم السلطة التنفيذية بوصفها إدارة عامة بإدارة المرافق العامة وتسييرها وإشباع الحاجات العامة مفتحة شتى ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي سعيها الدؤوب لتحقيق المصلحة العامة تستخدم السلطات والامتيازات الواسعة والخطيرة المستمدة من القانون العام والتي خولها لها المشرع لأداء وظائفها على أكمل وجه.

وفي مسعاها هذا لا بد أن تلامس حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم المشروعة ولاسيما في استخدامها لوسيلتها الأهم: القرار الإداري الذي تتمتع بامتياز افتراض سلامته من عيوب المشروعية وقابليته للتنفيذ بإدارتها المنفردة، الأمر الذي يقتضي معه ممارسة رقابة قضائية فاعلة وكافية على قراراتها الإدارية صيانة للمشروعية ولحقوق الأفراد وحرياتهم ولاسيما لجهة مشروعية الغاية منها، وهي ما يرد عليها عيب الانحراف بالسلطة عند سعيها لغايات غير مشروعة و غير معترف بها أو سعيها إليها بغير الوسائل التي رسمها القانون لذلك.

وتتعرض الرسالة إلى بحث مستجد ومعقد لعدد من القضايا المتصلة بعيب الانحراف بالسلطة من حيث نشأته وتطوره وتعريفه في الفقه والقضاء الإداريين، وبحث حالاته وخصائصه، وشروط تحققه، وتحديد موقعه بين عيوب المشروعية الأخرى (عيب السبب والاختصاص والشكل ومخالفة القانون) ومقارنته بالنظريات المشابهة (نظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية الغلو في قضاء التأديب) وبحث علاقته بفكرة النظام العام ومسألة إثباته وجزائه.

ولقد جاءت الرسالة مقارنة لطريقة تعاطي القضاء الإداري مع عيب الانحراف في فرنسا وسورية ومصر ولبنان، ووقعت بما يقارب /470/ صفحة نأمل أن تصادف النجاح والتوفيق والله من وراء القصد.

منصور، يمن، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ. د. صباح الدين بقجه جي، وبمشاركة: د. صوفي سيغاري
الموضوع: الموثوقية ومعاييرها الرياضية

La Fiabilité et Ses Critères Mathématiques

يعنى هذا البحث بدراسة موثوقية الآلات والمشكلات الاحتمالية المتعلقة بالتوقف عن العمل والاستبدال.

حيث تم توضيح ماهية الموثوقية، وأسسها الرياضية الإحصائية، والتعرض إلى بعض القوانين الأساسية النظرية المستخدمة في دراستها، ومن أجل الحصول على تقدير الموثوقية في التراكيب الآلية تمت دراسة الهياكل الأساسية لها.

من ناحية أخرى حاولنا تقدير القانون الاحتمالي المعبر عن موثوقية آلة قابلة للإصلاح بشكل مستجد، ووضع صيغة تحليلية له بالاعتماد على نظرية الفروق، وكذلك وضع بعض الصيغ لقوانين احتمالية لتوقف هذه الآلة عن العمل من خلال تركيب وتجزئة في الصيغ الرياضية لبعض القوانين الاحتمالية النظرية المعروفة.

تطرقنا أيضاً إلى الأعطال والتعطلات في الأجهزة المعقدة، فتم التعرف على مصادر التعطل في هذه الأجهزة، ودراسة الفجوات بين أعطالها، ومن ثم تقدير كيفية توزيع الأعطال خلال فترة استخدامها.

وعالجنا الآلات واستبدالها من خلال تقدير الاحتمالات المرتبطة بفعاليتها وتوقفها ودراسة الخطر العمري لها، وتنسيقها واستبدالها ببديل جديد.

أما صيانة الآلات وإصلاحها فتمت معالجتهما باستخدام نظرية صفوف الانتظار والمصفوفة الماركوفية.

وتم إيجاد تكلفة استخدام الآلة في حالات متعددة بغية تحديد أفضل الأوقات التي يجب عندها القيام بعمليات الصيانة والاستبدال.

أخيراً قمنا بدراسة تطبيقية على الآلات وأعطالها في شركتي بردى والحافظ للبرادات وبعرض النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.

صيوح، لؤي، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين
إشراف: أ.د. نزار قنوع و أ.د. هيثم سطايعي
الموضوع: الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط بعدها الاقتصادي
والسياسي

US. Strategic in the Middle East Political and Economical Level

إن فهم الاستراتيجية الأمريكية وسياساتها الخارجية أصبح ضرورة حتمية، نظراً لكونها -سواء شئنا أم أبينا- تشكل القطب الأهم في النظام الدولي الحالي، والقوة الخارجية المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط اقتصادياً وعسكرياً فهي واقع يفرض نفسه على أغلبية المجتمعات الإقليمية.

ومن ناحية أخرى فإننا سنبرز العلاقة المعقدة بين الرئيس والكونغرس وجماعات الضغط التي تؤدي دوراً حاسماً في تشكيل السياسة الأمريكية الخارجية، ونوضح التضارب بينها حول تحديد المصالح الأمريكية، ولكنها نادراً ما تختلف في حال وجود إسرائيل كطرف. ومحاولة سلب العرب نفطهم بأرخص الأثمان واللعب بمصائيرهم بشكل يومي واعتبارها كامل المنطقة مزرعة لعسكرييها ولشركاتها، وتهتد بالتدخل وتحاول كسر الإرادات والتلويح بالعقوبات بجميع أنواعها الأمريكية واحتضانها المشروع الصهيوني في حلته الإسرائيلية المعادية. فجعلت منه مجتمعاً مدججاً بالسلاح الحديث متجاهلاً القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص احتلاله الأراضي العربية ومحاولة فرض نظام (شرق أوسطي) بديل عن النظام القومي العربي تكون فيه إسرائيل القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية بدعم مبارك من الولايات المتحدة الأمريكية.

فمطلوب من العرب اليوم تجميع القوى والموارد والسعي لبناء سوق عربية مشتركة، والوقوف موقفاً واضحاً من القضايا التي تستهدف فك وإعادة ترتيب الخارطة السياسية والاقتصادية للمنطقة بما ينسجم ويتوافق مع أعداد المنطقة والأمة.

خضري، رولا، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. عبد الرحيم بوادقجي

الموضوع: السكان والأمن الغذائي في الوطن العربي مع إشارة خاصة لسورية

**La Population et la Sécurité Alimentaire dans la Région Arabe avec un
Indice Spécial Pour la Syrie**

تُعَدُّ قضية الأمن الغذائي من أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي لما لها من تأثيرات مباشرة في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما يرتبط بها من قرارات ومسارات تنموية.

وبطبيعة الحال تؤثر العوامل الطبيعية والمناخية والتقنية والسياسات الاقتصادية الزراعية تأثيراً مباشراً في تحديد ملامح الأمن الغذائي العربي. وتنعكس آثار تلك العوامل والجهود التنموية المبذولة على أوضاع إنتاج وتجارة واستهلاك السلع الغذائية ومعدلات الاكتفاء الذاتي منها على المستويات القطرية والقومية.

ومن ناحية أخرى فإن معدلات النمو السكاني المرتفعة نسبياً، وما يترتب عليها من زيادة الاحتياجات الاستهلاكية بمعدلات عالية. لا تزال من العوامل التي تؤثر في أوضاع الأمن الغذائي العربي، وتفرض سباقاً غير متكافئ بين القدرات والإمكانات الإنتاجية وبين الاحتياجات والمتطلبات الاستهلاكية. الأمر الذي أدى إلى تفاقم العجز الغذائي، وتزايد الاعتماد على الخارج، وتزايد المديونية الخارجية والتبعية الغذائية، وما تجره هذه التبعية من ضغوط خارجية من قبل الدول المنتجة. لذلك لا بد من تبني استراتيجية زراعية عربية تكاملية لسد الفجوة الغذائية المتفاقمة وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

ومن الجدير بالذكر أنه نتيجة لانتهاج سورية استراتيجية واضحة، بدءاً من التسعينيات في مجال التنمية الزراعية، استطاعت أن تنتقل من مرحلة استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي منها، ثم إلى مرحلة توفير فائض تصديري من بعض السلع الغذائية يؤمن احتياجاتها من القطع النادر.

عبد الرؤف، رياض، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. حسين القاضي

الموضوع: استخدام تقانات المعاينة الإحصائية في تقويم نظم الرقابة الداخلية
مع التطبيق العملي على شركة الفرات للنفط

**The Using of Statistical sampling Techniques in the Evacuation of Internal
Control Systems –With Practical Application to Alfurat Petroleum
Company**

يبين هذا البحث أنه يمكن الاستفادة من تقانات المعاينة الإحصائية في تقويم نظم الرقابة الداخلية كمرحلة من مراحل المراجعة، وذلك وفق خطوات محددة حيث يساهم استخدام تقانات المعاينة الإحصائية في تخفيض درجة الاعتماد على الحكم الشخصي دون أن يلغي الحاجة إليه. هناك عدة تقانات للمعاينة الإحصائية يمكن استخدامها ولكن لكل منها ظروفًا وشروطًا تطبق ضمنها أي أنها ليست بديلة عن بعضها بعضاً وينبغي أن ينتقي المراجع التقنية الأكثر ملاءمة ضمن البيئة المحيطة، وقد تم عرض التقانات التي يمكن استخدامها ثم شرح البحث كيفية تطبيقها عملياً في سياق مراجعة حسابات شركة الفرات للنفط من خلال خطوات واضحة وموجهة تمثل دليل عمل لكيفية استخدام التقانات، ونتيجة لما سبق، توصل الباحث إلى نتائج وقدم توصيات معينة.

غانم، ممدوح، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ. د. محمد خالد الحريري

الموضوع: جدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سورية

Benefit of Foreign Direct Investment in Syria

يتناول البحث دراسة تجربة سورية مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن بدأت مسيرة الانفتاح الاقتصادي على إثر صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991. حيث استطاعت سورية جذب بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسعت جاهدة لتوطينها. لكن عدم توافر المناخ الاستثماري الملائم ووجود العديد من الصعوبات والمعوقات في وجه تلك الاستثمارات، قد عمل على تقليصها، وغدت الإمكانية ضعيفة جداً للاستفادة منها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي والتكوين الرأسمالي الثابت وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الدخل واستقدام تكنولوجيات متطورة. لذلك ينبغي على سورية أن تسعى لتحسين المناخ الاستثماري وتذليل كل الصعوبات والمشاكل لكي تصبح إحدى مناطق الجذب الاستثماري في العالم لتوظيف الاستثمارات المباشرة في خدمة التنمية الاقتصادية.

العلي، محمود ابراهيم، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ. د. مصطفى العبد الله الكفري، د. غسان محمود ابراهيم
الموضوع الاستثمار الحكومي في قطاع الصناعة ودوره في تنمية الصادرات في
سورية

The Governmental Investment in the Industrial Sector and its Role in the Development of Exports in the Syrian Arab Republic

يدور الحديث والنقاش في جميع الأوساط، منذ فترة طويلة نسبياً، حول جدوى وكفاءة القطاع العام والصناعي منه بشكل خاص، والجميع متفق حول ضرورة القيام لعملية إصلاح شامل في الاقتصاد الوطني ومعالجة مشاكله، والاختلاف يدور حول كيفية المعالجة وأسلوبها، فظهرت آراء ووجهات نظر متعددة. انطلاقاً من هنا تم اختيارنا لموضوع الدراسة للوقوف على حالة هذا القطاع. وقد أثرت أن تكون الدراسة شاملة، فتناولت الدراسة وصف وتحليل بيئة الاستثمار بمجمل عناصرها ومكوناتها وتطور الاستثمار في سورية خلال مرحلة التسعينيات والآثار المتولدة عنه، ثم انتقلت إلى دراسة هيكل الاقتصاد الوطني وتحليله والقطاع الصناعي منه بشكل خاص مع التركيز على الصناعة التحويلية، والدور الذي يقوم به القطاع العام محاولاً تطبيق بعض مؤشرات قياس الفعالية الاقتصادية، كما تناولت دراسة الدور الاقتصادي للدولة ومستقبل القطاع العام الصناعي في ظل عملية الإصلاح الجارية الآن، بعد ذلك قمت بدراسة دور القطاع العام وتحليله في التصدير، من خلال تحليل تطور الصادرات وهيكلها والسياسات الاقتصادية التي تؤثر في حركة تطورها، ومدى النجاح الذي حققه القطاع العام في هذا المجال، من خلال دراسة بعض المؤشرات وصولاً إلى دراسة العقبات والتحديات التي تواجه الصادرات الصناعية على الصعيد الداخلي والخارجي، وكيفية تطويرها وتحديثها.

جمعة، محمد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ. د. خالد الحريري، أ. د. فضل الله سراج
الموضوع: السياسة النقدية في سورية وأثرها في نمو الناتج المحلي الإجمالي
خلال الفترة 1970-2000

The Monetary Policy in Syria and it's Effect on the Growth of Gross Domestic Product during the Period 1970-2000

كثيراً ما شبهت وظيفة النقود في الاقتصاد بوظيفة الدم في جسم الإنسان، فليس بخافٍ على أحد الأهمية القصوى للنقود في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وترسيخ دعائم النمو، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها ترتبط بجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى جميع الأصعدة (الاستهلاك، الإنتاج، الأجور، الأسعار، الادخار، الاستثمار، الأجور...الخ). ولا يخفى على أحد منا أيضاً آثارها الخطيرة في التوازن الاقتصادي واستقرار الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال التأثير في حجم العرض النقدي، وحجم الائتمان لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة. فالاضطرابات النقدية تؤدي لا محالة إلى عرقلة النمو الاقتصادي بسبب انعكاسها على مجمل مؤشرات الاقتصاد الوطني. فالبحث هو محاولة علمية جادة لفهم آلية عمل السياسة النقدية في الاقتصاد السوري، وفهم طبيعة الوسائل والإجراءات النقدية في سورية، وطبيعة النتائج التي أدت إليها هذه الإجراءات والممارسات النقدية طول مدة الدراسة، إضافة إلى الاستنتاجات إلى تحقيق التوازن الاقتصادي واستقرار الأسعار، وتحقيق الاستخدام الكامل وتوازن ميزان المدفوعات السوري، وثبات سعر الليرة السورية مقابل باقي العملات. هذه الإنجازات التي تشكل مجموعها دفعاً قوياً للنمو الاقتصادي المنشود.

كراز، إباد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. بطرس ميالة

الموضوع: أثر البنية التنظيمية للشركات الخاضعة للمراجعة في استقلال المراجع (دراسة مقارنة)

anization's Structure on the Auditor's Independency
(Comparative Study)

يهدف البحث إلى بيان أثر البنية التنظيمية للشركات الخاضعة للمراجعة والمتمثلة بكيفية تسلسل السلطات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمراجع، حيث استخدم الباحث أسلوب المقارنة للدراسات والبحوث التي تناولت هذا الموضوع وتوصيات المنظمات المهنية في دول المقارنة، ومن ثم مقارنة لأهم مقومات استقلال المراجع الواردة في القوانين وتوصيات المنظمات المهنية المختصة في دول المقارنة، وفي نهاية البحث أجرى الباحث استنباطاً يسبر من خلاله وجهات نظر عدة جهات في هذا الموضوع، وهذه الجهات هم المراجعون الخارجيون ومراقبو الدخل ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية ومفتشو الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، ولعل أهم النتائج التي خرج بها الباحث أن المراجع في سورية معرض لفقدان استقلاله وبسهولة تجاه إدارة الشركة محل المراجعة وبالأخص الشركات المشتركة، وذلك بسبب بنيتها التنظيمية.

وردة، حسام، منار، قسم الإحصاء، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: د. خلف مطر الجراد

الموضوع: تحليل التباين واستخدامه في دراسة بعض جوانب القطاع الزراعي
في سورية (قمح ، شعير، أغنام)

Analysis of Variance and its Usage in Studying Some Sides of Agricultural
Sector (Wheat, Barley, Lambs)

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واحدة من أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة لاختبار وجود الفروق بين متوسطات عدة مجتمعات ونظراً لكونها توفر الوقت والجهد، فاستعرضنا في هذا البحث بعض جوانب هذه الطريقة وذلك من أجل أهم التصميمات المتبعة في تنفيذ التجارب من خلال بابين: الباب الأول: يعالج الأسس النظرية لتحليل التباين متضمناً خمسة فصول، الأول منها تم فيه استعراض بعض التوزيعات الاحتمالية، أما الفصول الثاني والثالث والرابع فقد كان تمن أجل التصميم التام العشوائية، تصميم الزمر تامة العشوائية، تصميم المربع اللاتيني على الترتيب، أما الفصل الأخير فقد عني بموضوع المقارنات المتعددة.

الباب الثاني: فتضمن استخدام تحليل التباين في دراسة بعض جوانب القطاع الزراعي نظراً لمساهمة الأخير الكبيرة والمتزايدة في الدخل القومي لسورية، وقد شمل هذا الباب ثلاثة فصول فكانت من أجل طريقة تحليل التباين على محصول القمح وعلى محصول الشعير وعلى الأغنام وفق الترتيب مع الفصل الأول والثاني والثالث.

حسن، حسام، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. طارق الخير

الموضوع: الإدارة بالأهداف: دراسة ميدانية للشركات المشمولة بالقرار

الوزاري رقم / 781 / تاريخ 1999/1/17

**Managements by Objectives an Applied Study to the Included
Establishments by the Ministerial Decision –No. 781 dd. 17.1.1999**

إن الهدف من الدراسة هو تقييم نتائج تجربة الإدارة بالأهداف في الشركات (موضوع البحث) وتضمنت الدراسة أهم الأفكار التي تركز عليها الإدارة بالأهداف والتي تمثلت في توضيح ماهيتها وتطورها التاريخي وفلسفتها، إضافة إلى مقومات هذه الإدارة وأهم فوائدها والنظم الداعمة لتطبيقها.

اشتملت الدراسة العملية على أربع شركات من شركات القطاع العام، حيث تم القيام بدراسة تحليلية للبيانات الإحصائية المتعلقة بعلم الشركات فيما يخص كمية الإنتاج، كمية المبيعات، مستوى المخزون، وذلك بهدف التعرف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تحقيق بعض الزيادات في كمية الإنتاج والمبيعات وانخفاض مستوى المخزون عن طريق إجراء دراسة مقارنة لأربعة أعوام عامي 98/97 قبل البدء بتطبيق التجربة وعامي 2000/99 من عمر التجربة. إضافة إلى تحليل نتائج الاستبيان الموزع في تلك الشركات. وكننتيجة لما سبق توصل الباحث إلى جملة نتائج وقدم توصيات معينة.

وقاص، بشير، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. حسين القاضي

الموضوع: إجراءات مراجعة نفقات التطوير في شركات إنتاج النفط والغاز مع
التطبيق العملي على شركة الفرات للنفط

**Auditing Procedures for Development Expenses in Petroleum and Gaz
Companies. With Practical Application on AFPC Company**

يمثل هذا البحث دراسة ميدانية لإجراءات المراجعة المتبعة في شركاتهم تقاسم الإنتاج (الشركات النفطية) وتتبع أهمية هذا البحث من كون شركات تقاسم الإنتاج النفطية في سورية هي شركات منتجة للنفط بنسبة تتجاوز 70% من إجمالي النفط المُنتج في سورية. وقد عالج البحث هذا الموضوع بمدخل نظري ثم بتطبيق عملي على إحدى شركات تقاسم الإنتاج في سورية وهي شركة الفرات للنفط.

قام الباحث بتطبيق إجراءات المراجعة التحليلية والجوهرية على الشركة الهدف، بعد أن قام بدراسة نظم الرقابة الداخلية للدورات التالية:

دورة العقود، دورة الرواتب والأجور، دورة المراءة الشراء، دورة المخزون.

وقد انتهى الباحث إلى الاستنتاج بأن الإجراءات المراجعة الملائمة لنفقات التطوير في صناعة إنتاج النفط والغاز والأخص شركات الإنتاج هي إجراءات خاصة يراد من تطبيقها الوصول إلى القناعة الكافية بأن النفقات لا تحمل أخطاءً جوهرية تؤثر في عدالة الإفصاح في القوائم المالية.

طباخة، محمد صالح، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ. د. خالد الخطيب
الموضوع: قياس الربح في المؤسسة العامة للتأمين

Mesure du Profit dans L'entreprise Générale Syrienne

عرف التأمين منذ عدة قرون في أماكن متعددة من العالم، وتطور مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح له دور مهم في نواحي الحياة، حيث إنه فعلاً يمثل الضمان القوي الذي يعطي الإحساس بالأمان والاطمئنان.

فالتأمين الشخصي أي تأمين الحياة يكفل للأسرة الدخل المناسب بعد رحيل معيها أو عجزه أو مرضه أو توقفه عن العمل على الرغم من استطاعته عليه في حالة البطالة، وإن أي مشروع اقتصادي لا يمكن عده مكتملاً إلا إذا شملته رعاية التأمين، الذي هو الإجراء العملي للإدارة، وبذا يمكنه الثبات والاستمرار في العمل في عالم كثرت فيه المخاطر التي هي تحت السيطرة وخارجها.

فبين لحظة وأخرى نرى منشآت دهمها حريق قضى عليها، أو على معظمها، أو سرقة سببت لها مشكلات عرقلت مسيرتها، وأخطاراً أخرى يغطيها التأمين في النقل البري والبحري والجوي سواءً أكانت للركاب أو للبضائع أو للحوادث تجاه الآخرين، كمسؤولية مدنية معهم.

ضمن هذه المخاطر نجد أن التأمين منهج علمي يتبناه علماء الاقتصاد والاجتماع، كاحتياط وحذر، أفضل من الندم بعد فوات الأوان، في حماية خاصة وعامة للاقتصاد الوطني، وإن هذه الرسالة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التأمين السوري وبعث الروح فيه، ليوكب التطور في هذا العصر العالمي المتغير بكل أبعاده، وفي كل المحاور الفنية في التأمين والاستثمارية والمحاسبية، والاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية، دون تكرار التجارب التي لا فائدة فيها، مع مراعاة الظروف الخاصة المحلية ومتطلباتها كالتأمين الصحي والزراعي والتلوث البيئي والحوادث، والعمل على زيادة الوعي والثقافة التأمينية، باستخدام وسائل الإعلام المتاحة جميعها.

هذا ويخضع عقد التأمين إلى مبادئ جوهرية ومهمة أبرزها مبدأ منتهى حسن النية والمصلحة التأمينية كي يكون التعويض ممكناً عند حدوث الخطر لقاء أقساط يدفعها المؤمن له مسبقاً، كما يجب أن يكون الخطر المؤمن احتمالياً، وتوقع عدم وقوعه أكبر من وقوعه، إذ لو كانت الأخطار مؤكدة فلا مجال لتأمينها، ولتوقفت شركات التأمين عن العمل وأفلست، مع ملاحظة أن تأمين الحياة له طبيعة فنية خاصة به، إذ هو فعلاً تأمين الدخل وتعيد شركات التأمين المباشر تأمين جزء من أخطارها لدى شركات إعادة التأمين، بشكل إجباري أو اتفاقي أو اختياري ولكن تبقى علاقة المؤمن له معها فقط.

ومن الناحية المحاسبية، يجب على شركات التأمين الإفصاح عن نتائج كل قسم وكل فرع على حدة لاتخاذ القرارات والمقارنة المناسبة، وتحقيق الأفضل دائماً، ولا يكون هذا إلا بتحليل البيانات المحاسبية بشكل واضح خالٍ من الالتباس أو الغموض، حيث تتميز حسابات شركات التأمين بنواح فنية تؤثر فيها وتتطلب خبراء مختصين في رياضيات التأمين ومحاسبته واستثماراته ومعالجة تكوين الاحتياطات الفنية (الاحتياطي الحسابي والأخطار السارية وتعويضات تحت التسوية) وتسعير الأقساط، فالبيانات المالية الواضحة والصادقة، هي الأساس في الإصلاح والتطوير والتعامل مع الانحرافات بسرعة وجدية والوصول إلى النجاح.

صَبَّاح، أسامة، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد توفيق رمضان البوطي

الموضوع: العمليات الجراحية التجميلية، أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي

Plastic Surgical Operations Their Rules and Outcomes in Islamic Jurisprudence

في ظل التقدم العلمي والطبي الكبير، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، التي شهدت تقدماً طبياً هائلاً، لكن هذا التقدم غير مضبوط بالأخلاقيات والقيم الإنسانية والسماوية.

وهذا البحث فيه محاولة لوضع ضوابط شرعية لخضوع الإنسان إلى العمليات الجراحية التجميلية.

وفي هذا البحث بيان لأنواع العمليات التجميلية مع وضع لجواز تعريض الإنسان نفسه للعمل الجراحي، فإن كان ثمة علاج أو تشويه خلقي أو طارئ فلا حرج من علاجه، وإن كان هناك شكل شاذ أو غير معهود في خلقه الإنسان فلا حرج أيضاً من علاجه وتجميله. أما الخضوع للعمليات التجميلية بناء على الرغبة العشوائية والهوى فغير مقبول في الشريعة.

وبين البحث كذلك مسؤولية الجراح في العمليات التجميلية وصورة العقد بينه وبين المريض.

ويتبين للقارئ في ختام البحث حرص الإسلام على الإنسان وتحقيق مصالحه.

العسة، منى، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. نور الدين عتر

الموضوع: دراسة وتحقيق جزء من مخطوطة تحفة الأبرار من ورقة (1-65)
للبابرتي

**The studying and the Inspection of Apat of the Manuscript (Tohfet
Al-Abrar) in the Babrty Form Page (1-65)**

يُلقي هذا البحث في قسمه الأول الضوء على إمام من أئمة العلوم الشرعية، الذين امتازوا بالعلم
الواسع المتنوع: أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي (ت 786هـ). وكتابه ""تحفة الأبرار شرح
مشارك الأنوار""، الذي يُعدّ أحد كتب الشروح الحديثة الغزيرة الفائدة.

وذلك من خلال دراسة عصر المؤلف وحياته العامة والعلمية، ثم التعريف بكتابه هذا وتحقيق
اسمه ونسبته إليه ومنهجه فيه.

ثم يشير البحث إلى الطريقة المتبعة في تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه، وذلك من خلال إثبات
الفروق بين نسخ المخطوط، وتخريج الآيات والأحاديث، وعزو الآراء الفقهية واللغوية إلى
مصادرها المعتمدة، والتوثيق بذكر مصادر المعلومات التي ينقل عنها المؤلف.

كل ذلك مع التعليق على يُحتاج إليه من شرح مفردة غريبة أو مسألة غامضة أو استدراك شيء
فات المؤلف.

ثم يأتي القسم الثاني من البحث والذي يتضمن النص المحقق على بابين: الباب الأول في شرح
الأحاديث التي أولها من. والباب الثاني شرح الأحاديث التي أولها إن.

صفي الدين، بلال، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. وهبة الزحيلي

الموضوع: أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي – بحث مقارنة

(Ahlu-alhalli wa alaked) In the Islamic Political System Comparative Search

يكتسب البحث في هذا الموضوع أهمية خاصة، بسبب قلة الدراسات المتقدمة فيه، سواء عند إظهار الفقهاء المتقدمين أو عند الباحثين المعاصرين، كما يشهد لأهمية الكتابة فيه ضرورة إظهار هذا المصطلح الأصل الذي مست الحاجة إلى المقارنة بينه وبين المفاهيم السياسية المتداولة اليوم ويشتمل هذا البحث على تمهيد وفصول أربعة.

فالتمهيد في الأسباب الداعية إلى دراسة هذا الموضوع.

ويبحث الفصل الأول في مفهوم أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، فيبين تعريف هذا المصطلح لغة واصطلاحاً، ويقارن بينه وبين المصطلحات الشرعية والسياسية الوضعية التي يمكن أن تشته به.

أما الفصل الثاني فيبين مشروعية وجود أهل الحل والعقد من خلال دراسة هذه الجماعة في العصر النبوي وعصر الخلفاء، ومن خلال بيان التأصيل الشرعي للإلزام بقرار أهل الحل والعقد.

أما الفصل الثالث ففيه تفصيل نظام أهل الحل والعقد، سواء في مجال الشروط الواجب توافرها فيهم، أو عناصرهم، أو في طريقة اختيارهم، قديماً وحديثاً، كما أن فيه صياغة لقانون يشتمل على تفاصيل عمل جماعة أهل الحل والعقد.

أما الفصل الرابع ففيه بيان مسؤولية أهل الحل والعقد، وتتلخص هذه المسؤولية في جانبين: الجانب الديني، والجانب السياسي، وقد كان التفصيل في الجانب الثاني أكثر، فقد اشتمل على

وظيفة هذه الجماعة في بيعة رئيس الدولة، والرقابة على أعماله، وعزله عند وجود دواعي هذا العزل.

وقد عملت في هذا البحث على إيجاد الحلول الواقعية لما يجد من حوادث في ميدان نظام الحكم، بالاستناد إلى النصوص الشرعية، والسعي لتوخي تحقيق المصلحة، والعمل على تلافي الظواهر المرضية التي وقع فيها بعض الباحثين في موضوعات نظام الحكم الإسلامي.

سعيد المجاهد، محمد، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. محمد الحسن البُغا

الموضوع: التعارض بين النصوص في العموم والخصوص

Contradiction and Ovtweighing between Texts in the General and the Particular

هذه أطروحة أعدت لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله من كلية الشريعة في جامعة دمشق، وقد جعلت عنوانها: التعارض والترجيح بين النصوص في العموم والخصوص، وقسمتها إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهارس. تحدثت في الفصل الأول: عن التعارض، وفي الفصل الثاني: عن الترجيح، وفي الفصل الثالث: عن العام، وأما الفصل الرابع: فتحدثت فيه عن الخاص، ثم ذكرت في الخاتمة النتائج التي توصلت إليها، وقسمت الفهارس إلى سبعة أنواع وإن الذي دفعني إلى اختيار هذا البحث الهام وجود بعض النصوص من الكتاب أو السنة التي ظاهرها التعارض، وحقيقتها التوافق؛ لأنها تنزيل من لدن حكيم عليم، فأردت أن أدفع هذا التعارض الظاهري بطريقة منهجية أصولية، ولا بد من الإشارة إلى وجود بحوث في هذا الشأن، وهي مع قلتها لم توف الموضوع حقه.

المصري، غيداء، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد الحسن البيغا

الموضوع: شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والقانون دراسة مقارنة

Woman witness in the Islamic Jurisprudence and the Law Comparative
Study

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ومن والاه وبعد:

تثار تساؤلات شتى حول بعض أحكام شهادة المرأة في الفقه الإسلامي، ويعدّها بعضهم دليلاً على أن الإسلام ما أنصف المرأة، فتناولت هذا الموضوع بالبحث فجاءت الدراسة في أربعة فصول، وفصل تمهيدي سابق عليها. فبينت أولاً حقيقة الشهادة بتعريفها وبيان شروطها العامة، ثم بحثت في الفصل الأول: شهادة المرأة في المسائل المدنية: في المعاملات المالية والأحوال الشخصية. وفي الفصل الثاني: تناولت شهادة المرأة في الجريمة والعقوبة فبحثت شهادة في إثبات مختلف أنواع الجرائم على اختلاف عقوباتها، وشهادتها لدفع العقوبة أو تخفيفها وتأخيرها أو تكميلها. وفي الفصل الثالث: بحثت شهادة المرأة فيما تختص بالاطلاع عليه غالباً من أمور النساء كالولادة والرضاع والعيوب الباطنة ونحوه، وما يترتب على ذلك من النسب والإرث وفسخ بعض العقود ونحو ذلك. وفي الفصل الرابع بحثت شهادة المرأة بمعنى الإخبار أو الخبرة في شهادتها في الشهور والزمان والترجمة للقاضي، وتعديل الشهود، وبحثت في شهادة المرأة الخبيرة في بعض العلوم كالطب والقيافة.

الزبداني، عمر، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد الحسن البغا

الموضوع: الاجتهاد المقاصدي وأثره في قضايا إسلامية معاصرة

Al Ijtihad Al Maqasedi and its Effect in Modern Islamic Cases

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الاجتهاد المقاصدي، ودوره في معالجة قضايا الفقه المعاصرة، وكان الاهتمام بهذا الموضوع ناتجاً عن نواتج الاهتمام بموضوع مقاصد الشريعة، وتعدد الدراسات حولها.

وكنّت واحداً من الذين أولوا عناية واهتماماً بهذا الموضوع، فاخترت عنواناً لبحثي الجامعي ""الاجتهاد المقاصدي وأثره في قضايا إسلامية معاصرة"" بينت فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد، وأكدت أهمية مقاصد الشريعة ودورها في عملية الاجتهاد الفقهي، وأن الفقه الحي هو الفقه الناظر إلى مقاصد النصوص وغاياتها، لا إلى ألفاظها وحرفيتها. وألمعت إلى أنه لم يعد يكفي أن نؤكد أهمية مقاصد الشريعة، بل لا بد من الاجتهاد على ضوئها، وتطبيقها على قضايانا الراهنة، ومن هنا ضمننت بحثي ثلاث مسائل فقهية معاصرة هي: التأمين على الحياة، والشورى السياسية، وسفر المرأة، حاولت معالجتها وفق ذلك المنظور.

الباشا، مؤمنة، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. نور الدين عتر

الموضوع: تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار

The Faithes of Precious Explain the Lights of Easts

لقد كلفت بتحقيق جزء من كتاب تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار ""للعلامة محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابر تي المتوفي سنة ست وثمانين وسبعمئة هـ.

والكتاب عبارة عن شرح لأحاديث انتقاها حسن بن محمد حسن الصغاتي صاحب كتاب ""مشارق الأنوار"" ورتبه بترتيب أنيق جعله اثني عشر باباً.

وقام المؤلف البابر تي بشرحها شرحاً حسناً، عني بالمعاني اللغوية والفوائد البلاغية والمسائل الفقهية والاعتقادية والفوائد الإرشادية.

وقد قمت بتحقيق جزء من هذا الكتاب وهو شرح أحاديث الباب الثاني من كتاب ""مشارق الأنوار"" حيث قابلت بين نسخ المخطوط التي توافرت بين يدي وخرجت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ووثقت معاني الألفاظ اللغوية والأقوال الفقهية والمسائل الاعتقادية لمصادرها المعتمدة، كما أضفت الكثير من التعليقات للتوضيح والفائدة العلمية، كما ترجمت للأعلام والقبائل والبلدان الواردة في الكتاب، وحاولت الالتزام بالدقة الشديدة في العزو إلى المصادر وبالنزاهة العلمية.

السعدي، أحمد محمد سعيد، كلية الشريعة ، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد الحسن البغا

الموضوع: شروط المجتهد ومدى توافرها في الاجتهاد المعاصر

Conditions for Jurisprudence & How far they are Available in Contemporary Jurisprudence

هذا البحث (شروط المجتهد ومدى توافرها في الاجتهاد المعاصر) بحث أعدته لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي وأصوله، والغاية الأساسية منه تحديد مدى أهلية الشرعيين للمشاركة في بحوث المجامع الفقهية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في جميع من يريد أن يتصدى للفتوى والاجتهاد الفقهي.

وقد قسمت البحث إلى بابين: الأول في الشروط المتعلقة بمصادر التشريع، والثاني في الشروط المتعلقة بفهم النصوص. وقد استعنت لتفصيل هذه الشروط بطريقة الموازنة والترجيح عند اختلاف الأصوليين، وطريقة استعراض الأقوال وتحليلها عند اتفاقهم. وقد خرجت نتيجة هذا البحث المستقصي إلى جملة من النتائج المهمة؛ ولعل أهمها وجوب إقناع الباحث الذي يريد أن يتصدى للفتوى لعلمي الأصول والعربية، بالإضافة إلى فهم الواقع الذي يريد أن يتصدى للفتوى لعلمي الأصول العربية، بالإضافة إلى فهم الواقع الذي يريد أن يحكم عليه. واستنتجت جملة من الحقائق أبرزها غياب آلية واضحة تحدد أهلية المشاركين في المؤتمرات الفقهية ومجامع الفقه الإسلامي.

الضابط، مدين ابراهيم، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. خالد الخطيب

الموضوع: دور ضرائب الدخل في تمويل الموازنة العامة للدولة في سورية

"دراسة مقارنة وتحليلية من واقع قطع حسابات الموازنات العامة للأعوام ١٩٩٨ وحتى ١٩٩٦"

The role of income taxes in financing the general state budget of Syria

"A Comparative and Analytical study for the accounting cut- off out of the general budgets for the years tears 1988-1996"

تشكل الضرائب على الدخل المصدر الرئيس لإيرادات الحكومات في الدول الصناعية والعديد من الدول النامية، حيث تصل إلى ٥٠-٦٠ % من إجمالي الحصيلة الضريبية. ويعود ذلك إلى أنها تتسبب بمقدار أقل من تشو

هات الأسعار، كما أنها أكثر ملائمة في تحقيق أهداف الدولة التوزيعية، وهي عدالة كونها تتناسب مع المقدرة التكاليفية للأشخاص، وتقترب أكثر ما يمكن من مبدأ التشخيص.

إن دراسة الواقع التمويلي للضرائب على الدخل في سورية تظهر أن معدل هذه الضرائب منسوباً إلى إجمالي الحصيلة الضريبية قد بلغ (٢٠,٧٦ %) في عام ١٩٩٠، وانخفض ليبلغ معدلاً مقداره (١٨,٧٠ %) في عام ١٩٩٦. تعدّ هذه المعدلات من المعدلات المنخفضة جداً قلما نشاهدها حتى في العديد من الدول الأقل نمواً.

سالم، نجوى، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: د. خلف مطر الجراد

الموضوع: استخدام السلاسل العشوائية في دراسة المجموعات البشرية

Utilisation de Les Processus Aleatoires dans Les Etudier de Les Humain Groups

تمت في هذا البحث دراسة السلاسل العشوائية من خلال بابين رئيسيين.

الباب الأول: قمنا بإلقاء الضوء على مفهوم العمليات العشوائية واستخراج توابعها المميزة، ثم التعرض إلى دراستها إحصائياً.

ومن ثم استعرضنا أهم نماذج العمليات العشوائية، حيث تمت دراسة عملية بواسون والعمليات العشوائية ذات التزايد المستقلة والسلاسل الماركوفية، والتي يشمل كل نموذج منها مجموعة كبيرة من العمليات العشوائية التي لها الخصائص نفسها.

الباب الثاني: ويتضمن تطبيق السلاسل الماركوفية على قطاع التعليم العالي من خلال وصف تطور عدد الطلاب بعبارات احتمالية وذلك بإعطاء قيم لاحتمالات الحوادث من هذا النوع فعند القيام بعرض حالة المجموعة التي هي مجموعة الطلاب المسجلين في كلية ما في لحظة معينة، أمكننا التعرف على تاريخ هذه المجموعة في الكلية، ومن ناحية أخرى يمكننا التنبؤ بمستقبل هذه المجموعة ما بعد المرحلة الجامعية أي سوق العمل.

الزهري، أحمد سلامة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. مصطفى العبد الله الكفري
الموضوع: السكان والتنمية الزراعية في الجمهورية العربية السورية

Population and Agriculture Development in S.A.R

أخذ الاهتمام بالمسألة السكانية في سورية يتزايد بعد عام ١٩٧٠، أي بعد ظهور المعدل المرتفع لنمو السكان والذي بلغ آنذاك ٣,٦ ٪، ذلك أن هذا المعدل المرتفع لنمو السكان والذي يعدّ من المعدلات العالمية المرتفعة ساهم في ارتفاع سكان القطر من ٦,٣٠٥ مليون نسمة في عام ١٩٧٠ إلى ١٦,١١٠ مليون نسمة في منتصف عام ١٩٩٩.

ومن شأن هذا التزايد أن يشكل ضغطاً واضحاً على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان من بين الخطط التي تأثرت بالزيادة السكانية خطة التنمية الزراعية، إذ ازدادت المهمات الملقاة على عاتق القطاع الزراعي سواء في تأمين الحاجات الغذائية المتزايدة للسكان أو في تأمين فرص عمل لهذا الكم المتزايد من السكان أو ... إلخ. الأمر الذي جعل من التنمية الزراعية في سورية أمراً واقعياً، حيث ازداد الاهتمام بالقطاع الزراعي وأخذت الحكومة السورية تسعى لتأمين كل ما يلزم هذا القطاع من مستلزمات الإنتاج الزراعية المختلفة للنهوض بالريف السوري والتركيز على إعداد اليد العاملة المؤهلة والمدربة كونها عماد التنمية الزراعية، وقد انعكس هذا الأمر فعلاً على الزراعة السورية فازدادت إنتاجية غالبية المنتجات الزراعية وأصبحت سورية دولة مصدرة لكثير من المنتجات الزراعية.

قblان، سمر، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق

إشراف: أ.د. سليمان الفارس

الموضوع: مشاركة العمال في الإدارة وعلاقتها بالإنتاجية والروح المعنوية في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في القطر العربي السوري

Worker's Participation In Management and Its Relationship with Production and Morale Spirit In the General Organization For Textile Industry In Syria

نتعرض في بحثنا هذا لإحدى مشاكل إدارة الموارد البشرية التي تعاني منها شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وهي القصور في الاستخدام الفعال لأسلوب مشاركة العمال بالإدارة، مما يؤثر في دافعية العمال وإنتاجيتهم وروحهم المعنوية، حيث سنعمل على دراسة واقع مشاركة العمال بالإدارة في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، ومدى فعاليتها في تحسين الإنتاجية والرفع من الروح المعنوية للعاملين. ومن ثم تحديد المشكلات التي تعاني منها عملية المشاركة بالإدارة والكشف عن أسبابها وصولاً إلى تقديم حول وتوصيات مناسبة لتلافي الثغرات وتخطي العقبات التي تعترض إنجاز أهداف الفرد والمؤسسة معاً. فأكدنا في هذا الشأن أهمية اختيار الأعضاء في اللجنة الإدارية أو المجلس الإنتاجي من ذوي القدرات الفكرية والمعرفية لتبادل الآراء وجهات النظر، ومن ذوي الخبرة الواسعة في مجال العمل. وقبل كل ذلك لا بد من توفر الرغبة لدى هؤلاء العمال بالمشاركة في اتخاذ القرار، والعمل، قدر الإمكان، على دراسة مواقف العمل بصورة جماعية في اجتماعات اللجنة الإدارية أو المجلس الإنتاجي، ومنح الأعضاء ولاسيما العمال الوقت الكافي للتخضير للمواضيع المطروحة في الاجتماعات والمراد اتخاذ قرار بشأنها، وتدريبهم على الطرق العلمية في جميع المعلومات بحيث يتم استغلال هذا الوقت المتاح بالشكل الأمثل؛ وبما يخدم عملية اتخاذ القرار، وتأكيد قيام المدير العام بنقويض الأعضاء في قيادة الاجتماعات واتخاذ القرارات؛ بشرط أن هؤلاء الأعضاء مؤهلين لدرجة كافية. وأخيراً محاولة تطبيق أشكال وأساليب متطورة للمشاركة بالإدارة مثل حلقات الجودة التي يتم تطبيقها في بعض البلدان المتقدمة. وقد دلت الدراسات على تحقيقها لنتائج جيدة.

أبو زيد، عبد العظيم، قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي
الموضوع: نظرية الربا في الفقه الإسلامي
"دراسة مقارنة"

The Theory of Usury in the Islamic Law
"Comparative Study"

هذا البحث هو حلقة في سلسلة ما يعرف ببحوث الاقتصاد الإسلامي، وهي بحوث حرصت كلية الشريعة على دراستها، نظراً لأهمية هذه المواضيع في العصر الراهن، ولإثبات قوة الاقتصاد الإسلامي وقدرته على مواكبة التطور، وفضله على الأنظمة الاقتصادية الوضعية.

يعالج البحث موضوع الربا بمختلف جوانبه، فيذكر بدايةً نبذة عن موقف الأمم السالفة من الربا، وكذلك موقف قطبي الاقتصاد الوضعي المعاصر الرأسمالي والاشتراكي من هذه الموضوع.

ثم الحديث عن آثار الربا. ثم تناول نصوص الكتاب والسنة التي تعرضت للربا، ثم علة الربا عند الفقهاء. ثم يستقرئ البحث المسائل الربوية في شتى أبواب الفقه مركزاً على التطبيقات المعاصرة في ذلك.

ثم طرحت الشبه التي استحل بها بعضهم فوائد المصارف للبحث، وأدرجت في ذلك شبهه الاقتصاديين ونظرياتهم في منافع الربا، وبين عور كل ذلك. ثم كان البحث أخيراً فيما يسمى ببوع الذراع الربوية. ثم خُتم البحث بالتعرض لأهم مسألتين معاصرتين، وهما مسألة بيع المرابحة للأمر بالشراء، وكفرع عنها بحث ما يعرف في العالم الغربي باسم المورغيدج Mortgage أما المسألة الثانية، فهي بيع العينة بالتطبيق المعاصر لها. وأخيراً تم ذكر نتائج البحث.

مكحلة، محمد عبود، كلية الشريعة، جامعة دمشق
إشراف: أ.د. الحسن مصطفى البغا
الموضوع: الجنسية والمركز الشرعي للمقيمين في دار الإسلام

**La Nationalité et Le Center Lègal Pour les Demeurants dans La
Terre Islamique**

يتناول الموضوع دراسة نظام الجنسية الإسلامية، دراسة تتناول جزئيات الموضوع من ناحية
فقهية شرعية، مدعمة بالأدلة والتحليل والاستنتاجات، وقد تم عرض هذه الدراسة في ستة أبواب،
تناولت في الباب الأول مصطلحات سياسية وقواعد دستورية شرعية ذات صلة بمفهوم الجنسية،
وفي الباب الثاني تم تناول نظرية الجنسية الإسلامية وبيان فكرتها وأنواعها، وفي الباب الثالث
تناولت أركان الجنسية الإسلامية والقواعد المثالية للجنسية في التشريع الإسلامي، وفي الباب
الرابع درست أحكام اكتساب الجنسية الإسلامية سواء الجنسية الإسلامية الأصلية أم التجنس
الإسلامي بالقرائن، وفي الباب الخامس تناولت أحكام زوال الجنسية الإسلامية وما يترتب على
ذلك من أحكام، وتناولت حكم العودة إلى الجنسية الإسلامية، وفي الباب السادس تم بحث تنازع
الجنسية في التشريع الإسلامي.

أحمد راتب عيون، ندى، كلية الشريعة، جامعة دمشق

إشراف: د. محمد الحسن البغا

الموضوع: تحقيق قسم العبادات من كتاب ""عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج""

للشيخ سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن المتوفى سنة ٨٠٤هـ - ١٤٠١م

The Hasty Need for Directing the Syllabus

بسم الله الرحمن الرحيم وبه تقتي، أما بعد:

لقد أعانني الله تعالى بفضلله وكرمه ومثله على تحقيق قسم العبادات من كتاب ""عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج"" في الفقه الشافعي، وهو عبارة عن شرح منهاج الطالبين الذين اختصروا النووي من المحرر للرافعي رحمهم الله أجمعين، وهو كتاب مرتب على أبواب الفقه يتضمن الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، وقد قمت أولاً بدراسة حول حياة الإمام الرافعي والنووي ومنهج كل منهما، ثم حياة الشيخ ابن الملقن ومنهجه والمصادر التي اعتمد عليها، ووصف عام للكتاب ونسخه. ثانياً: قمت بتحقيق الكتاب وذلك بعزو الآيات من القرآن الكريم، وعزو الأحاديث الشريفة والنصوص والمسائل إلى مصادرهما، وترجمة الأعلام الواردة في النص، وفهارس عامة وخاتمة. وقد أفادنا الكتاب بمعرفة الأحكام الصحيحة للعبادات وآدابها وسننها، ومن ثم الاطلاع على الأحاديث الشريفة في ذلك، وأيضاً الاطلاع على حياة الفقهاء الأفاضل وإخلاصهم في عبوديتهم لله تعالى ووجدانيتهم، وزهدهم وترفعهم عن الحياة الدنيوية حتى فتح الله عليهم من علمه وفصله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.

النونو، ماهر، كلية الشريعة، جامعة دمشق
إشراف: د. حمزة حمزة
الموضوع: أحكام السفر في الفقه الإسلامي

Les Appreciations des Voyages Du Jurisprudence Musulmane

جمعت في هذه الرسالة كل ما يتعلق بأحكام السفر الموزعة في معظم أبواب الفقه ونسقتها ضمن بابين. تحدثت في الباب الأول عن أحكام السفر في العبادات، وقد قسمته إلى ثلاثة فصول، ذكرت فيها أحكام السفر في الطهارة، ثم أحكام السفر في الصلاة وما يتعلق بها، ثم أحكام السفر في الزكاة والصوم والحج. وتحدثت في الباب الثاني عن أحكام السفر في المعاملات والأحوال الشخصية وبقية أبواب الفقه، وقد قسمته إلى أربعة فصول، ذكرت فيها أحكام السفر في المعاملات، ثم أحكام السفر في الأحوال الشخصية، ثم أحكام السفر في بقية أبواب الفقه، ثم ذكرت عدداً من آداب السفر وأذكاره، وأنهيت الرسالة بخاتمة ذكرت فيها النتائج التي استخلصها من البحث.

العمر، محمد راشد، كلية الشريعة، جامعة دمشق
إشراف: د. أسامة الحموي
الموضوع: أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي ""دراسة مقارنة""

Les Droits des Prisonniers dans La Legislation Islamique "Etude Comparée"

رسالة علمية تبحث في أصول المعاملة العقابية للسجناء خلال تنفيذ عقوبة الحبس عليهم مقارنة بالقانون والقواعد الدولية، وتبحث في أهم الأحكام الفقهية التي تختص بالسجين، ولقد جاءت في مقدمة وستة فصول وخاتمة، حيث جعل الفصل الأول للحديث عن التكييف الفقهي لعقوبة السجن، وخصص الفصل الثاني للحديث عن حقوق السجناء من خلال تعريفها، وذكر أهم المبادئ المؤثرة فيها، وبيان أهم هذه الحقوق لاسيما المتعلقة بالمحاكمة والتعويض للمتهم البريء، والزيارات، وأداء الشعائر الدينية، وخصص الفصل الثالث للحديث عن تصنيف السجناء ورعايتهم، وأنا الفصل الرابع فقد خصص للحديث عن تأديب السجناء، ما يجوز فيه وما يحرم، ووسائله، وتحدثت في الفصلين الأخيرين عن أهم ما يتعلق بالسجين من أحكام فقهية.